





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.573







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.573





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.573






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.573










THOMÆ  
RODERICIA VEIGA

PRO ARTE MEDICA DOCTORIS  
celeberrimi, ejusdemque Professoris Primarij  
in Academia Conimbricensi.

PRACTICA MEDICA.

Cui accessit ejusdem Auctoris Tractatus de Fontanellis, &  
Cauterijs.

*Opus posthumum nunc primum in lucem editum.*



VLYSSIPONE.

Ex Typographia IOANNIS A COSTA Senioris.

---

M. DC. LXVIII.

*Cum Privilegio Regiæ.*



THOMAS  
MODERICIA VEIGA

PRO ARTE MEDICA DOCTORIS  
Lecturae, & Medicae Practicae  
Institutiones, & Observationes

PHYSICA MEDICA

De Naturae, & Generationis, & Nutritionis, & Vitae, & Morborum, & Curationis  
Libri sex



ALYSIENNA

ESTABLISSEMENT JOSEPH A COULLE

M. DE L'AN  
1774



BENEVOLO LECTORI.

**D** *V*æ me præ cæteris causæ lucubrationes has Doctoris Thomæ Roderici à Veiga in lucem edere, maxime perpulerunt: prima, ut ijs quibus vnicè Auctoris tota desudat industria, diuitias omnes de hoc latenti thesauro suppeditarem: altera, ut ab obliuione tanti viri memoriam assererem, quam aut in tenebris jacere, aut temperis diurnitate, extinguere nefas erat: decebat enim quòd, Auctore hoc amplissimo extincto, fama superstes esset, ac ex illius scriptis monumentum emergeret sempiternum. Et, ut spero, opera pretium facturus; nec labor, nec sumptus deterret, dummodo abdium eruam thesaurum, ac patefaciam: in quo Apollineæ artis professoribus complures diuitiæ, etiam à nemine vsque ad hoc tempus patefactæ asseruantur: his inhieræ æquum est, & ut prædæ se se accingant omnes, jam moneo, ac duco. Vbi ad sanandos morbos tam præsentia remedia, quam salutaria præcepta, ne parum prosperæ unquam curationes recidant, inueniuntur. Hic quoque & ingenij vires suscipere, & Artis dexteritatem emulari datur, quam si laudibus, atque ego sentio, efferrem, nil aliud fuisset, quàm soli splendorem addere. Neque quispiam obrectare, aut obloqui audeat me in alienam segetem falcem mittere; quippe enim non mihi, sed alijs laborem hunc suscipio; pro quo si  
premio



premio me non donatum iri putauerit, Auctori certè acceptum  
referat, atque non modò agat gratias, verum etiam habeat.  
Quare si inter legendum quid virij lector offenderit, quod vel  
subducere, vel radere, aut denique vngue notare præsumat,  
boni, æquique consulat, vel Amanuensi potius vertat vi-  
tio, quàm Auctori. Sepulto nempe parcere fas est. Quod  
reliquum est, ut si quis licenter Auctoris gloriam ver-  
bis extenuare, aut illius splendorem obscurare conatus fue-  
rit, vel aliter luore infestus laudes obterere meditetur, be-  
neuolentia, ac patrocinio tegere ipsi, ad quorum institutio-  
nem spectant hæc, insistatis, si tamen hoc præstabitis, vo-  
bismet beneficium confertis, & hoc posthumum opus tuendo,  
vestram causam agitis. Quod autem ad me pertinet, im-  
pense dabo operam, ut à mendis, quibus Auctor opus non-  
dum absoluerat, vindicem, quò sic de opere existimatio latius  
concipiatur, & ad lectionem facilius, ac sine nausea alli-  
ciantur animi, ac excitentur, ad vltimumque tanti viri me-  
moria in præsens, ac in posterum promineat.

## INDEX CAPITVLORVM,

- C** AP. I. De Cephalalgia sanguinea, fol. 22.  
Cap. II. De Cephalalgia biliosa, fol. 22.  
Cap. III. De Cephalalgia pituitosa, fol. 16.  
Cap. IV. De Cephalalgia varia, fol. 23.  
Cap. V. De Vertigine, fol. 34.  
Cap. VI. De Phrenitide, fol. 38.  
Cap. VII. De Lethargo, fol. 50.  
Cap. VIII. De Cathoco, fol. 53.  
Cap. IX. De Caro, fol. 54.  
Cap. X. De Vigilia, fol. 57.  
Cap. XI. De Apoplexia, fol. 58.  
Cap. XII. De Catalepsi, fol. 63.  
Cap. XIII. De Incubo, fol. 64.  
Cap. XIV. De Epilepsia, fol. 65.  
Cap. XV. De Melancholia, fol. 72.  
Cap. XVI. De Defectu memoria, fol. 79.  
Cap. XVII. De Parali, fol. 82.  
Cap. XVIII. De Stupore, & tremore, fol. 92.  
Cap. XIX. De Tortura oris, fol. 65.  
Cap. XX. De Convulsione, fol. 96.  
Cap. XXI. De Catharro, fol. 99.  
Cap. XXII. De Ophthalmia, fol. 105.  
Cap. XXIII. De Ulceribus oculorum, fol. 116.  
Cap. XXIV. De Albugine oculorum, fol. 119.  
Cap. XXV. De Scabie, & sabel, fol. 125.  
Cap. XXVI. De Lachrimis oculorum, fol. 129.  
Cap. XXVII. De Debilitate visus, fol. 133.  
Cap. XXVIII. De Suffusione, fol. 137.  
Cap. XXIX. De Dolore auris, fol. 140.  
Cap. XXX. De Graui auditu, fol. 143.  
Cap. XXXI. De Hemorrhagia narium, fol. 146.

Cap.



# INDEX

- Cap. XXXII. De Dolore dentium, fol. 149.
- Cap. XXXIII. De Pustulis oris, fol. 153.
- Cap. XXXIV. De Angina, fol. 157.
- Cap. XXXV. De Tussi, fol. 160.
- Cap. XXXVI. De Asthmate, fol. 162.
- Cap. XXXVII. De Pleuritide, fol. 163.
- Cap. XXXVIII. De Hamoptoisi, fol. 170.
- Cap. XXXIX. De Pthisi, fol. 174.
- Cap. XXXX. De Cardiaca, fol. 181.
- Cap. XXXXI. De Cholera, fol. 188.
- Cap. XXXXII. De Debilitate coctionis, fol. 193.
- Cap. XXXXIII. De Dolore ventriculi, fol. 201.
- Cap. XXXXIV. De Icteria, fol. 210.
- Cap. XXXXV. De Hydrops, fol. 217.
- Cap. XXXXVI. De Affectionibus licnis, fol. 236.
- Cap. XXXXVII. De Cholica, fol. 247.
- Cap. XXXXVIII. De Fluxu ventris, fol. 255.
- Cap. XXXXIX. De Fluxu in particulari, fol. 267.
- Cap. L. De Hemorrhoidibus, fol. 293.
- Cap. LI. De Lapide renum, fol. 305.
- Cap. LII. De Mensibus retentis, fol. 310.
- Cap. LIII. De Morbis juncturarum, fol. 312.
- Cap. LIV. De Seminis profluvio, fol. 314.
- Cap. LV. De Mingentibus in lecto, fol. 316.
- Cap. LVI. Ad vehementes dolores feminarum ante purgationem, fol. 317.
- Cap. LVII. De Mensum superflua purgatione, fol. 318.
- Cap. LVIII. De Vteri prefocatione, fol. 320.
- Cap. LIX. De Vteri inflatione, fol. 323.
- Cap. LX. De Dolore capitis in febris, fol. 324.
- Cap. LXI. De Pica siue malacia, fol. 325.
- Cap. LXII. De Conceptionis notis, fol. 326.
- Cap. LXIII. De Abortu, fol. 327.
- Cap. LXIV. De Coxarum dolore, seu sciatica, fol. 329.
- Cap. LXV. De Pernionum curatione, fol. 331.

Cap.

CAPITVLORVM.

Cap. LXVI. Pessulum errhinum quod memoriam labentem reparat, & amissam restituit, fol. 333.

Cap. LXVII. De Cucurbitulis, fol. 334.

Cap. LXVIII. De Scarificatione, fol. 335.

Compendium pro Cauterijs, & Fontanelis.

Quaest. I. Quid, & quotuplex sit fontanela, fol. 336.

Quaest. II. De modo aperiendi fontanelas, fol. 338.

Quaest. III. Proponitur certior modus aperiendi fontanelas, fol. 340.

Quaest. IV. De locis in quibus debent aperiiri fontanela, fol. 343.

Quaest. V. Quibus affectibus conueniant fontanela, fol. 346.

Quaest. ultim. Vtrum fontanela possint aliquando claudi, & quo modo? fol. 350.

Està conforme com o seu original. Lisboa S. Francisco da Cidade 6. de Julho de 1668.

Fr. Ioaõ de Deos.

Pode correr este liuro do Doutor Thome Rodrigues da Veiga. Lisboa 6. de Julho de 1668.

Sousa. Fr. Pedro de Magalhães. Magalhães de Menezes  
D. Verissimo de Lancastro. Sylua. Barreto.


Taxão este liuro em duzentos & fincoenta reis em papel. Lisboa 9. de Julho de 1668.

Marquez P. Magalhães de Menezes.

Miranda.

Carneiro.









# PRACTICA

TRADITA A

DD. THOMA RODERICO A VEGA

PRIMARIO PROFESSORE.

Initium lib. de curandis morbis particularibus juxta Radium  
super ix. librum ad Almanforem.

*Tradetur de Autore; de Divisione, ultimo de Ordine.*



QVOD ad Autorem spectat, Simon Cepuensis  
cū alijs opinatur esse Græcum, nec dissidet  
lus à Græcitate. Alij non rejiciunt à lib. Rasis,  
sed suspicantur ex operis dignitate ex Arabico  
traductū esse ad Græcos, ex Græcis ad nos. Alij  
existimant Autorem vocatum esse Buthet filiū  
Zachariae, nepotem Rasis, unde nomen aui obtinuit, sicut Aui-  
cena cui pater Halis, avus Ceni. Est autem hoc opus inter reli-  
qua compendia magni faciendum, quia præstantissima breui  
complectitur. Cur autem Autores Medici fere compendia cō-  
posuerint, in artis medicae præmio explicatum est.

A

De



## De Diuisione.

**C**um in prioribus libris, scilicet octo precedentibus tradidisset ea quæ attinent ad cognitionem affectuum, & materia medicæ; tandem in calce operis, id est, in postremis duobus libris docet rationem curandi morbos licet particulares, in decimo autem libro vniuersales, vocamus vniuersales eos qui non determinant sibi certam sedem in corpore, vt febris, tremor, vlcus; præsens lib. 9. continet 90. capita, quibus vt oportuerit addentur alia.

## De Ordine.

**O**rdo procedendi seruabitur, vt primò, summam caput referatur, secundo explicabitur tota methodus curatoria morbi propositi, causa enim & signa ex libris de locis petenda sunt. Tertiò tradentur per nos remedia optima, facilia, nostra, vt facile ad ea recurri possit. Et quia integra morbi curatio tradi non potest, nisi in quouis capite doctrina trium instrumentorum repetatur, quibus in curatione vtendum est. Satius est vt de quouis instrumento semel tantum tradatur, ita vt ex reliquis capitibus ad illud recurratur. Quæ autem conueniunt vnicuique membro, in capite suo notantur, itaque in primis capitibus de rota victus ratione agitur, in medijs autem agitur de medicamentis. In postremis de chyrurgico instrumento.

## CAPUT I.

## De Cephalalgia sanguinea.

**O**rdo vulgato orditur à dolore capitis, ac primum de sanguineo, de quo primò docet agnitionem, deinde curationem, in verbo adhesionem citrinæ, & tapit, cibi sunt ex lentibus



bus decorticatis, adhesia quidem ex integris, sed taspit ex con-  
fractis, ita ut reddantur potabiles, citrinam enim vocat non  
propter crocum, non enim tale jus propter crocum flavescit,  
est enim crocus cephalalgicus, ita ut eo nomine timeatur in  
Hyera 8. localium cap. de Hyera, & elarius 2. localium cap. de  
his quibus ex stomacho caput dolet.

Aduerte primò de phlebotomia in presenti morbo præ-  
cepta. Licet Autor initium suum à phlebotomia, oportet ta-  
men ut precedat euacuatio contentorum in ventriculo, inte-  
stinis, & mesentericis; nam & in cucurbitulis applicandis idem  
præcepit Oribasius lib. 7. cap. 16. addens, quod si præsumptus est  
cibus, oportet ut subducatur, & potu sumpto: aliter enim peri-  
culum est ne rapiatur cridum ad vasa. 4. de sanit. vltimo.

Secundò: supponitur dolorem non esse validum; quomodo  
& 13. meth. 6. in inflammatione orditur à phlebotomia re-  
uellente. Si tamen dolor est validus ex præcepto Auicene 4. 1.  
cap. 3. & 5. Epid. sect. 2. tex. 8. dolor prius sedatus est. Si ergo  
dolor non est validus, vel pendet magis ex plenitudine corporis  
quam ab affectu partis, supposita verò plenitudine, per quam  
phlebotomiam facimus, prius quam dolor, si magnus fuerit, se-  
detur, phlebotomia non est solum reuellens, sed etiam eua-  
cuans à loco affecto, ordiendum est à phlebotomia. In alijs ve-  
rò casibus oportet quod precedat sedatio doloris per localia.

Tertio: vena eligenda est apud Ras. cephalica lateris ma-  
gis affecti, iuxta tradita 4. de sanit. 8. Est quoque frequentius co-  
siliu sequendum, quam Auicene 1. 3. tract. 1. cap. 29. præci-  
pientis quod ex opposito: tantum oportet meminisse duo ex 3.  
hinc. Vnum: si creditur copia vitiosi sanguinis in parte, vel  
citissime post vnam sanguinis missionem sequatur altera. Alie-  
rum: quod si suspicio est fluxus à toto, securius mitteretur ex erul-  
re, admonente Aduario 2. method. 12. & Auicena de epi-  
leptia. Est autem indicium fluxus vultus, retentio hæmor-  
rhoidu, aut mensiu, aut ingens plenitudo, vel gravis commotio.

Quarto: si videatur fluxionem ferre quassasse, ex capite mitem-

2. 1. 1. 1.

A ij

dus



4  
 quæ est, seruata sententia Hippocratis 5. aphor. 68. videlicet, vt  
 in dolore occipitis frons secetur, quia non sumus certi de om-  
 ni moda cessatione fluxûs, dolente autem fronte vna cucurbi-  
 ta imponitur cavitati occipitis, & duæ scarificata spatulis; po-  
 test & illa occipitis scarificari, sed timetur diminutio memoriae,  
 in vniuersum enim scarificatio debilitat membrum, nisi san-  
 guis abundet, nam tunc phlebotomia cephalica facit ad visû,  
 & phlebotomia grauidæ ad fatis retentionem, 4. 1. cap. 20.  
 Aduerte secundo, de localibus imponendis capiti, num  
 debeant esse valida. Videtur enim primo, quod cerebrum ob  
 suam molliem cum amplis suturis caluariae, maxime patet im-  
 moderantia cuiusvis intemperamenti, quare illic subuenire  
 docemur in uisione, & refrigeratione 8. meth. de diaria exustio-  
 ne. Secundo quia cerebrum subest caluariae minuenti vim me-  
 dicamenti. Vtrum ad oppositum sunt causæ fortiores, summa  
 raritas cerebri exigens medicamentum mitissimum 7. meth.  
 ultimo, & ratio particularis in frigido medicamento quod ini-  
 micum est cerebro 5. aphor. 18. Num autem sit addenda tertia  
 causa ad debilitandum medicamentum, sumpta scilicet à no-  
 bilitate membri. Dicit ad vaquationem sumitur indicatio à  
 nobilitate membri, vt fiat cum mitiori purgatorio, non autem  
 sumitur à dignitate membri ad alterationem simplicis intē-  
 peramenti 8. meth. ultimo. Nec obstat quod ad locale sufficit indicationem à digni-  
 tate membri: 13. meth. 1. quia ibi sumitur indicationem à reso-  
 lutione, quæ est species euacuationis, intemperies tamen mor-  
 bosa cum debilitet, non minus auferenda est æquato contrario  
 à membro nobili, quam ab ignobili, licet concedendū sit quod  
 cum in applicatione æquati contrarij vertatur periculum exce-  
 dendi, & omnis error commissus, maior sit in membro nobili,  
 quam in ignobili, sit vt alteratio membri principis cautiùs  
 debeat peragi. Præterea si intemperies membri facta est  
 hectica, cum alteratio eius debilitet, oportet vt cautiùs agi-  
 tur in membro principi, iuxta aphor. 31. lib. 2. Sed quia hæc do-  
 cetrina



eterna vniuersales traditæ supponuntur à Galeno, affirmat enim 7. therap. 13. in alterando nullam sumi indicationem à dignitate membri, quod frustra increpat Auer. 7. collect. 26.

Secundum præceptum. Cum causæ ad debilitanda loca-  
lia capitis fortiores sint, quam ad oppositum, non imponuntur  
ad refrigerationem meri succi, vel aquæ frigidæ, sed permixto  
oleo, & rosaceo, vel omphancino, vel præstantissimo rosaceo  
omphancino, nam tam interiùs, quam exteriùs permixtio olei  
lædit vim medicamenti, prohibens ne percutiatur membrum  
à vi medicamenti. Quare in capite, & ventriculo ita infrigida-  
mus, in corde autem, hepate, & musculis, per solos succos la-  
ctuca, portulacæ, omphacii, ramentorum, cucurbitæ, brisidis,  
soloni, sonchi, umbilici veneris, sedredis, cum puluere decu-  
plo sandalorum, & rosarum, & aliquibus granis camphoræ.

Tertium: agitatio præcepta à Ras. duas habet causas, vnam  
vt per permixtionem succi, vel aquæ, comparetur tenuitas o-  
leo, ne impediatur à suo lentore penetrare; altera quia sic cras-  
cescit oleum, quare instar vnguenti magis operatur; modus au-  
tem imponendi, in cap. de phrenitide tradetur.

Quartum: in cephalalgia licet calida cauendum est ab epi-  
thematis duobus in casibus. Primus: vel continetur in capite  
copia crassorum vaporum, vel humorum, qui plus lædunt ob-  
structione, quam repulsione, & temperie iuuent. Secundus: vel  
iungitur catharrus, nam humiditate sua addunt catharrum, nisi  
calor catharri sit calor capitis instar cucurbitæ, trahens ex toto  
ad caput, quo casu commodissime curat Tralianus lib. 7. cap.  
1. cum crebra perfusione capitis ex hydreleo, rosaceo, vel oxi-  
rhodino, & cum perfusione frigidæ in balneo, nam talia licet  
statim congelando, aliquid augeant catharrum, verum in po-  
sterum sanat tollendo causam.

Aduerte tertio, de purgatione quam laudat Ras. purgato-  
rium sanguinis venenum est, quare occultatur lib. de purgât.  
med. Quod verò Aët. lib. 3. cap. 16. scribit purgantia sangui-  
nem, & Musa lib. de purgât. med. Scilicet putat esse purgantia sangui-



sanguinem extra, non intra vasa, sed videtur quod plurima referando ora vasorum trahunt, vel urinam, vel deiectiones sanguinolentas, ut centaurea, cardus, semen perichlimum. Mesues autem in vniuersalibus recenset multa mundificantia sanguinem, ut cassia, seru, lupulos, videlicet ut vagentur excrementa in qua facile migrat sanguis, biliosum scilicet, & melancholicum; qua intentione Rasis hic purgat per tamarindos, & mirabolanos, qui temperamento suo frigido sicco purgant sanguinem, & coercent flatum à capite. Quare absente febre mirabolani commodissimi sunt in cephalalgia sanguinea, presente tamen febre tiementur propter obstructions quas gignunt, unde etiam confectio hamech propter mirabolanos quos recipit, non est tuta in febribus; presente ergo febre in cephalalgia sanguinea purgentur cum cassia & manna. Altera causa purgationis bilis in dolore sanguineo, ut in frigidet, nam in cephalalgia calida immateriali Auicena consulit purgare bilem in frigidandi gratia, & 22. 31. de doloribus iusturarum in dolore frigido immateriali vacuat pituitam calefaciendi gratia, quare magis conueniet in sanguine ebulliente euacuatio aliqua bilis, in frigidationis causa, quae cum sit solum leniens non requirit syrosos.

Aduerte quartò, de victu instituendo in sex rebus. Aer 1. non sit luminosus. Nam 2. 4. 33. Dolentes fugiunt lumen, naturam inueniente quod melius est; lumen enim ob calorem agitat humores, ideo magis dolent; vniuersaliter tamen lumen non prohibetur aegris, sed splendor è regione faciei apud Hippocratem lib. de med. si tamen dolens est commatosus, sit luminosus; si vigilat obscurus; 4. acut. 48. si melancholicus, lucidus pareretur; in delirantibus, infra de phrenitide dicitur. Quare pro varietate morbi in aegris variandum est lumen; in sanitate autem locus lucidus commendatur, & eo magis quo aer insalubrior est apud Celsum lib. 1. cap. 2. eo quod lux & ignis purgant, & attenuant aeris grauitatem. Secundò aer non caleat ex coeuntium multitudine, vel domus paruitate, vel igne, vel aromatis, nam 5. aphor. 22. inducunt capitis grauitatem. In declinatione



nione autem, vacuata scilicet materia, modici suffitus sanant apud Mesuem cap. de cephalaa.

Tertio: aer fluuiialis humectat, marinus siccatur latenter, & aperit corpus propter salem, ideo commodat in cephalaa apud Aurelianum cap. proprio. Motus etiam 1. 3. tract. 2. cap. 10. prohibetur corporeus, & animalis. Secundo, deambulatione post tres horas à cibo commendatur 2. localium 1. non intra breue spatium, ne vertigo accedat apud Aurelianum cap. proprio, sed per satis longum: cap. de cephalalgia ex ebrietate; scilicet augescente dolore melius est quiescere, decresciente autem deambulare, & si quidem dolor calidus est in loco frigido, & si frigidus in calido; & si ante cibum pluribus deambulationibus, si post, leuibus & lentis.

Quarto: frictio extremorum lenta, & multa, ligatio eorum simul, & lotio frequens conueniunt; nam primò sola frictio pedum continua per diem, & noctem, sanauit validam cephalalgiam, & apud Auicenam, quòdoque sentitur descendere dolor in lotionem.

Non obstat quod in epilepsia docet Auicena validam frictionem incipientem à pectore cum linteis rubefacientibus, & in apoplexia ligat femora validissime; quia in illis casibus propter vehementiam imperus, & periculum, eligimus tractum ad inferiora agitatione humoris; hic autem propter causas oppositas cauemus agitationem; lotio frequens columparum pedum, sinceritatem sensuum, & incolumitatem cerebri conseruat, in introitu lecti quando canandum est, vel ante canam; dicebat Arnaldus de regimine sanitatis.

Quinto: lotio capitis commendatur eidem secundo quòque die, & plurimum in praeservando, & videtur, cum per futuris possit imprimi vis medicamenti, & exhausturi excrementa, potissimum cum adhibetur resiccatio, vltima laudata, 3. acut. 13.

Sexto: in eodem tempore, declinante dolore, vel non praesente, perfrictio capitis inbrosa benefacit, modo quidem ad occiput, modo ad insiput, & frictio capitis, maxime si celebratur



brietur post exercitium jejuno homine, quod docuit Auicenna citatus de epilepsia, quod autem sit pecten ex sinistro cornu arietis, vel eburneus, non est facile recipiendum.

Septimò: caput dolens: vniuersaliter præcipiunt quidam adstringi linteo, ne immodice solutis cerebro membranis augeatur dolor; Galenus 3. de medicatrina vltimò, dixit valde iuuare in dolore pulsante.

Octauò: nam compressio musculorum, & tendonum, quod vetula faciunt, còmodet. Lege apud Auicenam lib. de remouendis nocementis. tract. 6. cap. 3. commodam esse ad crudos humores, & duritiem tendonum, quæ ex otio nascuntur. Sõnus plurimum iuuat omnes cephalalgicos, curat enim per accidens sicut narcotica, propriè autem fere semper. Si verò dispositio est pletorica, vel vaporum, vel humorum, vel in toto, vel in capite, magis requirens resolutionem quam cõtionem, lædit, sicut & post cibum 4. aphor. 67. in reliquis confert. Additur etiã ea ratio, cur somnus sanet cephalalgiam; quia tunc maxime quiescunt motus omnes, quare in hac affectione diuturnus somnus non reprobatur, licet in sanitate reproberetur 1. 3. citato. Ostensum enim est cap. 3. art. med. somnum maxime cõcoquere cerebri morbos.

Nonò: figura cubandi apud Aureolum. Dolente toto capite sit supina. Causa videtur quia antrorsum vergunt carotides, per quas communicatur affectus. Et anterior pars magis sentit, & crebrius dolet; si pars altera dolet, super eam decumbat, quia ex cõtione, & calore magis lenitur dolor, sicut ventri dolenti pronus accubitus eligitur 1. Progn. 19. Quandoque præstat supra sanum latus decumbere, quandoque is accubitus est magis dolorificus, sit autem caput paulo elatius, ait Aureolus. Nicolaus inquit, si vapores ad caput ascendunt, sit demissum; si autem humores sublime: vtroque tamen instellum, ne rectâ repant, siue humores, siue vapores, jacet satis oportus calens infernis partibus, lecticaque pedes demissiores sint parte ima, quam superiori, & ne cogatur caput demittere, mensa



mensa excelsa sit, & si vel edit, vel studet; inanitio confert excrementi humidi, sicciq; & ventriculi, in quo oportet perseverare 1. 3. cit. tum quia ita non effumant, tum quia præstant locum, cum humores sua gravitate recipiantur, tum maxime quia 2. localium 1. plurimum situm est in clisteri valido; quod attinet ad reuulsionem, cum verbo (valido) adnectendum est. Fames tamen non simpliciter commendatur à Galeno, nam in calidis nocet, quia acuit humores 1. cris. 12. ergo in calido dolore parum edendum est, cum dolor succedit propter hicores ad ventriculum confluentes. Affectus animi vehementes, quia agitant, fugiendi sunt; alimentum paucum non vaporosum; euaporant autem lac, & lacticia omnia, eo quod sint calida, & humida, & flatulenta.

Præterea radices plantarum acres, & aromata ob excessentem calorem sursum deferentem vapores, præterea frixa omnia, ob acrimoniam olei frixi; de quo dixit Auer. 1. coll. 36. verti in sulphur. Pisces præterea in plurimis, quia oculis nocent ob immodicam humiditatem, nisi ventriculus valde appetat, nam ita ob clausuram retinentur flatus; legumina item, & cætera bellaria, num sint item alimenta capiti noxia. Locat autem ea Galenus 2. loc. 1. in fine sic, ut in 1. ordine constituat, lac, glandes, vnedones, oliuas nigras, quibus addi potest nux, raphanus, palma, crocus modicus, magis lædunt thus, & mirrha, multo magis, & mentem perturbant crocus, & stirax copiosa.

Duodecimò: in calida cephalgia abstinendum est à carne, & vino, & sumenda sunt initio mensæ lenientia, in calce adstringentia.

Decimo tertio: quod Galenus concessit vinum 2. localium in cephalgia frigida. Contra Auicenn. citat. cap. 29. concessit vinum tenuium partium declinante morbo, nam idem Galenus initio capitis negauerat vinum in frigido affectu; proponunt album, album quia minus moratur in ventriculo, non tamen quia facilius coquitur, sed quia facilius penetrat ob tenuitatem 3. acut. 3. item quia est subfrigidum 3. 1. 8. Quare so-

B

lum



lum conceditur inter vina febrienti 3. acut. 8. item in valde affuetis; etiam initio frigidi affectus concedendum est album pauciferum; quomodo idem Galenus 2. loc. 1. & 6. de sanitat. 7. præcipit in cephalalgicis, sumi ad jentaculum panem cum oliuis, & palmulis.

Dic. Idem subdit explorata prius natura particulari. Nam in his quæ valde mala non sunt, à tota specie particularis indicatio præpollet. Quomodo item thuris suffitus, & grana deglutita commendantur in prohibendo catarrhum. Dic subaudiendum est aliquid, si non adsit cephalalgia.

Decimo quartò: Aurelianus ait: in copia victus assueti, in primo die nihil sumant, vel solam aquam cum paucissimo obsonio. Secunda die mediètatē cibi assueti, & vini, vel exercitij; vel quando jam melius habetur, inde per triduum addatur in quoque die tertia pars deficientis ad consuetum victum.

Decimo quintò: memorandus est canon Auic. 1. 3. tr. 2. cap. 1. in morbo materiali capitis, cum cibus, frica extrema, & alleui partes capitis, subaudi calida remedia tollendo, & robora cum repellentibus.

Decimo sextò: num conueniat claudere mensam cum semine coriandri preparato per macerationem cum aceto. Dic: Auic. 2. can. commendauit ad reprimendos à capite vapores, & 1. 3. ad epilepsiam, tam humidum, quam siccum; & eodem lib. tract. 2. cap. 19. ad cephalalgiam, & in lib. de remouendis nocumentis cap. 2. ad remouendos, seu arcendos flatus australes à capite, & Serapio cap. de coriandro, & vulgo succum coriandri, & odorem ejus adhibent intus, & extra, ad somnum conciliandum: Tralianus commendat ad epilepticos, & viride.

Contra: alijs videtur vsus reprobis cum Cardano, eo quod 2. diatarum, apud Hippocratem in 2. mensa somniferum est, & apud Diosc. mentem tentat potissimum. Quare eisdē inter venena numeratur lib. 6. Dic ergo in copia sumptū  
tentat



tentat caput, & reprobum est, paucum autem benefacit capiti somnum inducens, scilicet siccando, & auertendo paucos aliquos flatus facientes vigilare, nam si induceret somnum humectando, non commendaretur dictis auctoribus ad epilepticos.

*Remedia Cephalalgia sanguinea.*

**P**rimum: Albumen, rosacea  $\frac{3}{4}$  ij. aceti  $\frac{3}{4}$  j. linteus duplicatus fronti applicetur. Et secunda quoque hora innouetur. Secundum validius: Rosacij & rosaceæ ana  $\frac{3}{4}$  ij. aceti  $\frac{3}{4}$  j. valde agitata imponantur toti sincipiti usque ad verticem, prius tamen vas aliquod tepidum in puteum mittatur.

Tertium validius: mucilaginis seminis psilij extracti in rosacea cum aceto sub duplo ob lentorem mucilaginis, quod satis sit.

Quartum: præsentē copia humorum semina altheæ cum aceto trita in cataplasmate impone. Quintum: potio: in sanguine inflamato pruna 20. enucleata, tamarindorum  $\frac{3}{4}$  j. in vna lb. aqua ad dimidias coquatur, in collatura callida infunde mirabolanorum citrinorum puluerisatorum non cribatorum  $\frac{3}{4}$  j.  $\frac{3}{4}$  j. horis decem colletur, exprimatur, & dulceretur cum sachari albissimi  $\frac{3}{4}$  j. præsentē febre substitue pro mirabolanis pulpæ cass. fist.  $\frac{3}{4}$  j. vel manna  $\frac{3}{4}$  j.  $\frac{3}{4}$  j. finis cephalgiæ sanguineæ.

CAPVT II.

*De Cephalalgia biliosa.* In 2. Si autem

**D**E biliosa primò docet agnoscere. Secundò curat citra phlebotomiam. Tertiò vbi reliqua non sufficiunt addit opium.

Aduerte primò, ante purgationem, necesse est præcedant colagogi syruipi, sed num ante syrûpos præcedat leniens me-

B ij

dica-



dicamentum vsu Italarum. Dic primò: conuenit is vsus ob vitandum copiam prauī halitus ab intestinis, & putredinis copiam ibi serpentis, item vt descendat humor infernè, quod in omni morbo expetitur. Postremo quia tam syrupi ob decoctionem, quam phlebotomiam ob tractum transmittunt ad vasa prauitatem succorum in primis vasis existentem. Quare commode initio morbi vacuatur alius integrè per clisteres duos, sed melius sumpto leniente. Dic secundò: hora sumptionis est mane ante cibum, iuxta præceptum 2. aliment. 31. nam leniens si permiscetur cum multo cibo remittitur vis ejus, si sumitur multo ante cibum, cum careat copia alimenti retro comprimente, minus vacat. Dic tertio leniens medicamentum in affectibus calidis, est pulpa cassiæ 3. xij. cinamomi anisi ana gr. x. cum saccharo. In frigidis autem affectibus, pulpa cassiæ 3. j. pulueris hyeræ 3. j. β. cum saccharo. In humidis autem affectibus, aloes 3. iij. reducantur in pillulas cum melle rosato.

Cur autem addantur corrigentia in cassia. Dic: Hippocrates 2. acut. 2. docuit purgantibus misceri, roborantia os ventriculi, & dissipantia flatus. Cassia autem quæ peculiariter habet illas noxas, indiget emendantibus dictis, quam autem lethale sit quandoque, non permissio leniente pharmaco, phlebotomare, in acutis docent experimenta Auer. 7. coll. 1. in fin.

Aduerte secundò, num in cacochimia conueniat phlebotomia. Dic in summa; phlebotomia adhibita gratia vacationis potest in cacochimia conuenire, juxta distinctionem traditam 4. de sanitate 8. si cacochimia non est immodica, & peccat cum præsentia multi sanguinis. Verum quando ultra necessitatem vacationis jungitur necessitas reuulsionis, potest conuenire, licet cacochimia sit aliquantulum magis recedens à sanguine, & licet in sanguine sit aliqua diminutio; idè fere semper phlebotomia, conuenit initio interorum inflammationum, vbi tamen inflammatio duceret ortum à me-



ra cacochimia valde recedente à sanguine, cum diminutione sanguinis, ita vt credatur noxa vacuati sanguinis vtilitati cacochimiae vacuatae, prapollens sit reuulsioni, abstinendum est à phlebotomia. Quapropter in dolore capitis, cum semper jungatur intensio reuulsionis propter periculum inflammationis in membro nobili, dolor est validus 3. prælag. ad initiū com 2. fere phlebotomamus, quod significauit Auicē. 1. 3. 29. in initio.

Aduerte tertio, de qualitate, & loco remedij imponendi ex 2. loc. 1. 2. 3. actualis frigiditas momentanea paranda est immisso vase in aquam vehementer frigidam, qualis ex multis fontibus affertur, qua non præfente, nix vasi circumponatur. In quibus verbis colligendum est primo, quod in calida affectione semper expetit frigiditatem actualem, licet non semper potentialem, nam in pueris, mulieribus, & viris alba, & molli carne præditis, camomelino vtitur ad ardore, scilicet quia confidit actuali frigiditatis ad excedentem calorem emendandum, ne autē sana aliquo modo laedatur ab eo frigore addit virtutem camomilæ calorem, moderatur tamen actuale frigus juxta dispositionem ægri, dictam ætatem, & constitutionem præsentem, non quasi apponeret actualiter tepidum, sed vt quandoque remittat frigiditatem eorum in ardore inmateriali curando, in materiali, verò etiam lib. de marasmo in fine præcipit actualem frigiditatem, & frequentem permutationem, vnde non videtur accedendum vsui per hyemem tepesacientium, epithemata imponendo in ardore curando, licet debeat ex Galeno aliquid variari juxta varietatem æris domus, semper tamen actu frigida, modo non inducant horrorem densantem meatus.

Colligitur secundo: frigiditatem niuis, non esse omnino innocuam, eo quod est pars vaporis crassior, & turbidior, quæ coërit in niuem, quæ liquata nocet, cum frigus aquæ fontanæ sit maximè incolumē. Si ergo in extra apponendis in morbo calido veretur Galenus frigus niuis, quanto magis in assumen-



assumendis per sanitatem aqua, & vino, & tanto deterior est nitri frigiditas, quantò magis in ratione mineralis participat quiddam delethereum.

Colligitur tertio, quod etiam in leui affectu ardoris capitis perfundit vniuersum caput vsque post verticem, non tamen longè inferius vertice, quod ipsum docet obseruare, tam in calefaciendo, quam in refrigerando, scilicet quia sic omnes futura capitis comprehenduntur, & lambdoides, & quia si plurimum descendit infra verticem, periculum est de refrigerando quarto ventriculo omnium neruorum origine; ad latera autem vsque ad aures descendendum, & antrorsum vsque ad initium capillaturæ, circumdato his tribus linteo ne perfusio molesta sit.

*Remedia Cephalalgia biliosa.*

**P**rimum: Digestium præmittendum euacuationi in tenuibile. Syrupi violarum oxifach. añā ʒ. j. aquæ indiuiæ ʒ. iij. misc. Secundum validius: Syrupi nenupharini, & de acido citri añā ʒ. j. aquæ acetosæ ʒ. iij. aromatifa cum puluere ros. & sandalorum citrinorum. Tertium: in bile crassa digestium, acetosi, & endiuiæ añā ʒ. j. aquæ cichoriæ ʒ. iij. misc. Quartum validius: acetosi compositi ʒ. j. & β. rosati ʒ. β. aquæ fæniculi & endiuiæ añā ʒ. & β. aromatifa cum rosis, & cinamomo.

Quintum: purgatio sine custodia ter in mense repetenda. Pruna 20. tamarindorum ʒ. j. in decocto collato solue pulpæ cass. ʒ. j. cinamomi ʒ. j. cum sachato albissimo, vel cōseruæ rosarum Alexandrinarum suprapotato serò; vel succi earundem rosarum ʒ. iij. sachari ʒ. ij. cinamimi ʒ. j. vel in ʒ. j. succi intubi depuretur, macereturque per tres dies ad solem aloes ʒ. j. ex quo succo sumat quotidie aut tertio quoque die pro varietate solutionis ʒ. j. & β. vel aloes electi ʒ. j. formentur pilulæ cum syrupo rosarum sumenda dormituro

in



in diebus intarcalariis. Vel rhabarb. ℥. j. sumatur jejuno mandendum, vel pulueratum cum sacharo rosaceo, vel in pilulas redactum, vel in jure pulli, potum.

Si autem maior siccitas, sumatur bolus rhab. ʒ. β. floris cass. ʒ. j. cum sacharo. Vel mandendum sumant quotidie cass. ʒ. ij. supra potata aqua cichoriar, & continue per triduum hora vna ante prandium, vel canam.

Sextum: validior purgatio est si adhibeatur in prima portione electuarij succi rosarum ʒ. ij. vel pilularum aurearum, & sine quibus añā drag. β. deurentur post fractionem ex succo rosarum, & post mediam noctem deuorentur.

Vel fiat bolus electuarij de succo rosarum drag. ij. rhabbari drag. j. pulpæ cass. ʒ. β. cum puluere anisi gr. x. & sacharo quantum satis.

Septimum: epithemata cephalalgia sanguinea diminuto aceto, vel lac muliebre, cum albumine agitatum, missis stupis canabinis supra frontem, & tempora crebro. Validius. Cerae albæ ʒ. j. rosacei omphancini ʒ. iiij. liquatis ante quam exacte coeunt in mortario affunde paulatim succum cotylidonis, vel sedi, permiscens impone tenui linteo in toto sincipite, & permutato, vel vinctum caput operi folijs vitis, aut nymphaeae, mittaturque in nares, & aures nenupherinum cum rosacea agitatum. Validius est, si adduntur Opii camphoræ añā gr. ij. auri affundatur tepidum duobus tantum guttis, nec diu permittatur, & si forè sequitur stupor, subuenitur cum nardino adjecto croco, & cinamomo.

Octauum: commendat suffitus in pomo angusti colli. Sandalorum citrinorum, ros. florum nenuf. añā ʒ. ij. camphoræ ℥. j. spicæ ʒ. β. opertum cum rosacea bulliat, & per interualla odoret.

Errhinum ita paretur. Sacharum, camphora, crocus cum succo coriandri. Validū autem linimētum est huiusmodi. Farina hordei, semen hyosciami albi, fantali citrini inspersa poscha imponantur loco dolenti, supra posito linteo crebro permutato ex poscha rosato.

Nonum



Nonum: aqua potanda, aquæ fontanæ ℞. ij. hordei depilati ℥. ij. coquatur ad consumptionem tertiæ partis, vel prunæ duodecim. Validius est si coquatur seminis psyllij in linteo ligati ℥. ij. finis tractatus de cephalalgia biliosa.

## CAPVT III.

In 2. Quod si Cum.

**D**E dolore frigido, primò docet agnoscere. Secundò, curat purgatione pituitæ, epythematis, & odoratis. Tertiò, vbi priora non sufficiunt addit lenimenta.

Aduerte primò, de compositione cochiarum, dubitant quomodo ad soluendam pituitam recipiant plurimam scamoniæ cholagogam. Secundò, quomodo iungit ea quæ valde distant in tempore operationis, colocynthidem cum scamonea contra præceptum Gal. 2. acut. 11. Tertiò quomodo exhibet ℥. ij. & β. cum vna sola valide purget.

Dic ad primùm: in omni fluxu iugitur bilis ob tenuitatem: ita scamonia non solam bilem educit, sed pituitam apud Dioscoridem: postremo additur ad velocitanda phlegmagoga.

Ad secundum: ex Galeno citato, pugnantia quæ miscentur, oportet esse æque velocia in purgatione, aliter sequetur, vt id quod velocius est cum prius exeat non possit purgare humorem, quare cum moueat, & non vacuet, sequetur anxietas. Præterea cū educit humorem, scilicet educit aliquid ex pharmaco tardo, quo fit vt tardum medicamentum purgare non possit; nam exhibitum fuit paucum, vt pote iunctum alteri, & præterea remansit minus, quia portio pharmaci ejus à parte pharmaci velocioris educta fuit,

Dic ergo ad objectum: quod non est licita permixtio talis nisi in altero duorum modorum. Vnus quando fermentatur, ita enim reducuntur ambo ad mediam quandam moram, quod apparet in pillulis omnibus, cum aloë tardum iungitur



gitur scamonium velocissimæ purgationis, & in hyeris omnibus magnis, vbi colocynthidis tarda jungitur, scamonia velocis.

Alter casus, quando licet non fermentetur, junguntur in valde impari proportionem, ita vt velox ex ilis excitet tantum moram tardioris, & est solutio magis recipienda, quam Vgonis 4. 1. cap. 4. conformis Traliano eap. de paralisi: Vnde intelligitur quod permiscere agaricum, vel Rhabarbarum, cum electuarijs scamoneatis in viribus paribus non est artificiosum. Cassia tamen incolumiter miscetur omnibus, quod prohibet noxam purgandi, & non affert periculum mouendi citra vacationem.

Colligitur secundò, nunquam post purgatorium adhibendum esse diagridium, vsque ad diem tertium, in quo sedetur motus pharmaci, ne jungantur duo purgantia in varijs temporibus purgatorio. Ad tertium dosis immodica est forte ex vitioliteræ, nec excedenda est drag. vna.

Aduerte secundò, de digerentibus ex Auic. tract. 2. cap. 12. oportet vt sit continua, idest proluxa propter difficultatem portionis, & remotionem loci, fere autem septem conueniunt, non enim sufficiunt pauci syrups sicut in humore calido, & oportet vt præparatio humoris fiat non solum per syruos, sed etiam per alimenta facultate similia elixa. pauca, non falsa.

Num autem conueniant syrups ex aceto, dixit Auicena cap. 29. necessariam esse vim aceti in remedio capitali, & tamen paulo post tract. 2. cap. 7. in fine timet attenuantia, quia propter apertionem meatuum deferunt vapores ad caput. Dic: cum creditur causa cephalagie consensus ex vapore communicato, suspecta sunt, cum autem per proprietatem conueniunt.

Aduerte tertio: de diuertentibus, exiguntur hic multo validiora; tum quia frigidus humor difficilius trahitur; tum quia ex commotione non solum non læditur, vt calidus, sed emendatur, & attenuatur. Quare clysteres acres, frictions cum aspero linteo, & in volis, & plantis cum aceto, & sale; ligatura

C

gura



tura item valida non solum supra juncturas, sed etiam in juncturis, cum magis dolorifica sint, & adhuc potentiores in fœmorum, & brachiorum radicibus. Memorandum tamen illud Traliani cap. de phrenitide, & Auic. cap. 29. vt quam primum extrema soluantur, mittantur in calida, partim ne recurrat humor; partim vt dolor tenuius auferatur.

Aduerte quartò, de purgatione adhibenda. In crassis humoribus simultanea lædit, reddens morbos incurabiles, sed oportet vt saepe per intervalla purgetur, factò initio à leuissimo vsque ad validissimum, tam in coquentibus, quam in purgantibus: perpetuò enim relinquitur pars humoris durior; colligitur hæc sententia ex curatione Galeni 1. localium de alopecia. Nec obstat quod eodem cap. ait oportere, vt quam citissime euacuetur humor, ne inducat parti malum habitum, qui perpetuò asseruat noxium humorem, quia fatendum est, ideo non esse otiaudum in morbis materialibus longo tempore, sed non proinde ordiendum est à valido purgatorio.

Præterea postquam aliquanto tempore fuerit continuatus progressus dictus, interponendum est longum tempus otij, à quo rursus similis circuitus repetendus est à leuissimo, vsque ad validissimum, etsi nihil appareat iuuamenti, præclare Traliani cap. de melancholia, & epilepsia, & Celsus lib. 3. cap. 1. in fine,

Aduerte quintò: de particularibus euacuationibus capitis, tam in his, quam in reliquis remedijs; oportet meminisse sententia Galeni 2. loc. 1. oportere, vt cuique operi medico habeantur parata saltem duo remedia intensiõe distantia, vt ex mistura eorum variet intensio, & remissio pharmaci, in quo vno sita est recta ratio curandi. Alterum est præceptum Traliani lib. 5. cap. 2. Quod si caput est primariò affectum citra corporis vitia, nulla euacuatio vniuersalis præponenda est, sed incipiendum est, à particulari euacuatione, in contrarijs verò casibus oportet, vt præcedat vniuersalis.

Tertium præceptum cõmodissimum ex 7. meth. 2. & lib. de



de praeuotione 8. post vacationem innatantium humorum expurgandi sunt imbibiti, vt sequatur diutina emendatio intemperamenti per alterantia, ne rursus gignatur humor morbosus.

Quartum: commodissime etiam facit, si quid videtur residuum ex purgationibus, vt sumantur decocta, vel leuia purgatoria alternis diebus, & si validiora sint quarto quoque die, vel decimo quoque; facit enim huiusmodi paulatina, & modica purgatio, tum vt non asseruetur in loco morbofo quantitas sufficiens ad repetitionem morbi, tum vt assuescat materiam ad locum longinquum mandare.

Aduerte sexto de victu. Vinum etiam in affectu frigido capitis suspectum est, quia non solum vapores proprios, sed etiamimenti defert ad caput. Nec obstat 6. aphor. 31. *Dolores oculorum meri potio soluit, &c.* Quia id habet locum in paucaplenitudine crassi sanguinis non praesente fluxu ad caput, quando paucum merum sumitur via medicamenti.

Nec obstat secundo, quod 5. aphor. 5. Vinum qualitate sanat quod copia facit, quia vinum sequente plurimo somno in ebrijs incubatis non semper id operatur, cum autem illud non potest, mors sequitur, ait Galenus, quare in dubitatione omittendum est vinum. Nec obstat etiam, quod conceditur hic apud Ras. & apud Galenum 2. local. citat. Quia solum in fine cephalalgiae frigidae, quo tempore etiam exercitium laudatur, in alijs temporibus reprobatur.

Postremo in sententia Ras. hic non est omittendum, quod cum non satisfaciunt remedia dicta frigida, & calida, curat lenimentis, eo quod maiori mole amplius operantur. Suspectum est tamen quod addit de opio addendo. Nam ex localium 2. citat. dolor capitis non accedit ad eam vehementiam, vt periclitetur vita, & cogat ad narcotica, quod item in dolore frigido, simul cum lotionem capitis adhibet balneum totius; causa est quia timet ne trahatur humor ad caput solius capitis lotionibus.



*Remedia Cephalalgia pituitosa.*

**P**rimum in pituita crassa non reumatifante. ℞. oximel simp. syrupi de stachados simp. añā ʒ. j. aquæ betonica ʒ. iij. misc. Secundum validius; syrupi, & aquæ betonica. Adhuc validius. ℞. syrupi oximelitis schylitici ʒ. ʒ. de stach. cōp. ʒ. j. aquæ betonica ʒ. iij. misc.

Tertium: in tenui reumatifante ℞. mellis rosati collati ʒ. ij. aquæ decocti thuris, & nucum cypressi ʒ. iij. misc.

Quartum purgatorium lene. ℞. agarici trociscati in oximelite schylitico pulueris hyeræ simp. añā ʒ. ij. formetur cum melle rosato. Vel sumatur in jure pulli turbiti. electi ʒ. ij. zinziberis ʒ. j. sachari ʒ. iij. Vel electuarij indi ʒ. iij. cum sacharo in bolo. Commode autem additur in quouis horum florum stachado, seminis peoniæ añā gr. x. Vel sumatur agarici ʒ. j. diag. gran. v. cinamomi gariophylorum, añā gran. x. cum sacharo, & diacitonij succorum añā ʒ. j. fiat diacitonium. Vel commisceantur dicti pulueres cum conserua rosarum. Vel pillularum arabicarum ʒ. j. & ʒ. Commodissime ad dictos effectus, vel ter in mense sumat ʒ. j. Vel pillularum recipientium aloes electi ʒ. ʒ. agarici, Rhab. añā ʒ. ij. nucis muscatæ, massis añā ʒ. j. & si permisceatur bilis addantur rosæ, & sandali pari pondere cum dictis mastichi, & nuce.

Est etiam purgationis modus commodis simus, vt ex pillulis validis, vel ex hyera aliqua magna. Sumatur primum, media quantitas, post dies 8. dupla, post alios 8. tripla. Commodus est, & ille modus, vt per dies aliquot interpolatos sumatur leue purgatorium, quale est. Pulueris hyeræ bene preparatæ ʒ. j. in duabus ʒ. juris, & supra potentur ejusdem juris ʒ. iij. ad tollendam amaritudinem, vel pilula vna pendens ʒ. ʒ. deuoretur dormituro, tertio quoque die, vel in t̄b. j. decocti thyn. i Mesues maceretur per dies tres ad solem aloes, hyeræ añā ʒ. ʒ. sumant quotidie ʒ. j. & semicem.

Quin-



Quintum purgatorium validius. ℞. cochiarum ʒ. j. vel agarici ʒ. ij. floris cass. ʒ. j. cum saccharo fiat bolus.

Validius. Hyeræ legodij ʒ. iij. repetantur ter in mense.

Sextum: Clister crebro sumendus stachados, betonica, saluia, hysopi ana m. j. in tb. j. decocti, addantur olei ʒ. iij. mellis ʒ. ij. hyeræ ʒ. vj.

Validius. Si recipit in decoctione centauriæ drag. iij. benedictæ ʒ. ʒ.

Septimum: erthinum lene, succus betæ, vel maioranæ sumatur prius ore pleno aquæ, præcedente suffitu decocti maluarum, & stachados, præstat autem si nocte procedente illiniatur interuallum supercilliorum, cum adipe gallinæ. Validius est si recipit mel, melantium, & aloem. Validius si succus est anegalis. Validius si in ʒ. j. succi, addatur ellebori albi gr. iij.

Octauum, masticatoritum lene. Mastix per mediam horam mansa. Validius si addatur macis piperis ana gr. iij. Validius est masticatio piretri ligata in linteo ne linguam mordeat. Vel piperis albi, origani, cinamomi, staphisagriæ ana, cum carne passularum tussa, fiat bolus drag. vnius masticandus. Vel mastichis drag. ij. piretri staphysagriæ ana ʒ. ʒ. ceræ drag. ij. fiant trochisci ʒ. j.

Nonum, Apophlegmatissimus leuis, ℞. oximelitis ʒ. j. decocti passularum, stachados hysopi ʒ. ij. Validius est si oximel est schyliticum, & recipit decoctum synapis, pyretri ana ʒ. j. Validius est, apophlegmatissimus verriginosus.

Decimum: pomum odorandum laudani depurati, ligni aloes, vel belsoini, stiracis ana ʒ. ij. galangæ, nucis muscatæ, seminis basiliconis ana ʒ. j. cum rosacea in qua sit tragacantha, parum moschæ, & ambra, componentur. Vel fiat ex Gallia muscata, item moschus solutus in oleo linino tribus guttis scilicet aut naphæ, mittatur in aures, aut saltem coctum cum eo, capiti imponatur lininum.

Vndecimum: Validius est oleum laurinum, & rutaceum. In flatulento autem dolore, sacculus ex millio, & sale

C iij                      torre-



torrefactis calefiat in tegula aspersa vino albo, & acri aceto. Vel ex masse, cortice citri, & gariophilis repleatur. Validior est linteus infusus in aqua vitæ calida cumnuce muscata fricato syncipite. Vel euphorbij, castorij añā ʒ. ʒ. in oleo naphæ, vel linino, mittatur in narem dolentem. Validius si crebro repetatur, & vnguatur locus melle calido, & inspergatur sinapi trito.

In antiquo autem dolore constituatur pileus ex betonica, rutæ, florum stachados (quod est rosmarinus) añā ʒ. ʒ. conquassatis. Vel emplastri apostolicon ʒ. iij. cum camomelino extendatur capiti raso. Validior est. Lotio radicum cucumeris asinini, absinthij añā m. ij. in aqua, & olei añā ʒ. j. fiat decoctio ex qua caput abluatur, & fex imponatur.

Duodecimum: in antiquo dolore benefacit septimo quoque die lotio capitis ex lixiuio decoctæ maioranæ, stachados, camomillæ, rosarum, saluiæ, cum agarici ligati in linteo ʒ. j. Magis autem roborat si lixiuio addatur ʒ. j. vini albi ante cænam.

Decimum tertium: sæpe adhibendus suffitus belsoini, styracis, thuris, sandalorum citrinorum añā fiant trochisci cum tragacantha dissoluta in aqua naphæ.

Decimum quartum: Sapo ad capitis læsionem. Saponis gallici optimi ʒ. ʒ. agarici ʒ. ij. iridis, gariophilorum añā ʒ. ij. camphora ʒ. j.

Decimū quintum: parat mulsa ad potum ex melle cocto cū aqua vigecupla. Vel coquatur aqua grata visui, & gustui cum aniso, cinamomo, & sacharo ligatis in linteo. Vel per manicam officinarum colletur.

Decimum sextum: Roborat in frigidis affectibus si tempore frigido septimo quoque die, in tempore autem temperato, si decimoquinto quoque die, sumatur optimi Mitridati ʒ. j. cum ʒ. j. conseruæ rosarum jejuno, tempore autem calido nō sumatur.

Decimum septimum: synapismus caricarum maceratarum



rum per diem in calida ꝯ. iij. feminis sinapis ꝯ. ij. carica per se exacte terantur, & item sinapi affuso pauco cremore dicto, & mixta in tenui linteo imponantur parti refrigerata, tanquam sacra anchora 2. local. citat. cum reliqua non prosunt, ita ut quaque hora inspiciatur rubor num exactus sit, quo tempore dempto, sinapismo fouenda est pars cum oleo calido, & si dolor vrget cum rosaceo: finis tractatus hujus.

## CAPVT IV.

*De Cephalalgia varia.*

**P**ost tractationē cephalalgiae, per proprietatē, agit de ea per consensum, & à varijs causis prodeunte, postremo adiciens remedium chyrurgicum in omni cephalalgia difficillima.

Aduerte primò: de cephalalgia per consensum. Membrū cui consentit, cognoscitur partim ex latione ejus, partim ex loco capitis dolentis. Nam apud Auic. tract. 2. cap. 7. si ex consensu ventriculi est, sinciput dolet; si ex hepate, pars dextra; si ex splene, sinistra; si ex renibus, occiput; si ex vtero, vertex; 6. eped. 1. videlicet, quia fit communicatio per rectum, ex traditis 3. tegni 2.

Secundum: humor lædens in ventriculo agnoscitur ex alijs signis, sed potissimum 1. 3. citat. & 13. 3. de dolore stomachi, ex eo, quod si bilis est, post cibum melius habet; si frigidus humor, deterius; licet accedat quod in fame quandoque frigidus exhalet, ideo magis lædit, & bilis post cibum innatat, quare plus offendit, sed illud prius est multo frequentius. Addunt quidam in omni dolore, ab humore ventriculi, statim ab assumpto cibo dolorem minui, sed parvissimum est illud spatium, discrimen autem dictum durat.

Tertium: si causa est bilis, ventriculi, vel visceris alicujus, immodicus calor, nil capiti remedij adhibendum est, 2. loc.

cap.



cap. proprio. Nec obstat quod in eodem cap. refert Galenus, causam ejus doloris per consensum, esse debilitatem, & acrimoniam sensus, in quibusdam quidem capitis, in alijs oculorum ad suscipiendos prauos halitus. Quare videtur commodum roborare partem suscipientem, vel caput. Quia sapissime Galenus significat sufficere vacuationem bilis à ventriculo, citra prouidentiam membri suscipientis, non quasi prohibeat talem prouidentiam; nam 10. therap. 2. docet in eo casu roborare caput.

Quartum: bilis saepe petit os ventris, nec obstat grauitas ejus, quia cum sit leuior chylo, innatat chylo, sicut pituita magis petit fundum; quiuis autem humor ventriculum pessime afficit, cum tunicis imbibitur, optime cum in fundo, modice in ore ventriculi, apud Galenum citat. Causa est facilitas aut difficultas vacuandi.

Quintum: ex Galeno citat. si facile vomit, ex tepida epota vomat. Si aliquanto difficilius, ex aceto, & tepida, in difficulter autem vomente, exhibendus est statim citra vomitum cibus boni succi, firmans ventriculum juxta præceptum 3. 1. doctrina 2. cap. 7. saepe ei qui vacuatione indiget conceditur, ut rem bonam largiter comedat, Cōmendat inter reliqua punicum dulce acida, maxime infuso pane, eo quod ultra vim firmantem ventriculum, detrudat deorsum bilem ventriculi, in quo vincit reliqua adstringentia, licet & illa cōmendet Haly 5. præf. cap. proprio, qualia sunt pira, poma cotonea, ideo autem præferto punicum mixtum, quia acidum offendit ventriculum, dulce non reprimat bilem. Sequentibus autem diebus ad expurgandam bilem ventriculi extollit Galenus decoctum absinthij, cujus 3. j. in octo aquæ concoquatur ad tertias, & addito saccharo sumatur jejunè; syrupus autem absinthij vulgaris plus calefacit, & roborat, minus expurgat bilem. In posterum autem consolvit, ut ad horam diei tertiam, vel quartam sumatur panis solum, vel cum palmulis aut oliuis. Potest etiam exhiberi panis cum conferva rosarum, vel sola conferva. Quod  
autem



autem concedit Galenus, panem cum obsonijs noxijs capiti, causa est, quia in causa ventriculi magnam vim habet suauitas; tum quia hic dolor est per consensum ventriculi, quare capitis pauca ratio habetur. Tralianus laudat cum pane pomum, & in maiori calore citrum. Ideo autem talia præcipiuntur hora diei quarta, vt interea expurgentur recrementa capitis à somno, quod male multi non obseruant. Ad vomendum tamen ex 7. meth. 11. multo plus sumendum est, quam ad dejiciendum, & multo amplius quam ad lædendam, eo quod est valentior operatio, & quia ita subuertitur ventriculus.

Sextum: si humor ventriculi frigidus est, præstat vacuare per inferna, eo quod fere magis petit fundum, & quia est validior euacuatio, innatans tamen commodissime vomitu exhauritur; si verò creditur humor imbibitus, praponit hyeram omnibus vsque ad 3. j. diminuto croco. In quo remedio considerandum est ex Ras. 1. continent. non esse vtendum hyera, nisi in materia frigida, vel ex toto, vel ex parte. Itē intelligitur ex parua dosi Galenū præbuisse hyeram quotidie suis agris instar decocti absinthii, per intervalla enim dierum 3. j. & 6. leuissime vacuat. Quod autem minuit crocum cephalalgicum, non tollit ex toto. Causa est, vt deferat vim medicamenti ad caput, sed oportet, vt substituantur vera aromata pro vulgari-  
bus spurijs.

Aduerte secundò: de dolore ex causa externa, cur ex insolatione, vel infrigidatione cerebrum plus reliquis partibus afficiatur, causa explicata est, debilitas naturalium facultatum cerebri lib. de phlebot. 8. & mollities ejus sūma; de partibus natural. 7. maxime in hominibus in quibus cerebrum amplissimum est, adhuc magis in pueris in quibus est humidissimum, vnde fiunt pueris syrtases apud Aët. lib. 3. cap. proprio, & mater puerorum 1. continent. cap. proprio: inflamatio scilicet cerebri frigidissima requirens medicamenta adiutoria.

Secundò: memorandum est præseruatorium ingens in ijs quibus insolandū est, ex 2. local. cap. de dolore capitis frigidus.

D

Spon-



Spongia lata, cava, densa, aqua imbuta, & valde expressa capiti imposita.

Tertiò colligendum est: quod à causa externa, licet immateriali quandoque oritur morbus capitis materialis, vel per compressionem à frigore, vel per liquefactionem à calido, imò & quandoque à frigore externo calidus morbus materialis, quando exprimitur humor calidus: & à calore externo frigidus materialis, quando è conuerso accidit.

Quartum: colligendum est ex Auic. tract. 2. cap. 1. quod etiam in morbo immateriali capitis, presente plenitudine, vacuandum est, tum quia vacuatio humoris contrarij temperat, tum quia ob præseruationē à periculo imminenti diffussionis gratiā doloris.

Aduerte tertio: Remedia quinque extrema in affectibus capitis, & fere in aliarum partium affectibus difficillimis, quibus addenda sunt tria alia chyrurgica.

Primum: post sufficientem vacuationem totius, & alterationem membri gignentis cacochymiam, purgationes sine custodia singulis mensibus repetendæ. Secundum: synapismus. Tertium: Garici sumptio. Quartum: balneatio thermarum, vel totius, vel partis affectæ, & potio earundem thermarum. Quintum: hemorrhoidum crebra prouocatio cum arundinibus, nam post aliquot vices sponte fluent, & ablatis arundinibus sustinentur cum decocto cainomillæ. Ex chyrurgicis autem remedijs. Sextum est vesicatio circa locum affectum, est autem mite vesicatorium. Flores & folia zambuci trita, decem horis imposita. Vel saponis vulgaris, calcis viuæ aqua mixta. Validius: cantharidum abscisis alis, & capitibus 5. j. fermenti 3. ij. cum aceto schilino. Vesicatorij autem quantitas sit castaneæ, post vesicatorium autem rumpantur, & conseruentur aperta per dies quadraginta superposita carica. Si autem morbus in capite est, vesicatorium comodè exhibetur in conjunctione capitis ad collum, ytrinque. Ad eundem scopum tendit in affectibus capitalibus perforatio pulparum auris, immisso per



per foramen cortice thymelea diebus dictis, vel saqueatio in collo posteriore, vocant sedaginum; diuertunt talia, vacuant, roborant.

Septimum est interceptio fluxus, scilicet sectis vasis, per qua deferitur materia 13. therap. in fine, ita vt parua vasa scindantur, venae autem magnae, vel arteriae post cutis scissionem volsella eleuantur, & vtrinque ligata per medium secantur, sed securius remedium est si vniuersa vrantur.

Postremum remedium cauterium est. De quo tanquam de difficili remedio obseruanda sunt praecepta tredecim.

Primum praeceptum: magna lis est inter Autores priscos, & recentiores, num conueniant in affectibus capitis, & aliorum partium. Commendantur enim summe Auic. cap. 29. & Mes. cap. de catharro, & Rasi, & Herculano cap. de cephalalgia, & podagra, & cum iuramento frequentissimi successus. De quo valde contendit Fumanelus lib. de capitis vstione, scilicet quando materia intro fluit, & periculum est de caecitate, vel suffusione, vel tabe, propter malignum catharrum. Causae sunt, quia cauterium emendat intemperamentum frigidum. Secundò: quia euacuat. Tertiò: quia diuertit. Quartò: quia adurit vas per quod humor fluit. Sed apud Tral. cap. de epilepsia, plus affert supplicij, quam auxilij, & Galenus ommissit cauteria; quare merito timentur à multis, eo quod futurae saepe sint immodicae, laxae, ita vt per apertum locum valde vitietur cerebrum, saepe etiam exeuntia vasa, connectentia pericraneum caluariae magna sunt, quare offenduntur. Adde quod locus futurae, non est idem in omnibus, licet scribant sumendum esse, si imponatur imus carpus medio superciliarum, & extendatur medius digitus, vt locus terminationis intelligatur coctus duarum suturarum coronalis, & sagitalis, quod vt est frequens, ita non perpetuum. Cum ergo cauteria quibusdam valde profuerint, quosdam valde laeserint; nec facile agnosci queat laxitas suturarum, nisi forte masticatione, praestat contetum esse masticatorijs in capite, & in crure vesicatorijs è directo partis affectae,

D ij

maxime



maxime si primarius locus est infernus, etiam, si pars vtraque capitis affecta est, in vtroque crure fiat. Potest etiam infra humeros simili proportionem adhiberi.

Secundum: non fiat, nisi cum reliqua remedia non sufficiunt. Nec tamen spectetur morbus incurabilis, ut pthysis, vel suffusio confirmata quæ in talibus frustra adhibetur. Tertium: non penetret ultra cutim in carnosus partibus, in capite verò, ob caluariam interpositam, ad caluariam accedat, sed paulatim & non semel. Quartum: circumstantes loci prius succis reprimantibus defendantur. Quintum: hora diei sit temperior, & æger commodè locetur. Sextum: si valet sensu, prius stupefiat locus narcoticis. Septimum: cõseruetur apertus locus dies quadraginta, cum pila cerea, vel folijs brassicæ dictis. Octauum: non fiat in causa mere calida. Nonum: locus cauterizandus prius signetur. Decimum: non fiat cum materia induruit, sed cū pars laxa est, & humida.

Vndecimum: clauso foramine, per interualla crebro vacuetur, vel rursus aperiatur vesicatorijs crebro innouatis, aut ægipfio imposito prohibeatur consolidatio, si affectus est diuturnus etiam per annum, si periodicus perpetuò; si nec diuturnus, nec periodicus per mensem.

Duodecimum: cum cauterium roboret partem proximam in capite prae affecto quinque adhiberi possunt, aliqua ex illis, videlicet in coronali, in lambdoide, in secundis mendois, in iunctura colli. Ex quibus tutior est iunctura colli, eo quod non lædit cerebrum, & si quidem affectus obsidet caput per proprietatem, sola hæc curat. Si per consensum, benefacit, & cauterium in parte consentiente, sed multo magis primario in affecta parte, in reliquis autem partibus præter caput, si adhibeatur gratia interceptiendi fluxus, imponendum est in loco medio inter partem affectam, si adhibeatur gratia fluxus humoris infra partem affectam, imponendum est.

Decimum tertium: in omni affectu dicto, confert apud plurimos aperire infra humeros, vel genua digitis 4. parte externa



terna ad reuulsionem. Sed Fumanelus proprio opere de vstione capitis, non recipit, quia saepe non succedit propter longitudinem à vijs fluxus. Verum cum saepe succedat, & in affectibus capitis, sit multo incolumius, recipiendum fere est.

Aduerte quarto: de cephalalgia melancholica. Primo, victus sit humidus citra obstructionem, in actiuis verò pro varietate humoris varius. Nam atra bilis 3. de causis sympt. 2. frigida est, sed caloris non expers, fere autem si genita est ex calido humore, & recēs est, vincit in eacalor. Si ex frigido humore, & antiqua, frigus. Sumat itaque mane perpetuo oua sorbilia, fugiat acida, & salsa, quæ & vniuersum caput ladunt ob mollitiem cerebri. Secundo, coquentia attenuent, & modo resoluant, modo humectent per intervalla in omni melancholia 3. 4. cap. de schyro, ne induretur. Tertiò: purgatio explicante Mesue, habeat tria vniuersalia præcepta. Vnum; vt non semel vniuersus humor vacuetur, tum propter rationem vniuersalem, quia oportet vacuationem regulet natura, non naturam vacuatio; tum propter particularem, quia talis vacuatio instar flammæ consumit tenue, demittit crassum. Secundum præceptum purgationis, ex eadem causa non sint fortia purgantia, sed benedicta.

Contra tamen videtur scriptum 4. aph. 9. & 14. theor. cap. 17. quod omnium humorum difficilime vacuatur atra bilis, ita vt scribatur lib. de purgat. med. facult. quod in humore etiam crasso prius vacuatur pars tenuis, quam crassa. Dic: hoc præceptum Mes. supponit illud Hipp. scilicet quod licet fortiora cōueniant melancholiæ, quam reliquis humoribus, verum ob timorem impetuosæ vacuationis, ne crassum lapidescat, temperatur ea vehementia.

Tertium: non adhibeantur talia purgantia sola, sed consolata cum humectantibus, & odoratis, ideo bibita commodiora sunt in omni melancholia.

Quartum: nunc cerebra gallinarum præsertim roborent cerebrum, vt ex apocripho Galeni de iuuantibus, & no-

D iij

centibus,



centibus,, sed aperte Raf. cap. de diuisionibus, & 1. 3. tract. 2. cap. 26. in hamorrhagia narium ex percussio cerebro cibant perpetuo cum cerebellis: & cerebra passerum, creduntur facere ad libidinem propter alicionem cerebri à quo multa prodit genitura. Sic ossa capitis humani benefaciunt apoplecticis, pulmo vulpis, pthysicis, ventriculus gallinæ, humano; hepar lupi, hepaticis; intestina lupi, collicæ, renes, renibus 18. 3. de debilitate renum, & ossa humana, podagricis 22. 3. cap. 13. in fine, & 5. collect. cap. 19. in principio. Quodlibet membrum roborat sibi proportionale, & rationale est propter similitudinem substantiæ.

Non obstat quod cordis esus non roborat cor; quia robur cordis requirit multum calorem, qui omnino deest in corde mortuo. Nec obstat quod Galenus negat 11. simp. de ventriculo gallinæ, quia solum negat sanare dolorem ventriculi, quia tamen tanquam expertum conceditur ab Isac, & alijs.

*Remedia Cephalalgia varia.*

**P**rimum: digestium in melancholia non frigida, hoc modo tribui potest, ℞. syrupi de fabor, siue buglosi compositi, vel borraginis, vel de borrag. simp. facto cum sacharo 3. ij. aquæ buglossæ, & mellisæ ana 3. j. & β. misc.

Secundum: digestium in melancholia frigida. ℞. syrupi de epythimo 3. ij. decoctionis betonicæ, & saluæ 3. iij. misc.

Tertium: purgatio in melancholia adusta. ℞. confectio- nis hamec 3. iij. β. in sero. Vel decoctionis florum cordialiū, cum cassiæ pulpa 3. j. Vel in bolo cum sacharo. Vel pillularum fumaris 3. j. Validius, si addatur radicis elebori nigri 3. β. cum julepo violarum.

Quartum: purgatio in frigida leniens. ℞. diasenæ 3. j. cum sacharo fiat bolus. Validior est additio agarici 3. j. β. aut pro agarico hyeræ logodij 3. ij. in bolo, aut decocto melancholico, vel pillularum de lapide lazuli constructarum 3. j.

Quin-



Quintū: purgationes sine custodia bis in mēse repetendæ ex his possunt ordinari. Senæ, epythimi, polipodij añā ʒ. j. diagridij gr. iij. gingiberis, macis añā gr. x. sachari ʒ. ʒ. in ouo forbili, vel in jure pullæ. Alia: pulueris senæ ʒ. ʒ. in jure pulli. Vel pillularum indarum ʒ. j. Vel jus galli veteris, cum quo coquatur polipodium, semen carthami (quod est crocus siluestris) finiculi añā ʒ. ʒ.

Aliud in frigida melancholia. ʒ. epythimi ʒ. vj. agarici ʒ. iij. corticum ellebori nigri, pulueris hyeræ añā ʒ. ʒ. cum melle rosato fiant pillulæ.

Aliud in melancholica adusta. ʒ. mirabolanorum chebulorum, indorum, citrinorum añā ʒ. iij. ellebori nigri ʒ. ij. agari ʒ. ʒ. aloes ʒ. vj, epythimi, foliorum senæ, polipodij añā ʒ. j. puluerata misceantur succis fumarie, borraginis, chamedrio (quæ est parua quercus) añā ʒ. ij. & ex liccato formentur pillulæ cum syrupo fumarie.

Aliud si magis placet infusum. ʒ. foliorum senæ, epythimi añā ʒ. ʒ. polipodij ʒ. j. ʒ. glycyrrisæ ʒ. j. nocte macerentur in jure pulli pingui, vel sero caprino calidis, mane expressum addito sacharo bibatur.

Aliud conueniens expurgandis facibus melancholicis post integram vacationem. ʒ. mirabolanorum omnium añā ʒ. ʒ. contusa crasse, & manibus fricata cum amigdalino infundatur die, ac nocte in aquæ fumarie lb. x. postea coquantur ad 3. partis consumptionem, tunc adde radicem ellebori nigri ʒ. ʒ. liquiritij, polipodij añā ʒ. ij. feminum citri ʒ. ij. & ʒ. bulliant donec remaneant lb. iij. collatum, & expressum feruetur. Sumatque quotidie, vel alternis diebus pro varia operatione ejus decocti ʒ. vj. syrupi de fumarie, & rosati ʒ. j. & ʒ.

Sextum: in melancholico dolore benefacit lotio capitis, ex decocto capitis castrati (cerebrum propter nimiam humiditatem, & laxitatem omittatur) & cum bullierit, mittatur buglosa, borrago, & sena. Item vnguatur caput rasum cum amigdalino, vel cum lacte.

Septimum:



Septimum: roborat caput melancholicum confectio florum naphæ, vel stachados, vel buglosæ, vel radices earū conditæ. In frigida aut diambra, aut diamuscum. In calida addantur corali rubri, & santali citrini, & cum sacharo soluto in aqua rosarum fiant rotulæ pendentes drag. ij. quarum duas jejunos sumat.

Octauum: in sano, cephalalgia repentina valida sanatur cum opha in vino lymphato, vinum namque detrudit bilem, reprimat, & roborat ventriculum. Si talis cephalalgia fiat bile existente in ventriculo, & si creditur humor non sufficienter calidus, vinum sit merum.

Nonum: si accidit post expergesationem, cibo sanatur ex 1. continent. quia nocte præcedente, materia multum coxit, & propterea ventriculus traxit à locis vicinis excrementa generantia cephalalgiam.

Decimum: in hæmiorania sax attramenti scriptorij cum aceto repetita, & in pulsante, ruta, mentha, panis, rosaceum vinum imponatur. Si non cessat, rade locum, & impone hyrundines, & scarifica dorsum 1. continent.

Vndecimum: in quavis cephalalgia calida imponantur nuclei persicorum cum rosacea, & lacte: in materia autem mixta aloë cum oxyrrhodino apud Rasium.

Duodecimum: in antiquo dolore maxime calido. Calchytidis, gummi mirrhæ ana partem j. aluminis mediam, croci vj. calcanthi iij. illine ex posca apud Tralianum, & Galenum.

Decimum tertium: in dolore febrili ab initio phlebotomia, post septimum cucurbita in occipitio ex 2. local. cap. proprio, & si viget copia humoris in capite lædunt epythemata valde frigida. Si verò peccat humor, qualitate benefacit, ut inquit Auic. 1. 4. cap. de dolore capitis, sed fontalia, & errhina frigida conueniunt. Caput foueatur decocto tepido camomillæ, melliloti, rosarum, & affusione aquæ calidæ supra extrema bis in die,

Decimum quartum: in critica cephalalgia oriandum. Si  
autem



autem tentata crisis cessat, leuissime iuuetur; si non succedit  
transacto decretorio, vacua.

Decimum quintum: in dolore ex obstructione, post purgationem deobstruentia valida praebeantur, & rursus si intemperies est calida, succedant refrigerantia, & denuo reuertendum ad deobstruentia calida. Deobstruens Galeni melanthium pulueratum in succo sampsuccii, & illine nares intro, post suffitum stachadis decoctæ.

Decimum sextum: in dolore frigido antiquo oleum decoctæ verbenacæ cum mille pedis peruso capite.

Decimum septimum: in dolore ex multo cibo, aut potu, vomat ex copiosa calida.

Decimum octauum: ad caput humidum reumatifans 7. quoque die jejunos mandat, & sensim diglutiat Rabarbari 3. β. & postremo die abluatur caput ex lotione cephalalgæ pituitosæ. Perpetuo autem surgat diluculo, & incibatus expurget excrementa omnia, & exerceatur, & ab exercitio sumat calefacti saccharum rosaceum cum pauco melle, in frigidati autem cum plurimo, sensimque mandat, tum ob dentium emendationem vertendo per ambas maxillas; tum ob vaporem communicandum capiti suauem, & roborantem nullo potu sequente; jejunos saepe mastice frustulum macis, & diglutiat succum ad conciliandum robur membris, & absumentas putres humiditates. Confert etiam ut singulis hebdomadis dormiturus diglutiat aloes 9. j. redactum in pillulam j. cum vino odorato. Confert etiam, ut mane sumat chebulum vnum conditum, & perpetuo gestet manibus pomum odoratum cephalalgæ pituitosæ.

Decimum nonum: præseruatorium ab ebrietate. ℞. seminis caulis 3. ij. in syrupo omphacij; facit autem odium vini, apud Tacuinum decoctæ vitis cum folio vitis, aut cum toto fructice exhibitio vini. Finis tractatus de Cephalalgia varia.



## CAPVT V.

*De Vertigine.*

Incipit, Cum aliquis, &amp;c.

**C**urationem vertiginis in tres species diuidit. Primo: sanguinea à toto, Secundo: per consensum à ventriculo, & Cum autem. Tertio: per proprietatem. & Si autem.

Aduerte primo: de speciebus vertiginis distinguendis; in epilepsia, & melancholia numeramus species tres. Per proprietatem, à ventriculo, per consensum aliunde. Causa est quia extremè variatur curatio ex ijs differentijs. Nā si ex proprietate est, solius cerebri ratio habenda est. Si ex ventriculo, particularis curatio conuenit per vomitum, & mitem purgationem. Si per consensum alterius membri purgatio sanat. In vertigine autem ob faciliorem traditionem curationis distinguunt tantum in vertigine per proprietatem, & per consensum à ventriculo. Secundo: per proprietatem ventriculi similiter, & per consensum à ventriculo, quædam calida est, quædam frigida. Per consensum autem à vasis totius, solum est sanguinea, eo quod vapor non comunicatur cerebro, à frigido humore totius, qui indicat motum illum contumacem spirituum, sicut frequenter comunicatur inducens epilepsiam, vel maniam. Tertio: ut comprehendat omnem vertiginem inter signa, inquit, cum cadere voluerit; nam si læsio magis vergit ad posteriora cadit, & distat ab epilepsia per defectum conuulsionis, sin magis vergit anteriorum ob circularem motum spirituum, non descendit sufficienter ad membra sustinenda; quare redditur proximus casui.

Quarto: distinguit abundantiam sanguinis in capite à vaporibus sanguineis, communicatis, per hoc, quod vapores rubefaciunt faciem, sanguis verò cerebri inflat vasa oculorum, & retro



retro aures. Causa est quia flatus sanguinei in spongiosa maxillari carne retenti inficiunt gennas rubore, quod in peripneumoniacis, & pleureticis videre est.

Adverte secundo de curatione. In constitutis in accessione; fricentur extrema, odoretur acre acetum, & peucedanum ad exercitationem, serueturque in obscuro. Secundum: transacta accessione si sanguis abundat, phlebotometur magis, quam in alijs affectibus sanguineis, eo quod in illis sufficit, copiam sanguinis auferre: hic verò etiam vapor sanguineorum, quod est multo difficilius, & si affectus est per consensum, magis phlebotomandum est vas respiciens membrum primario affectum, minùs vasa capitis. Si verò est affectus per proprietatem, vasa capitis secanda sunt, scilicet cephalica, retro aures, frons, tempora, vel imponentur ibi hyruidines, transacto tamen ex toto paroxismo ex Paulo, & alijs. Licet Gradenis hic citans Nicolum, dicat faciendam esse phlebotomiam in accessione in duobus casibus. Scilicet quando accessio est longa; vel quando non apparent venæ extra accessionem. Sed rarissime cogit nos ad id longitudo accessionis, & venæ, si non apparet in collo, apparebunt alibi. Nec Rasis hic docuit, quod durante accessione fiat.

Tertium: Aët. docet, non esse exercendam simultaneam phlebotomiam, sed paucam repetitam, & imposito prius oxyrhodino capiti, eo quod timet elevationem vaporum, agitato per phlebotomiam sanguine; ad quam cautionem sorbentur statim à phlebotomia, aquæ endiuivæ 3. vj.

Quartum: resolutio contentorum vaporum in capite, maxime cum non est per consensum fit prauacuato corpore, suffitu decocti camomillæ, stachados, maioranæ, & leui capitis frictione, & frequenti lotionem extremorum in calida.

Quintum: sectio venarum retro aures, securior est quam arteriarum, & quam cauterisatio; fere autem curat, cum affectus est per consensum ab inferioribus, & per extrema vasa communis. Si verò est per proprietatem, & consensum exteriorum vasorum

E ij

ali-



aliquid iuuare, verum non plane sanare. Cauterizatio autem periculum habet ne semen fiat paucum, & parum foecundum, cum per ea vasa plurimum descendat à capite lib. de genitura, & de aëre, aqua & locis: scilicet quia à capite plurima genitura prodit, cum spiritus perfectissimus inde manet; perfectissima autem vis est informatrix. Argumentum est quia coeuntes nitant, & oculis cauantur, caluescunt, & cerebro minuuntur. Quare, vel omittatur ea cauterizatio, vel secundum unam tantum aurem fiat.

Sextum: si consensus tantum à ventriculo est, primo vacuat Rasis per vomitum id quod innatat. Deinde purgatione sanat imbibitum.

Septimum: si per proprietatem humor in capite est, & frigidus, iuuat per valida crebro; per valida quidem, quia humores crassi sunt ex remotis vacuandi. Crebro autem, quia non solum intendit vacuare, sed & reuellere. Constat autem ex lib. de phlebotom. saepe cum scopus est vacuare, semel vacuandum esse; cum reuellere, crebro vacuandum esse. Quare in fluxu sanguinis narium 5. therap. 3. quaque hora phlebotomat, & vulgo in phlebotomia reuellente crebro imponatur digitus vasi aperto. Oportet autem in purgantibus habere rationem motus humorum, ne agitentur. Quare semper conuenit permixtio adstringentium, mirabolanorum, Rhabarbari, & succi rosarum.

Aduerte tertio: de visu præceptum primum. In morbis quibus imminet casus, cauendum est à locis, quibus periculose corruiat ager, scilicet scalis, igne, flumine, fenestris, nec respicienda sunt valde ima, nec remota, nec splendentia, vniuersa enim hæc spiritus agitant. Cur autem eiusmodi quando inspicuntur intente magis agitent, quam si sint tantum præsentia, & non inspecta; sicut ophthalmicus inspectus magis inficit insipientem, quam præsens non inspectus. Causa est, quia radius visorius, siue exeat à re visa, siue à vidente, desert secum materiales qualitates rei inspectæ inficientes videntem. Abstineat etiam à cogitatione rerum dictarum, species enim rerum externa-

terna.



ternatum similiter externis immutant corpus lib. de causis motus animalium. Vitet inclinationem capitis, vt scribere, depingere, suere.

Secundum: flatulentia omnia, & aromatica pessima; quare lentes vniuersaliter reprobantur Constantino, eo quod 2. canonis, in ipsis est inflatio plurima, praterquam quod est prauis succi, inducens mala somnia, apud Auicena citat. Quod si à Raf. in diuisionibus laudantur, intelligatur in calida vertigine, eo quod incrassant sanguinem, & prohibent agitationem eius.

Tertium: vinum maxime noxium est, quia flatulentum, & petit caput, & calidum est. Conuenientissima frigida aqua ob incrassationem spirituum, & repressionem vaporum, ita vt apud Auic. 1. 4. cap. de alui dispositione, prauia ad vertiginem imminuente, accessionem prohibeat frigida epota. Aetius verò concedens paucum vini albi pauciferi, in declinatione intelligatur, vel in valde assuetis.

Quartum: ad resolutionem vaporum in frigida vertigine commendatur somnus supra inanitem, vel famem, & in calida acida, & austeri prohibentia feruorem sanguinis, vtrobiq; autem paucitas cibi, & potus; & clausio mensæ cum reprimentibus flatum, post quæ non superpotetur.

*Remedia Vertiginis.*

**P**rimum: in calida vertigine reuellentia, & post resoluentia cephalalgicorum cum aceto, Paulo Autore ob dissolutionem flatuum.

Secundum: in calida purgatio cephalalgia biliosa, vel mabolari citrini ꝑ. j. & ꝑ. pruna xx. confracta in aqua bulliant collaturæ, adde succi rosarum Alexand. ꝑ. iij. cum saccharo. Vel feri ꝑ. vj. Rhabarb. ꝑ. j. ꝑ. succi rosarum ꝑ. j. collatum maneat cum saccharo.

Tertium: in prodeunte à ventriculo facilius est vomitus, & præ-



& prastantior post cibum multum, & potum, varium, scilicet salum, lentum, acrem, à quo post horam vnam, non quiescente agro sumatur vomitorium, vt ℥. oximellitidis simplicis, vel validius schylitici ʒ. j. & β. decocti ʒ. ij. misce. Decoctum ita paratur. ℥. Radicum raphani ʒ. j. assari, seminis anethi añā ʒ. β. in ℥. aqua ad tertias cum croci triti ʒ. j. interposito spatio pauco, immissa penna cum oleo vomat.

Quartum: in prodeunte à ventriculo, purgatio mitis ne euocet à longinquo, per elephanginas ʒ. j. & β. Validius per stomacichas ʒ. j. adhuc validius per cochias ʒ. j.

Quintum: gargarisnata, & malticatoria cephalalgicorum. Validius passularum, glicirisa, hyfopi añā ʒ. iij. cireos, galanga, maiora, añā ʒ. ij. zinziberis, piperis stat hif grianā, sinapis añā ʒ. j. crassa tussa in ℥. iij. coquantur ad m. Et sumantur coclearia duo ante prandium, & canam in ore, continuanturque diu, cum pauco mellis, aut oximelis schylitici. Sextum initium accessionis per consensum præsenuat vnctio epileptici secunda. Finis de Vertigine.

## CAPVT VI.

*De Phrenitide.*

Incipit, Cum aliquem, &c. Primo notificat affectum.

2. Curat. 2. Ægro igitur.

**A** Duerte: de aëre praeceptum primum. Aët. quoad temperiem non expetitur summe frigidus, ob resolutionis indigentiam, sed in hyeme tepidus, in aestate frigidus. Conciliatur frigus decursibus aquarum, linteis madidis, parietes, & fenestras opperientibus, calathis pomorum, & florum, arborum germinibus, aspersioibus rosarum. Domus etiam subterranea pareretur, ventis exposita 13. therap. 8. tabulatis tamen, vel lateribus strata, 9. theoriæ 14. De lumine autem contendit Asclapiades

piades oportere esse luminosum, eo quod vasa interna in externa luce evanescent, qua de causa somnia vigilantibus non accidunt, quomodo lux facis ad solem marcescit. In tenebris phantasmata interna, pro veris accipiunt, quare magis insaniunt.

Respondet Aurelianus: plura phantasmata eorum, habet ortum ex externis speciebus, quam ex internis, videntur enim terreri etiam ex notissimis. Praestat ergo non habere lucem ad percipienda externa, quam habere, ut non percipiant interna, nisi in ijs, qui magis vigentur internis, & tales, ait Aet. lucem appetunt. Quare ita temperandus est aer quoad lucem, ut qui ad lucem efferuntur, in tenebrosa domo decumbant. Qui vero ad lucis splendorem resipiscunt, in lucida domo degant, citra picturas tamen, & multorum praesentiam. Magna tamen lux perpetuo fugienda est. Nam uniuersaliter dolentibus caput inimica est. Quare fugienda sunt, radij solares, fascies accensae, flamma ignis. Addit Aurelianus: sint vultus agrorum auersis januis, & fenestris, ne intueantur ingredientia, camera ampla, ne caleat; procul a via, ne praetereuntium strepitus irriteretur, fenestrae altae, & custodiendae, ne se precipitet; raro admittantur quos reueretur, ne frequentia pariat contemptum, qui leniter ferant irrogatas injurias, & enim immodice redarguant, ne exasperentur, sed quibusdam assentientes, alia redarguant.

Aduerte secundò de victu. Oportet esse valde tenuis, cum morbus sit acutus, & à toto genere latalis i. praef. 23. observatio autem horae afflucta est praecipuum i. acut. 19. Quo loco respondet Galenus calumniantibus victum Hippocrati. Quidam enim redarguebant quasi immodice alentem, eo quod comm. 19. cibabat juxta numerum cibationis sanæ. Alij culpabant quasi inedia necantem. Quare citat. 44. cōseruat agrum incibatum 9. dies. Verum Galenus ait, licet Hippocrates obseruet numerum cibationis sanæ, exhibet tamen paucissimum alimenti, oxybaphum ptyfanæ, 4. partem cōstila. Constat autem ex Paulo lib. de ponderibus, cōstila heminam esse latine pondus mellis 5. xij. & s. quare oxybaphum mellis latine

ace-



acetabulum, capiet  $\bar{z}$ . iij. &  $\bar{z}$ . iij. Cum aut ptyfana minus, quā mel grauis sit, acetabulum ptyfana, quod Hippocrates singulis cibationibus exhibebat capiet pōderales  $\bar{z}$ . iij. Locus enim 9. localiū in pastillo Criffeli afferens oxybaphum continere  $\bar{z}$ . j. merito creditur à Cornario corruptus. Verum ea quātitas varianda est pro agri, & morbi varietate. Est autem commodissimum alimentum panata  $\bar{z}$ . j. seminum frigidorum, seminis papaueris albi  $\bar{z}$ . j. & sacharo. Item panis lotus primò in frigidabis, mox in rosacea lotus super asperso sacharo. Si verò feruor vrget etiam medulā peponis, & duracini concedit Paulus, & lactucas crudas, lac autem amigdalarum semper est suspectum, & magis in nocte, cum recurrunt ad caput excrementa. Præcipitur item in victu, vt paulatim deducantur in victum sanorū, facile enim recurrit affectio ait Aurel. Quare licet 1. acut. 25. spectet post crism solos duos dies, in quibus non recedit à victu morbi, eo quod acuti morbi omnes, vel per pares, vel per impares mouētur, quare intra duos dies, si nihil succedit noui, certa est salus. Vniuersaliter aut 2. 4. tract. cap. 107. aliter 101. spectari iubet primū decretoriū sequentē. Ras. 10. ad Almanforem 1<sup>un</sup>. accessionem sequentem. Haly tamen phreneticum dixit, continendum in victu morbi dies 33. Zoar. tract. 16. cap. 3. dixit 40. dies. Qui loci postremi, vel sunt corrupti, vel explicant terminum vsque ad quem phrenetici solent recediare, non quod victus morbi eo vsque debeat obseruari.

De potu autem: frigida infesta est ratione tum inflammationis, cum omni inflammationi noceat: tum ratione membranarum cerebri, quæ percutiuntur aquæ frigiditate; temperetur ergo, vel mixtione julepi rosacei pauci, vel succo punici, vel macerato ibi pane torrefacto ex Haly. Verum quia phrenetici natura sua pauci bibuli sunt, si afferatur illis frequenter vinum in initio summopere noxium, in assuetis tamen quorum ventriculus frigidus est apparente coctione valde dilutum, pauciferum præfert Tral. eo quod somnum inducit, nam vel non succedit alienatio naturæ, vt pote declinante jam morbo ait Paulus;



Paulus; vel succedens facile diffleret, in reliquis naturis interdendum est vsque ad integram sanitatem.

Tertium præceptum: quies maxime procuranda est consilio amicorum, quos reueretur, metu, vinculis. Ratio Pauli, quia continuus motus conuellit vires; adde & quia summo opere impedit coctionem morbi 4. acut. 48. Tertiò, quia reddit species multo mobiliiores, quare ad somnum ineptiores, sicut contra, quies prouocat somnum. Addit Aurelianus: firmiter componatur lectus, ne vacillet iactationibus ægri. Caput verò contra ritum reliquorum affectuum capitalium, non locetur sublime, quia is decubitus eos perturbat, humile apud Orisbanum lib. 6. cap. 1. & si insania est immoderata vincula molliter membris injiciantur, sed prius testis lana, nam immodice ligatis succedit tumor.

Quartum: somnus omni ingenio procurandus est, ita vt initio accessionum apud Nicolum; procuretur autem silentio, cantu leni, sonitu aquæ molliter cadentis in æs, & per remedia somnifera.

Aduerte tertiò: de phlebotomia. Præceptum primum, fere conuenit phlebotomia, quia non solum conuenit gratiâ vacuationis, & refrigerationis, quæ febris exposcit, sed multo magis gratiâ reuellendi, & prohibendi confirmationem inflammationis, & eo magis quo confirmata est à toto genere lethalis. Quare in phrenitide, pleuritide, & in inflammatione quauis viscerum fere phlebotomandum est in initio. Duo tantum casus raro prohibent phlebotomiam. Primus, quando pendet à bile nullo modo permixta cum sanguine, & in sanguine est diminutio. Nam deficiente magis sanguine per phlebotomiam, non concoquitur, sed effertur bilis, quo casu purgatio mitis initio conuenit, & est exhibenda. Secundus, cum phrenitis succedit ad alios morbos, cum prostratæ vires, non tollerent sanguinis missionem. Nam in morbis maximum vnum est subsidium saluans robur virium. Quare à phrenitide magis euadunt iuuenes, & pueri potissimum robusti, non senes & inualidi.

F

Secun-



Secundum: de quantitate Aët. & alij præcipiunt, vt minus, quàm pro copia vacuetur gratiâ motionum, & vigiliarum sequentium. Verum in initio ad reuulsionem, cum instet morbus lethalis, præstat egregie vacuare, ita vt prope accedatur ad deliquium. Quare pulsus, phlebotomiæ tempore, tangendus est ex lib. de phleb. 12. scribitur autem signum in pulsu virium adhuc robustarum lib. citat. cap. 13. in capite autem est signum virium, non tollerantium ampliorem missionem. Verum hanc copiam non oportet semel vacuare, cum enim scopus sit reuulsio magis quam vacuatio, eo magis præstat quo numerosior est, lib. citat. cap. 12. in fin. & quia celerrime subueniendum est, præcipit Auicena, quod sequatur clister ad phlebotomiam, quasi significans, quod nec clister spectandus est ad phlebotomiam.

Tertium: de loco phlebotomiæ; licet vulgo dicatur secandam esse caphenam in casu magnæ plenitudinis totius. Vel secundo quando causa plenitudinis est suppressio fluxus inferni consueti hemorrhoidarum consuetarum. Vel tertio, quando credit communicari materiam à membro aliquo inferno, vt si præcessit morbus membri inferioris.

Verum cum hic quaratur in reuulsione magis velocitas, quam securitas propter imminens periculum confirmatæ inflammationis, semper à cephalica affecta incipiendum est, vel saltem cum Aët. à vena communi lateris affecti, in casibus tamen dictis conueniet secunda missio à partibus infernis, siue extrahatur per phlebotomiam, siue per cucurbitas, siue per hyrūdines, vt primò subueniatur per cephalicam vrgentiori affectui. Post vertatur curatio ad causam affectus, & hæc exequenda sunt fere intra triduum, quo transacto ait Aëtius, si facies rubet, & tumet, sufficienter per cucurbitas dorsi sanguis extrahatur, aut etiam ex vena frontis, quæ particulares vacuationes breuius repetantur, propter causam traditam 4. de sanit. vlt. Monendum est vt foramen sit angustum, & ligatura valida propter periculum sequentis hæmorrhagiæ.

Nec



Nec obstat contra phlebotomiam præceptum, quod 13. ther. vlt. concedit phlebotomiam in phrenitide, & letargo præfente copia crudi succi, & tamen 4. 1. cap. 20. tantundem impedit timor ebullitionis bilis, sicut incrudationis pituitæ, tamen in intemperato continente negat phlebotomiam. Dic ad primum: crudi succi magis debilitant, quam bilis, explicatum 2. de diatrijs feb. quare magis prohibent phlebotomiam. Verum non incommode additur ab Auicena, etiam timor ebullitionis bilis ad excusandam phlebotomiam, quare cum bilis esset mera, præstarent cucurbitæ in quibus non est timor feruoris.

Ad secundum, ex intemperamento continentis, quandoque prohibet à phlebotomia celebranda, quia tamen raro intemperies continentis sufficit ad illud, sed ad moderandum tantum qualitatem, dixit lib. de phlebotomia, 9. in fin. variari solam quantitatem mittendi sanguinis temperatura continentis, non simpliciter reindicare aut contraindicare phlebotomiam. Quare 4. acut. 19. non numeratur inter indicationes momentaneas phlebotomiæ.

Aduerte tertio: de purgatione. Conuenit vt gratiâ bilis permixtæ non taret euacuatio, & refrigeratio ejus leni purgatorio cephalalgia biliosa citra mirabolanos, & nisi copiosa dejectio succedat, in die lenitionis etiam phlebotomari potest. Syrupi autem cephalalgia biliosa, sed commode additur aliquid papauerici gratiâ vigiliarum, apparente autem coctione, repetatur lenitio prior addito Rhabarbaro, electuario de succo rosarum aña 3. j. scilicet cum non timeatur maior ebullitio ex pharmaco, quâ utilitas ex vacuatione, in principio aut rarissimè conuenit purgatio electiua, scilicet vbi concurrunt illa tria recitata 1. aph. 23. illis enim cõcurrentibus in principio morborum acutorum, & internarum inflammationum purgat Galenus electiue, antequam firmentur humores in aliquam partem 4. acut. 36. & 2. acut. 11. Camperius autem in vniuersum prohibet agris scamoniata, & omnia participantia vi deletheria.

Fij

Tor.



Tornamira autem licet in alijs concedat, in febre continua detestatur.

Dic: in febre continua non valida sæpe conueniunt, & cito sanant electiue purgantia, in valida autem febre non nisi rarissime; apud doctissimos tantum concurrentibus illis tribus citatis, tam apud Galenum hoc loco citat. quam apud Tralianum cap. de febre continua. Ad Campegium ergo, dic plurima de letheriorum vtilissima sunt lib. de theriaca ad Pis. cap. 12. & exitiosissima aqua, & ignis, moderato vsu salubria redduntur 3. de temp. 7. Nec est omittenda salus multorum ob noxam vnius, alioqui tota ars esset omittenda. Nam omne conjecturale quandoque errat. Non tamen vitur vir probus periculosis in morbo leui.

Aduerte quartò: de reuulsione. Præceptum primum, frequentes clisteres potenter reuellunt supra de cephalalgia, quare apud Auicenam frequenter sumantur. Numerat Gétilis tres vsus illorum. Primus est vacuatio fæcum, retinentur enim ob calorem febrilem affantem, & ob delationem bilis ad superiora, & ob obliuionem ex delirio procedentem. Secundus, retractus foliginum mordacium à capite. Terrius, infrigidatio membrorum naturalium infrigidatorum.

Quare oportet, vt sint refrigerantes, & leues. Succus beta, cassiæque commodè trahunt à capite. In adusta autem phrenitide adde violas, pruna enucleata, semina frigida, sal autem præstat omitti, nam obuiat intentioni infrigidandi, & humectandis; & Galenus. clisteri febrientium sal non addit n. therap. 9. Sed quia ob defectum bilis in intestinis phrenetici sæpe difficulter deiciunt, additur sæpe salis 3. j. aut altera, vbi autem scopus est multa infrigidatio Auic. addit in clistere aquæ endiuia 3. iij.

Sed obijcitur primò: durum videtur concedi scamoniam potandam, & tamen prohibere clisterem acrem. Dic: vtilitas clisteriorum lenium magna est, & intentio eos exhibendi nō est ad euacuandum, quia humor est in loco longinquo, sed ad reuel-

reuellendum, & infrigidandum, ad quæ clister acer noceret, quia inflammat, & vapores eluat. Turgatio etiam conceditur gratiâ vacuationis, & tunc solum quando cōmoditas purgationis præponderat noxam caloris pharmaci.

Objicitur secundò: ex 13. therap. 16. concedente in phlegmone hepatis clisteres acres purgantes. Dic: ibi conceduntur inflammatione declinante ad vacuationem, quia humor est proximus intestinis, & calor blandus.

Secundum: reliqua diuersio fit per frictiones, ligaturas, cucurbitulas, quæ omnia post phlebotomiam adhibenda sunt, & declinante accessione, apud Tralianum, & Auicenam; nam quia materia plurimum agitur ad locum affectum sua sponte, timetur ex diuertentibus major agitatio, quia potentior est impetus humoris, quam remedij reuellentis, quare apud Celsum lib. 2. cap. 10. mittere sanguinem in vigore febris, aut doloris jugulare est. ideo post casum spectamus ad phlebotomiam quietem humoris. Potissimum autem non cōueniunt frictiones, cum ager incipit conuelli, quæ tamen reuulsiones omnes, sicut & clisteres oportet esse frequentes, sed leuissimas, ne spiritus reddatur acrior.

Lotio autem extremorum varie traditur ab Autoribus, alijs per solam aquam calentem, alijs admixtis frigorificis; apud alios adduntur etiam narcotica, quia primi intendunt solam retractionem à capite; secundi remissionem etiam flammæ caloris; tertij prouocationem somni.

Aduerte 5. de localibus: præcepta varianda sunt juxta morbi tempora, ita vt initio sola imponantur repellentia; in augmento permisceatur resolutiuum subdominans. In statu paria sint; in declinatione excedat resoluens.

Nec obstat quod 13. meth. 20. commendat in statu perfusiones papaueris; quia intensio ad symptomata, & vigilia quandoque tanta est, vt auertat à regulari curatione morbi. Nā solutio Nicoli, quod Galenus ibi intellexit augmentū morbi, non quadrat, cū explicet Galenus in summo incrementi id

F iij

est



est in vigore symptomatum, in quo gratiâ morbi conueniunt mixta resoluentia, non narcotica.

Nec obstat secundò, quod scribit 2. local. 1. sect. 6. In vigore phrenitidis solum rosaceum conuenit, explicandum est enim, idest sine aceto, non quod per se sufficiat; nam ex Galeno ibi medicamentum status debet habere pares vires reprimendi, & resoluendi, rosaceum autem habet maiorem vim reprimendi. Vel dic: ad vtrumque objectum, quod hoc præceptum habet latitudinem; vel quod ibi per vigorem intelligit summum symptomatū, quod potest coincidere cum quouis morbi tempore.

Secundum: non placet Aëtio, vt imponantur actu frigida, sicut in calida cephalgia. Nam cum constet in phrenetico de plenitudine capitis, talia densando prohibent resolutionem; sed in æstate præcipit apponi tepida etiam repellentia, in hyeme modice calida. Auicena ergo præcipiens infrigidare in niue, intelligatur de primo principio, vel cum non subest in capite plenitudo.

Tertium: non oportet, vt perpetuo inhæreant capiti olea, nam ob prohibitam resolutionem parant lethargo, cum decocto ergo modice calido olei, & camomillæ, & rosarum pareretur exitus vaporibus.

Quartum: ob eandem causam quandiu adest copia resoluenda, non sunt tuta obstruentia, vt lac, & emboræ ex decocto capitis, caudarum, & intestinorum, quæ ad vigilias mitigandas conferunt, & cum qualitas est emendanda, & non copia resoluenda.

Quintum: ideo ex Paulo cum affectus fuerit longior omittere sunt somnifera, & substituenda resoluentia. Cur ergo vtimur oleo lento maxime, cum natura sua vapores ad caput ferantur. Dic: propter sedationem doloris partis inflammata. Nam 2. local. 1. sicut in phlegmone externa salo rosaceo vtimur, ita in interna permixto aceto. Præterea ob cerebri dignitatem, & frigiditatem timemus frigida citra oleum.

Sextum.



*Practica Medica.*

Sextum: si inflammatio comunicatur pericraneo, vel<sup>4</sup> cuti extremae imponenda sunt emollientia, ne reflectatur humor ad cerebrum, vel decoctum maluae camomilae, & vinctio camomelini cum axungia, quod si cessat extremus dolor, tunc intentio vertitur ad internam inflammationem.

Septimum: ex 1. local. cap. de dolore, & inflammatione in affectibus dolorificis qualis est phrenitis, statim post pura repellentia, admiscendum est ante resolutorium aliquod mitigatorium, vel coctorium quale est rosaceum.

Octauum: ex Aureliano. Cauendum est in perfusione, ne vnquam caput refrigeretur, nam densata materia duplat malum. Quare ita perfundendum est caput, vt prius redimatur vitta, & multae manus circumstantes simul ex pelui perfundant, & linteo molliter attrectentur, & cum suauitate siccetur.

Nonum Auicena: si pituita misceatur, quod cognoscitur quia quies est maior motu, vel quia soporatur omnino, interdicanter frigida. Nicolus praecipit, vt pro varietate humoris imponantur repellentia, in sanguinea quidem sicca frigida, in biliosa humida frigida, sed praestat valde adstringentia vitari. Nam 2. local. citat. hoc nomine prohibet succum solani, & Auicena commendat emborcationes infrigidantes, sine adstrictione.

Decimum: in declinatione si creditur delirium manens habere ortum ex immodico calore capitis, & spiritus, crebra emulsio lactis succurrit. In vi quidem valde defectu muliebris ob familiaritatem, in reliquis caprini. Verum oportet, vt abstergatur quaque hora spongia ex decocto camomilae, ob facilem corruptionem lactis, & lentorem eiusdem. Si autem causa delirii manentis creditur retentio foliginum, solae emborcae, ex hordeo, camomila, & maiorana sanant.

Aduerte sextò: de symptomatis, inter quae maxime momentaneum est vigilia, cui subueniendum est per soporifera cum considerationibus. Prima Aetij dentur in declinatione febris, nam in augmento sedunt propter fluxum humorum  
ad



ad viscera 2. aphor. 1. In statu autem turbant agrum cum febrem excitet, illa autem stupefaciant. Secunda, in valde debili caueantur intra, & extra. Tertia, non frequententur ob timorem permutationis in lethargum. Quarta, oportunior est hora somni, vigilia autem ideo pessima est in phrenitide, quia desiccet, & dementat, & impedit coctionem, & resoluit vires, quare non solum ratione signi, sed ratione causæ pessima est.

Nō obstat dictis, quod scribitur lib. de theriaca ad Pisonem 13. phreneticorum vires ex peruigilio resolutas, sæpe opium sanauit, quare videtur vtile, & in vi valde debili, quia prostratis viribus remedia debilitantia nunquā afferenda sunt, vt phlebotomia reuellens in hæmorrhagia 8. therap. 3. Si verò imbecillitas est infra prostrationem, exhibenda sunt, quare conjecturæ medici relinquitur, sicut & alia præstantissima remedia.

*Remedia Phreneticæ.*

**P**rimum, clyster cephalalgæ biliosæ. Aliud validius refrigerans ℥. maluarum, violarum, lactucæ añā p. j. in decocti ℥. j. adde aquæ endiuivæ ʒ. iiij. violacei, & validius nenupherini ʒ. iiij. sachari rubri ʒ. j. Validior redditur addita pulpa cass. vel diaprunis simp. ʒ. ʒ. & salis ʒ. ij. & remittente morbo electuari de succo rosarum ʒ. ʒ.

Secundum: ℥. syrupi rosacei, violacei, papauerini añā ʒ. ʒ. aquæ emulsionis seminum, vel endiuivæ ʒ. iiij.

Tertium: lenitio fiat, vt initio cephalalgæ biliosæ, quod si calor validior est per tres dies continuos, potetur mane quolibet tamarindorum ʒ. j. in aquæ endiuivæ ʒ. vi. semel bulliat, potetur decoctum cum sachari ʒ. j. Vel sumat mirabolanorum citrinorum ʒ. ʒ. parum bulliant in decocto, adde mannæ ʒ. j. ʒ. syrupi rosati alexandrini ʒ. ij. sedata autem agitatione adde rhabarb. ʒ. ij.

Quartum: soporifera sunt capita papaueris albi sub cervicali apud Aetium, aut coriandrum ante nares tritum. Validitas est



est lenimentum imponendum fronti, nari, carpis, volis, lac  
lactantis puellam, ouorum lutea, farina papaueris, vel populei  
℥. β. croci opij ana gr. iij.

Ad idem: crebra perfusio capitis, faciei, brachiorum, ti-  
biarum. ℥. violarum, lactucarum, hordei depillis ana p. ij.  
capita papaueris sex, in aqua decupla parum bulliant.

Ad idem: dormiturus potet papauerini ℥. ij. vel drag. j.  
seminis papaueris albi in panata. Vel paretur conditum con-  
seruæ violarum, borrag. rosarum ana ℥. j. bracteus auri quin-  
que, seminis papaueris albi ℥. j. pulueris margaritionis ℥. j.  
misc.

Quintum: localia in initio sunt oxyrrhodinum, vel ro-  
faceū cum succo lactucæ aut coriandri. In augmento pulmo  
agninus calidus, non tamen ante 4. nec post 14. ait Nico-  
lus, quia ante concitat fluxum, post verò non dissipat infixū;  
post horam autem vnā lotus in calida, & expressus repeta-  
tur. Validius: in instantibus vigilijs pullus calidus per dorsum  
scissus, aspergatur ℥. ij. seminis hyosciami, & imponatur. Va-  
lidius: columbi multi quaque hora permutati calidi, aut galli,  
aut catuli; nota quod vina debent esse illa animalia. Ad idem:  
perfusio camomilæ rosarum, majoranæ ana in aqua.

Sextum: si sitis, & linguæ nigredo vrgeat in phrenitide,  
subuenitur siccitati linguæ frequenti humectatione saculorum  
ex semine citoneorum in ore contentorum; item rosaceæ  
℥. iij. seminis psilij ligati in linteo ℥. ij. lauetur sape lingua,  
& os, sequatur absterfio lentoris, partim frequenti gargarisa-  
tione poschæ; partim virgula ex rusco, lingua manu compræ-  
hendatur, & radatur, vel cum sponsia paruissima imbuta ro-  
facea, & sale.

Ad ardorem autem, & excoriationem faucium, ℥. aquæ  
rosatæ, & pedum ejus, plantaginis & endiuia ana ℥. iij. ami-  
di, fabarum ana ℥. j. sachari albissimi ℥. β. colletur.

Ad nigredinem autem linguæ, & sitim, ita inungatur col-  
lum, & claues. Mucilago papaueris, & tragacanthæ in rosa-  
cea



cea addito semine papaueris, rosacei gutta aceti, & cera paucissima.

Ad fissuras autem illiniatur ex amylo cum rosacea, item aqua concedenda est opportune, ut sitim ingentem leniant, linteum imbutum rosaceo valde agitato cum frigida ventriculo imposita, eo magis si recipiant parum cera alba.

Septimum: prae cordijs si dolor totum corpus valde inflamet imponenda sunt tenues pultes, ex farina hordei succo refrigerante cum paucis rosaceo, permutandaque; & linteus imbutus poscha rosacea testibus marium, & vberibus faminarum, inuoluatur cum multa comoditate, si verò extra non ardet, sufficit imponere prae cordijs semen lini tustum coctum in hydreleo rosaceo. Si verò etiam friget extra, undique fricandus est, & repente oleo vngendus.

Octauum: retenta urina subuenitur oblatione matula, erectione agri, frequenti praessione pectinis, & titillatione interfamini, pecten foueatur cum oleo calido decoctorum ruta, anethi, seminis apij, lana scilicet imbuta imposita, & herbae ipsae calidae applicentur, item mittatur in sedem butyrum, oleum, cremore fanae, graeci ana  $\frac{3}{4}$ . ij. in mulieribus autem mittatur in uterum.

## C A P V T VII.

### *De Lethargo.*

**C**um non scripserit Rasis seorsim de lethargo, sed simul cum caro propterea hic seorsim tradetur.

Aduerte primò: praeepta de curatione lethargi. Primum phlebotomia minus aliquanto comuenit, & parciore quàm in phrenitide, tum quia pituita magis, quàm bilis prohibet phlebotomiam; tum quia phlebotomia in frigidat, lethargus autem affectus est frigidus.

Secundum: purgatio cum debeat esse phlegmagoga calida,



da, cum ager patiat<sup>ur</sup> febrem continuam, frequentari nequit, maxime ob multam obliuionem agri, non tolerantis remedia, & quia apud Mes. Dias aloes soporiferum est, suspectum redditur, quare exhiberi potest solutorium Traliani vulgare. Castorij ℥. ij. scamoniæ cocta gr. viij. in mulsa cum syrupo de stac hade. Verum purgatoria statim non adhibentur, tum quia initio materia cruda est, tum quia ante aliquot clisteres reuellentes, & minuentes timetur agitatio pharmaci.

Tertium: vomitus prouocatio confert statim post primū clisterem, & posternus, propterea, quod ventriculus minera est pituitæ; ex penna anseris intincta in oximelitis ℥. ij. seminis sinapis triti drag. j.

Quartum: in localibus Auicena dicit admiscenda esse medicamenta calida ex oxyrrhodino per duos dies: Galen. 13. therap. 21. & Tralianus in initio localium non agnoscunt discrimen inter lethargum, & phrenetidem. Quare juxta Auicenam videtur obseruandum, licet Metheus opinetur ab initio addendum esse aliquid castorij. Num. autem imponenda sint occipiti. Dic. ex ratione Galeni 13. therap. citat. magis commendatur in toto sincipite, vsque ad summum verticem, ita vt omnes futura occupentur. In occipite autem, vltraquàm quod minus profint, licet affectus occupet sinciput, periculose etiam imponuntur refrigerantia, licet calida tuto applicari possint.

Quintum: duo clisteres quotidie continuandi sunt, ita vt incipiatur à leuioribus, ne contra 1. aphor. 22. in principio euacuemus cruda; & si non retinentur, auferatur sal, & mel potissimum, vbi ingrediuntur valida soluentia.

Sextum: particulares euacuationes non fiant nisi præcedentibus vniuersalibus sufficienter, maxime sternutatoria exigunt paucam materiam in capite, ne forte sequatur apoplexia agitatâ materiâ, & vniuersim replente. Procedente autē morbo, si appareat facies ardens, & rubens, frontis vena commodissime secatur; si morbus diu perseverat, multo cum igne cu-

G ij

curbita



curbita occipiti affigitur, & rosam caput sinapifinis, & vesicatorijs vexetur, petitis ex cephalalgia pituitosa. Si sudor aliquis successerit, prouocetur, seu bene soluat.

Aduerte secundò: de victu lethargici, conuenit tenuissimus vsquequo inclinet morbus, jus cicerum, & mulla addito aliquanto pipere, abstineant à frigida, adhibeantur exsiccantia omnia, strepitus, clamores, ita vt post cibum cogatur vigilare per horam, reliquo tempore excitetur media quaque hora; & prouocentur omni ingenio vacuationes omnes; perpetuo orderet acetum acerrimum. Aer contra quàm in phrenitide pareretur, plurimi astent garuli; lucidus sit multis picturis, aulae parietes obtendantur: a cibo digiti manuū, & pedum ligentur. Demum perpetuo crudeliter excitandus est, illinendo faciem melle, quod turmatim aduolantes excitent muscæ, pillos vndique auellendo, corpus continuo fricando, aut asperis linteis, aut manibus aceto, & sale illitis, percutiendo faciem, & corpus vrtica, vsque ad papullarum eruptionem, adhibendo animalia grunientia, æta sonantia, peculiariter frictio crurum cum oleo de castoreo; vel schyla ex aceto trita altum veterum excitat. Aperiendum est os cum ligno; & infundendus liquor paucus, & tenuior, quàm in phrenitide, tum quia affectus deterior est phrenitide; tum quia imminet periculum suffocationis, illic autem resolutionis, & in debilitate per suffocationem cibis auferendus est 2. acut. 49. acria olera noxia sunt, quia evaporant; licet Mesues ptyfanam cum barbis porrorum concesserit & oleū, securiora sunt in declinatione sicut & vinū.

*Remedia Lethargi.*

**P**rimum: locale in initio. Rosacei ʒ. iij. aceti ʒ. ij. agitata saepe innouentur; in secunda die adde castorei olei ʒ. j. In statu sint paria olea, & acetum sit schylinum. Frons pilis humanis vstis aceto leuigatis vngendus est, ex Traliano, & Auicena in diurno, Castorij grana iij. oxymelitis ʒ. ʒ. sumantur



mantur quotidie. Ante capitis inunctionem, caput, & nares saepe foueantur sacculo ex salvia, & stachade, decocto stachadis, majorana, & scilla.

Non post multos dies ab initio ob morbi periculum sumantur agarici ʒ. ij. mellis rosati collati, aquæ betonica, vel faniculi añā ʒ. ij. poterur. Vel cochiarum ʒ. iiij. in mulsā.

Continuo admoueaturnaribus in spongia acetum feruens, decocti, thymi, pulegei, origani, rutæ, & herbarum peucedani odorandum est; & palatum inungendum est linteo, aut spongia affixa palo, quæ imbuta sit synapi soluta in succo betæ, vel semine nasturtij in aceto schylino.

Septimum: decoctum paretur pro clisteribus duobus, & infundantur duobus diebus continuis, præcedente prius communi. ℥. centauria, seminis carthami contusi, polipodij, añā m. j. colocintidis (quæ est cucurbita deserti) ellebori albi añā ʒ. j. in tb. iiij. aquæ ad tertias.

Octauum: suppositoria duo ita formentur. ℥. hyeræ ʒ. ʒ. colocynthidis, salis gemmæ añā ʒ. j. Nonum: vnctio totius ex camomelino tepida crebro benefacit. Finis.

## CAPVT VIII.

### *De Cathoco.*

**A** Duerte: de curatione præcepta. Primum, cum constet hic morbus ex phrenitide simul, & lethargo iuxta variam proportionem componentium, requirit remediorum varietatem.

Secundum: purgatio post coctionem si oportuerit iteranda. v. g. ℥. agarici præparati, electuarij de succo rosarum añā ʒ. j. ʒ. & fiat bolus. Vel decocti communis ʒ. v. in quibus infundatur Rhabbarbari ʒ. j. spicæ grana v. agarici drag. j. & ʒ. zinziberis gran. vj. salis gemmæ gran. ij. collaturæ adde oxy-mellitis ʒ. j.

G iiij

Ter-



Tertium: phlebotomia sicut in omni peste, quando commodat, quandoque omnibus noxia est. Causa videtur quod sanguis infectus praua qualitate, magis quam quantitate, intro fluit, & cognoscitur ex lingua nigra, siti valida, aestu viscerum, cum tepore brachiorum & crurum, & quia vrina, & pulsus non sunt sanguinea, & quia sentitur magna debilitas ab agro, & fere quando est morbus epidemicus, est talis dispositio sanguinis, vbi non conuenit, & cucurbita dorso imposita, & phlebotomia frontis. Vbi autem signa dicta non adsunt conuenit phlebotomia, eo magis quo ex compositione humorum arguitur plenitudo, sicut in tertiana exquisita non phlebotomatur Galenus lib. ad Glauç. sed in notha. Finis.

## CAPVT IX.

*De Caro.* Incipit, Cum aliquis, &c.

**D**E caro: nos (veterum) dicimus: Arabes subeth. 1. cognoscit, 2. curat. 2. Qui cum.

Aduerte primo: de explicatione affectus, Raf. hic vno nomine cari junctim complectitur (quod & Paulus fecit lib. 1. cap. 9.) lethargum & carum, quibus etiam addit Aët. capita separata de cathoco, & de comate, quarum distinctio 4. de locis 2. fere hæc est.

Conueniunt in humore epilepsia, apoplexia, carus, catalepsis. Distant quod apoplexia, ventres, & cerebri substantiam replet frigido, & crasso humore; epilepsia ventres tantum sed omnes; carus solos priores, catalepsis solum posteriorem. Quoad symptomata autem ita in apoplexia respiratio maxime læditur, in epilepsia motus adsunt conuulsui. In caro & catalepsi neutrum, sed in caro oculi clausi, in catalepsi fere aperti. Quoad successum autem morbi ita distinguatur apoplectici fere pereunt; carotici sanantur; epileptici & cataleptici ambigunt.

Reliqua duo, coma, & catochus, distant à quatuor affectibus



bus diētis, etiam in materia, nam coma ob vaporum copiam calidorum inuadit, & humidorum cerebrum grauantium, & dicitur etiam catalofum, vel delatio; est quia duplex, alterum coma somniculosum, alterum vigil, in quo videntur quidem dormire, sed non dormiunt.

Apud alios item coma numeratur inter cari species. Cathocus autem, vel morbus ouilis (madorra) ob copiam bilis cum pituita affectio est composita ex phrenitide, & lethargo 4. de causis puls. 15. Verum carus reliquis similis est, apoplexia minor tamen morbus, cum non ex toto delatio sit facultatis animalis, quare superest sensus aliquis, licet nec moueatur, nec loquatur. Cum autem magis adsit obtusio, quam malitia humoris, non sequuntur conuulsiones, ut in epilepticis. Fere autem fit carus per consensum, scilicet comprehenso aliquo ventriculo cerebri, vel comprehensis carotidibus, quæ inde nomen habent, vel à vermibus, vel à ventriculo, vel à toto, vel à prauarum accessionum inuasionem. Raro est affectus cerebri per proprietatem.

Aduerte secundò: de curatione, similis est curæ apoplexiæ, sed tardior, & mitior, similiter & victus paulo liberalior. Merito autem commendantur nonnulli, ut in caro, & in quauis cataphora, suspecta actu habeantur localia humectantia, & maxime obstruentia, ut olea: nam & si potentia siccent, solum actualis humiditas talium auget somnolentiam. Quare procedatur cum fomentis lethargicorum, vel sacculis siccantibus, ex furfure, millio, camomilla, additis cum oportet sale vsto, mace, gariophilis. Item cerotum modice siccans, ceræ laudani añā 3. j. cum nardino, vel cum oleo lauandulæ (alfazema) imponatur capiti. Validiora.

Emplastra cephalalgæ pituitosæ, excitant item horrida, quod Auicena intelligit per tristitiam, quam commendat in subeth, nam tristitia de præteritis facit dormire. Vomitus item frequens lethargicorum commendatur.

*Reme-*



## Remedia Carotici.

**P**rimum sturnatorium. ℞. ellebori albi, piperis castorij ana  
 ʒ. j. in linteo ligata saepe naribus indantur, plantæ, & vo-  
 la aceto mixtæ, & cum sale fricentur.

Secundum: clisteres; validius: post communem. ℞. sal-  
 uia, majoranæ, ruthæ, assari, roris marini, hysopi stachados ana  
 m. j. Validior est, si addatur seminis carthami contusi ʒ. j. cen-  
 taureæ m. j. colocynthidis in panno ligatæ ʒ. ij. coquantur in  
 lb. viij. ad dimidias, in decocti autem ʒ. xv. olei anethini ʒ. iij.  
 mellis rosati ʒ. ij. sine sale, ut moretur ad euacuandam pitui-  
 tam. Validior euadit si recipiat electuarij ludi ʒ. ʒ. Vel pare-  
 tur clister ex ʒ. j. benedictæ cum succo mercurialis.

Tertium, vomitorium. ℞. corticis elebori albi ʒ. j. infin-  
 gatur raphano per diem, quibus ablatis fiat raphani decoctum  
 ad ʒ. iij. adde oxymelitis scylini ʒ. ij.

Quartum, in statu, vinctio capitis ex aqua vitæ, cum oleo  
 de castorio; vel cephalalgia pituitosa synapismus, odoret per-  
 petuo peucedani radicem.

Quintum, ad somnum immodicum etiam sine morbo  
 affligentem excitetur. Laboret, non cænet, nec bibat frigidam,  
 & quotidie mane sumat ʒ. iij. pulueris siccantis humiditatem  
 stomachi, & capitis. Vel zinziberis tres partes, turbith. par-  
 tem vnam sacchari quatuor, & in æstate pro zinzibere substitua-  
 tur coriandrum, & si forte temperatura calida est, sufficit zinzi-  
 beris pars vna, illiniantur nares intra cum melanthio, ex ace-  
 to occipiti imponatur sinapismus post purgationem.



CAPVT

## CAPVT X.

## De Vigilia.

**A**Duerte: de curatione cum oriatur aliquando, ab intemperamento immateriali calido sicco, aliquando à foliginibus acribus mordentibus cerebri membranas, quandoque à bile in cerebro abundante, aliquando à falsa pituita ibidem contenta.

Vnicuique causæ per contrarium obuiandum, ita vt in immateriali sola alterantia applicentur, in foliginosa dissipantia flatus, in biliosa colagogum, in falsa colagogum permixtum phlegmagogo. In narcoticis autè adhibendis memorandum ex 12. therap. vlt. abstinendum esse, nisi periculum postratarum virium mortem minetur, ac tunc non quibusuis vtendum esse, sed expertis in ea dosi, quæ soporari efficiat sine insigni periculo.

## Remedia Vigilia.

**P**rimum: cum causa est calidum intemperamentum, aëris & victus infrigidatio, vt in biliosa cephalalgia, peculiari- ter benefacit vnctio capitis ex lacte, & eiusdem per nares sumptio. Item vnctio capitis ex oleo ranarum cum populeo. Laudatur esus leporis doctoribus 2. aliment. cap. proprio. Dormiturus sumat lac amigdalorum, cum 3. j. seminis papaueris, & 3. j. seminum frigidorum cōmunium, & sacharo. Vel in panata 3. j. succi coriandri, reprimat enim acres foligines. Quod si non sufficit, applicentur remedia insaniæ biliosæ, & narcotica.

Secundum: in vigilia falsa. Syrupum de endiuia, mellis rosati collati añā 3. β. Purgatio pillularum aurearum, & de fumaria añā 3. β. formentur cum syrupo papaueris. Vel puluis sumendus in iure. ℞. turbith. Rhab. añā 9. ij. cinamomi, & zibexis

H

zibexis



ziberis añ gr. vj. sachari pondus omnium. Sugat naribus anethinum, & vngatur caput canomellino, butiro, assungia, concoquent enim, leniunt, & humectando inducunt somnum.

Tertium: in vigilia biliosa post syropos, & purgationem, & linimenta cephalalgia biliosa, imponendum est lenimentum. 26. pulvis rosarum cum oleo violaceo, & raninino, mucilagine psylli, & hordeacea farina. Quod si æstus non valde vrget, præstat misceri aliquid croci.

Quartum: narcotica in phrenitide præcesserunt. Vel dormiturus partes decocti seminum lactuca 3. iij. syropi papaverini 3. j. phylonii romani 3. j. aquæ lactucarum 3. iij. vini albi 3. j. Vel distillentur opij 3. j. capita alliorum duo, cujus liquoris stillati gutta j. vel ad summum ij. cum paucio vino potæ potentissimæ sunt. Vel deuoret pillulam j. de cynoglossa dormiturus. Finis huius tractatus.

#### C A P V T XI.

##### De Apoplexia.

**C**onstat 22. quattuor. In primo ponit signa, & præfagia. In 2. Cum ergo, &c. ponit curationem apoplexiæ sanguineæ. In 3. 2. Quod si, &c. curat pituitosam; incipit in 2. complet curam sanguineæ.

Aduerte primò de victu. Aër in nulla specie apoplexiæ continet frigidus. Nam 4. acut. 44. & sequentibus sanguis vitalis concreuit, ob copiam enim, non bène euentatur, & concretus, non permittit transitum spirituum calefacientium. Quare magis refrigeratur. Sit ergo in sanguinea temperatus; in pituitosa magis calidus, canopæo, frictionibus, igne, fomentis. De somno autem non vacet periculo; quia cum somnus humectet cerebrum auget morbum. Quare quod his consilii Mathæus, non absistat medicus, vel socius ab agro, quo tempore dormit, vt tangat perpetuo pulsum, & vbi viderit pulsus minui,



minui, & sterrorem excitet, quare parum dormiendum est, nō tamen in totum vigilandum; nam ex 2. diatarum Hippocratis, vigilia non permittit cibum liquari, vel coqui. Auicena dicit inmodicam vigiliam causam esse, vt communicetur cerebro vapor crudus alimenti. Post cibum tamen vigiliam præcipit Auicena. Cibus sit in extremo tenuissimus, post cibum jus ciccerum, & passerulorum, & columborum ablatis extremis, & mulsa; vinum enim nocentissimum est, cum caput repleat; potissimum prohibet Auicena nouum ob copiam excrementorum, & vetus ob tenuitatem penetrantem nervos. Quare mediæ ætatis vinum minus lædit. In sanguinea autem conuenit iulepum rosatum, & serum. In omni autem specie lignum dentibus interponendum est, tum vt facilius respiret, & ne lingua, quod quandoque accidit, abscindatur.

Aduerte secundo: de curatione sanguineæ præcepta tria. Primum euacuatio sanguinis plurima ex ioporijs colli necessaria est ad manifestationem vasorum, & ad sistendum sanguinem paratum apoplexiæ, & quia deligatio magis angustat respirationem.

Verum in apoplexia sanguinea parotides sua sponte apparent tumentes, & ad sistendum sufficit costus in albumine oui compresso digito. Vulgarius est secare ambas cephalicas, & simul, ita enim maior fit diuersio: extrahantur sanguinis lb. ij.

Quod enim incipiendum sit à cephalalgicis, quacunque causa produxerit apoplexiam, monstrat series Rasis, & ratio supra cap. de phrenitide; post quarum sectionem, si occasio apoplexiæ fuerit retentio fluxus inferni assueti, sequetur sectio saphenarum, & tandem partium capitis, frontis, & linguae, nariumque.

Verum memorandum ex præcepto 4. acut. 48. quod ante phlebotomiam præcedant fomenta totius à multis simul habitibus. Cum camomellino, & anethino calidis, & cū fricationibus multis, vsque quo sanguis reddatur fluxilis, qui fere in talibus congreuit, sitque foramen latius pro sanguinis crassitie,

H ij

clister



clister verò præcedere potest, sed ob virgētissimā nēcessitatem præstat cum Auicena statim phlebotomare, & sequi clisteres.

Secundum: diuersiones multo magis commendantur in hac specie, eo quod fluxibilitas ad cerebrum inest sanguini ex calore suo, & ex substantia non valde crassa. Valide reuellunt ligaturæ in capitibus musculorum, iuxta humeros, & coxendices, nam in capitibus musculorum ligaturæ sicut, & vulnera magis dolorifica sunt quam in ventre. Potentius autem trahūt ligati muscoli proximi trunci, quia viciniora potentius reuellunt quam distantia, estque potentior ligatio, quæ strictior est, sed oportet, vt saepe soluatur, tum quia consuetudine illa ligandi, & soluendi magis excitatur ager; tum quia nisi ita fiat prohibetur spiritus cum sanguine descendere, quare ingens fatigatio sequitur; benefaciunt frictiones cum oxymellite schylino, & sale.

Præterea cucurbitæ in foemoribus scarificatæ, & in naribus item sternutatoria caroticorum, extensio digitorum, & contorsio eorum, pilorum euulsio, excitant enim, & ob dolorem, & ob iram, quam mouent agro.

Tertium: oxorrhodi perfusio, in quo non additur, sicut in superioribus morbis rosaceum, propter summam capitis plenitudinem: ideo etiam, nec refrigerata refrigeranda sunt, sicut in superioribus, clisteres potentes euacuantes, non valde calidi. Qui autem semel incidunt in apoplexiam, nunquam ex toto restituantur propter magnam frigiditatem contractam cerebro, & cordi.

Aduerte tertio: pituitosæ curatio constat sequentibus. Primum, validi clisteres potenter vacuantes, & calefacientes, ter in die infundendi, interpositis etiam suppositorijs. Secundum sternutatorium. Tertium inductio febris anacardina potu 3.ß. cum mulsa.

Nec obstat huic curationi, quod febris in apoplexia iudicatur lethalis Auicena, quia intelligit de febre sponte succedente,



dente, quæ significat materiam inflammantem cerebrum, quare impossibile est extrahi antequam perimat per prohibitam respirationem; pronocata autem febris sanat, juxta 2. aph. 26. Quod si eodem 2. aphor. 19. apoplexia scribitur morbus, sine febre acutus, agit de frequenti apoplexia, non de inflammante quæ rara est.

Quartum: ad liquandam pituita m applicat farraginem ignitam, interpretes commendant, ut sit figura capitis (casoula) sed est periculum, ne vrantur membrana capitis, quare sufficit farrago, quare magis occipiti applicetur, sed per caput totum mutetur. Præcipiunt item abradi pilos prins, sed est periculum, ne cerebri substantia liquetur, quare sufficit abscissio forcipum, maxime cum Rasis supponat pilos adesse.

Quintum: validissimo synapismo vtendum est ad liquationem, & resolutionem. Sextum, si apoplexia pituitosa junctum habet sanguinem, ex Auicena præcedat phlebotomia. Septimum, ubi primum deglutire potest, solutio procuranda est pilulis validissimis in multa solutis. Octauum, vomitus in plenitudine ventriculi, vel cibali, vel humoralis, conuenientissimus est etiam repetitus, ut in lethargo, extra quos casus quandoque noxius est.

In vtraque autem specie illa memoranda sunt, nisi intra horas 12. subueniatur, fere frustra tentabitur curatio. In fortissima autem cum non sentitur respiratio, non tententur remedia, nisi forte consolandi gratiâ; præterea procuranda paralesis validis frictionibus, adhibitis partibus in quibus materia sentitur decubere, in balneo proxime describendo ter in die mittatur, superasperso capite etiam in fine balnei.

*Remedia Apoplectici.*

**C**lister in sanguinea. ℞. betæ, violæ, colocynthidis, centareæ minoris ana m. j. in iij. lb. ad dimidias parentur clisteres duo, quod si non retinentur, cum linteo comprimatur, & obturetur sedes.

H iij

Secun.



Secundum: clister in pituitosa conueniet, si vice beta, & viola, supponatur tantundem ellebori nigri, & liluia. Vel sic cētaurea minoris (purgetur enim ē longinquo, salua, quæ nō purgat, sed pituitam liquat, & siccāt) rutha, calamintha, origani, stachadis aña m. j. anisi, faniculi, seseleos. (he bestiagi) semen seseleos (he cominhos rusticos.) Aliud ellebori albi aña ʒ. ʒ. in ʒ. vj. ad dimidias, in cuius ʒ. adde olei castorei ʒ. j. hiera ʒ. j. salisgem ʒ. j.

Tertium: suppositoria. Hierā picrā ʒ. j. salisgemma, colochyntidis aña ʒ. j. formentur ij. cum folio in medio.

Quartum: sternutatorium, & errhinum in succo beta, vel fortius anagalidis, euphorbij, ellebori albi, piperis aña gr. v. vel infusetur puluis. Aliud: vnguentum mitius, valde trahens. ʒ. euphorbij piperis (aperiunt enim concoquūt, & attenuant) calami aromatici, castorij, terebentina, opopanicis, stiracis aña ʒ. ij. cum oleo de castoreo, & cera, fiat inunctio ad caput, & vniuersam spinam. Alia consimilis. ʒ. olei ruthacei, terebentina aña ʒ. j. & ʒ. euphorbij ʒ. j. castorij ʒ. ʒ.

Sextum: valet frictio capitis valida, cum aceto valde calenti dissolutis synapis & salis. Item apud Anicenam, & Rasitotum corpus illiniatur, & maximè dorsum oleo calido sulphuri permixto.

Septimum: cum incipit deglutire, tertia quaque die exhibeatur pillularum de sarapino, vel fatidarum ʒ. iij. euphorbij ʒ. j. in mulla.

Octauum: ter in die mittatur in balneo, quod pareatur ex vino, & aqua decoctorum foliorum lauri, origani, pulegij, lauandulae superasperso postremo capite.

Nonum: ad loquelæ defectum manentem, os illiniatur anacardina, vel succo rutha, qui etiam naribus, & auribus indatur. Conuenit igitur in origine dorsalis applicatio cucurbitularum, & si oportet scarificatarum ex Rasio. Finis tractatus de apoplexia.

CAPVT



## CAPVT XII.

*De Catalepsi.*

**A**duerte: de curatione catalepseos, vel congelationis præcepta. Primum, cum quandoque causa ejus sit immaterialis, frigida, sicca, quandoque verò sit materialis intemperies, vel melancholia, aut vitria pituita. Primæ speciei solis alterantibus occurrendum. Posteriori etiam vacuantibus, & diuertentibus, quæ tamen aliquo modo humectent, & melancholiam respiciant, in quo distat à remedijs cari, & apoplexiæ, repellentia tamen ob crassitiem, & frigus humoris hic locum non habent.

Secundum præceptum. Aët. memorat lib. 3. cap. 4. vidisse adolescentem triduo rigentem, non claudentem palpebras, vel respondentem acclamantibus qui 4. die succedente larga hæmorrhagia per nares confestim sanatus est; unde colligit, si apparet sanguis abundans, vel ex toto, vel ex parte, confestim mittatur sicut in apoplexiâ.

Tertium: ex Auicena 1. 3. doctrina 5. cap. 5. in congelationis sumendum totum corpus. Vel quod crebrius est, sumenda extrema: valde autem calida, non apponantur; sed tepida, vel subfrigida, imò profusio frigida semper sanat eas congelationes, argumento allato de pomis congelatorum, quæ in valido frigido instar lapidis durecunt; quod si mittantur in frigidam, poma quidem leniuntur, aqua autem circumstans gelatur. Cujus causa esse videtur, & traditur duplex à Rasio citato; una, ex intensissimo frigore humiditas alens innatum calorem gelatur. Quare calidum innatum defectu alimenti minuitur, ita ut si approximentur igni, putrescant liquefactæ humiditates, non enim regulari possunt à minimo calore innato. Quod si pomum mergatur in frigidam, calor internus, ex humore externo trahit alimentum, ita ut recensius pellat humidum congelatum,



gelatum, quod extrorsum glaiat aquam. Altera causa, quia innatus calor præ duritie humiditatis non potest euentari, minuitur, accedente autem liquore externo, mollescit humidum internum, ita vt facto transitu, respirante innato calore vertatur fructus ad pristinum habitum.

*Remedia Congelati.*

**P**rimum: clister saepe repetendus. ℥. polipodij epythimi añā ʒ. j. stachadis ʒ. ij. senæ, ellebori nigri añā ʒ. ʒ. salis indi ʒ. j. in lb. iiij. addimidias pro duobus clisteribus. Validius autem euadet addita hyera, logodij ʒ. ʒ.

Secundum: olei lini ʒ. iiij. castorei euphorbei añā ʒ. j. profundantur, & liniatur caput, maximè occiput. Tertium: spongia intincta, & expressa in vino valde calido. Decocti stachados, senæ, assari, borraginis, buglosæ, fumariæ, gesmini, vel perfundatur caput, vel lauetur ex eo, vino calido albo. Quartum: sternutatoria caratici, & apoplectici. Finis tractatus huius.

C A P V T XIII.

*De Incubo.*

Incipit, Cum aliquis, &c.

**A**duerte: de curatione incubi, idest ephyaltes, præcepta: Primum, astet socius amicus, qui confestim eleuet lamentantem, frictione vini, vel aquæ naphæ.

Secundum: cum incubus nuntiet epilepsiam, si causa est valida, præstat incipere à vacuatione aliqua minorante, postquam sequantur concoquentia.

Tertium: concoquentia non sint aperientia, ob periculum eleuatorum vaporum, qualia sunt aquæ foeniculi, & calidum oxymel, aromaticentur autem cum puluere nucis muscæ,



cata, & granorum praxia, ut in cephalalgia pituitosa.

Quartum: particulares euacuationes, & diuersiones, ut in epilepsia fiant. Particulatim autem insistendum est roborantibus caput, & si affectus est per consensum à ventriculo, providendum est ventriculo. Si verò ab extrinseco frigore per aromatica olea calida. Finis.

C A P I T U L U M XIV.

*De Epilepsia.*

**P**rimo: ponit signa morbi, tam in vniuersali, quam magnitudinis ejus. Secundo: curat epilepsiam per consensum, ab aliqua parte in 2. Si autem ager. Tertiò: agit de epilepsia stomachali in 2. Si ager verò. Quartò: de epilepsia per proprietatem in 2. Quod si cum, &c.

Aduerte primò: de victu præcepta. Primum, exercitia licet caloris gratia, & maximè siccitatis conueniunt, ita ut in consilio pueri epileptici duo illa sufficienter perficiant curationem, exercitium moderatum, & medicamentum ex schylla. Valida tamen reprobata sunt, ob agitationem capitis, ita ut etià pillæ ludus propter capitis demissiones reprobetur. Supplent vicem exercitij frictiones longæ, rubefacientes totum corpus à multis simul peractis; ita enim cito rubet corpus, & nulla ex parte refrigeratur; manusque fricantium pressius deorsum, quàm sursum ducantur; nec tamen collum aut caput fricentur, sed postremo leniter attractetur, præstatque si sequatur vinctio totius, vel cum oleo beluino, vel gariophylato, post exercitia postea frequenter retrudatur jeuno.

Secundum: cæna cum nostro æuò debeat esse parcior prandio; in morbis capitis, debet esse multo parcior. Quare ex Aui-scena duæ tertiæ cibi ipsius ad prandium sumantur, vna autem ad cænam.

Nec obstat, quod in consilio epileptici oppositum traditur.



tur. Cum enim tunc vniuersum alimentum, plurimi tantum ad carnem sumerent, id tollens Galenus, ne immodice recederet à consuetudine, præcipit quod vt cœna sit parcior, vna tertia totius alimenti sumatur ad prandium, reliquæ duæ in cana.

De potu autem. Vinum cōstat nocentissimū esse, vbi enim ventriculus imbecillus est ita, vt cruditates ex vini penuria sequantur, quæ in hoc morbo nocentissimæ sunt, concedendum est pauciferum. Vbi autem ventriculus non vrget, vtendum est aqua sacharata, vel mellita, vt in cephalalgia pituitosa. Melior autem potus est si in aqua coquatur salvia, rosmarinus, betonica, cum aqua autem dicta bulliat vinum potandum. Potissimum lædit varietas epularum, aut potus inter duas cibationes: maximè confert victus parcitas, ob periculum cruditatis: vbi tamen bilis ventriculi in causa est, similiter vacuandum est, ne famescat. A cibo autem prohibet Tralianus, ne sumatur aliquid dulce, bile secit enim. Idem valde reprobatur apium vulgare, seu naturaliter infestum comitialibus, & syrumpum myrteum, & dactilos, seu cephalalgicos crassum flatum capiti communicantes, & oliuas tamque prauis succi capiti infestas.

De apio consentit Auicena, & Tacuinus: referens illud inter cephalalgica, & à proprietate referans meatus ad cerebrum, quia præparat viam flatui prauo. Haly autem, Gaineros, & Sauanarola tradunt si fricentur manus, & nares epileptici curati cum apio siluestri, & non cadit perfectè, curatus est. Experimentum tamen quemque fallit, contra quos Galenus, in consilio pueri epileptici commendat, hæc omnia epileptici parco vsu simul cum raphanis. Nec procedit excusatio Montani conf. 18. Quod Arabes intelligunt de apio agresti, Galenus verò de satiui, pueris itaque incontinentibus præstare, vt palam concedatur aliquid noxi parum, quam vt clam immodice ingurgitent, vel vt satius videtur, nondum erat cognita Galeno ei apij proprietas. Capras memorat Auic. quædam,



dam, ob siccitatem respisse. Matheus habet hados, & perdic-  
ces rejicit citato Galeno. Verum in consilio citatus Galenus,  
concedit hados, & nonnumquam lepores; reliqua pedestria  
negantur, ob crassitiem, sicut & aues palustres, & pisces crassi,  
quales sunt testacea, & cartilaginea. Aues verò montanae, &  
reliqui pisces commendantur ob tenuitatem succi. In naturis  
verò, vel ventriculis humidis experimento damnantur pisces,  
olera verò, & legumina rarissime admittantur.

Tertium: Aëris inmoderantiæ potissimum cauenda sunt,  
ob affectus cerebri, cum ab utrisque immodice lædatur.  
Quare oportet continere se domi, ubi aër, vel statulentus est,  
vel pluviosus, vel immodice frigidus. Odor verò multus etiã  
bonus suspectus est, ob capitis plenitudinem, prauus enim  
etiam inducit accessionem, ut gagatis, aziche, sicut ruthæ  
odor benefacit, commode ergo aër emendatur prius bonis  
odoribus antequam ingrediatur ager.

Aduerte secundò: de curatione epilepsiæ per consensum  
præcepta. Primum, imminente accessione, ligatura valida su-  
pra locum affectum cum aluta (couro de luua) vel corrigia si-  
militer, ut in moribus venenatis. Quod si locus non possit re-  
cipere ligaturam sursum, ut quando epilepsiæ succedit ad cor-  
ruptum semen in utero, procuretur exitus noxi per partem in-  
fernam, vel prohibeatur ascensus vaporum ligatura in partem  
primario affectam, idest in fœmoribus.

Secundum: valida vacuantia sæpe repetita temporis inter-  
uallo, vel quia qualitas delecthera est, in quantitate parvissima  
inficit accedens alimentum, oportet purgationem respicere  
humorem peccantem, & membrum, mandans simul, & reci-  
piens, quia cerebrum ex transacta accessione variò conseruat  
fomite humoris delectheri.

Tertium: vesicatoria, & cauteria, supra de cephalalgia va-  
ria; sunt enim securissima, & efficacia, quæ in brachijs adhi-  
bentur. Quartum: cucurbitæ scarificatæ debilitant partem cui  
imponuntur, 4. de ventosis.

I ij

Aduer-



Aduerte tertio: de curatione epilepsiæ stomachalis requirit hoc peculiare, quod major habenda est ratio probabilitatis alimenti, quod vomitoria crebra conueniant, quod ventriculus roborandus est ex apposis, & intro sumptis.

Aduerte quarto: de curatione epilepsiæ per proprietatem. Dûas species memorat; vnâ sanguineam raram; alteram frequentem frigidam. In frigida concoctio, vacuatio, diuersio, alteratio, roboratio fiant, vt in cephalalgia, tantum sit vehementior, quo morbus ipse vehementior est.

Postremo curationes potentissimæ sunt emplastrum extra trahens, & acres inducens, & cauterium vsque ad caluariæ superficiem in coronali, per duos menses apertum. In sanguinea verò commodat abstinentia carnis, & vini, in capite oxyrrhodinum, & frequens phlebotomia, in qua licet Ras. præcipiat, vt præcedat sectio cruris. Verum obseruandæ sunt cautiones de loco euacuationis prædictæ; thegni. Vbi verò origo epilepsiæ est suppressio alicuius infernæ vacuationis, ordiendum est, à crure; ratio est, quia morbus præstat inducias.

Aduerte quinto: de tempore accessionis, propter breuitatem accessionis, & paucum periculum, non est vtendum vacuantibus durante accessione, nisi immodice frequentauerit, tunc enim commodè infunditur clister lethargicorum, addita pauca pæonia, & aristolochia, perpetuo enim facies in accessione, ob turpitudinem motuum integenda est, & diuersionibus incitanda sunt; membraque conuulsa modice dirigantur, & yngantur liliaceo. Excitat autem, & confert vinctio carpi, volæ, & temporum cum succo ruthæ, cum castorio naribus immisso. Tralianus putat summum esse remedium, ita vt faciat ex toto sanet, si nares opplentur rutha siluestri contusa, & comprimantur. Particulatim autem quædam epilepsiæ requirunt suas obseruantias, & primum epilepsiæ pueriles. De qua Iulius Polux testatur, eos qui nascuntur in conjunctione, vel oppositione lunæ potissimum incurrere huiusmodi morbum. Addit Rasus i. cont. non oportere nos decipi, quasi semper  
epilepsiæ



epilepsia puerorum sit pituitosa, nam quandoque in adultis, sa-  
pius in pueris oritur à calore plurimo liquefaciente cerebri hu-  
miditates, quæ instar hæctica curanda est per balnea, & lactis  
potum, quam ibi vocat matrem puerorum. Præcauet autem ab  
ea, si exeunte ab utero puero suspendatur smaragdus ad collum  
apud Azarabium, item si antequam lactet egrediuntur infan-  
tulo, præbeat amigdalinum cum saccharo, à quo dormiet, &  
experget factum iterum, & tertio citra lactationem tantundem  
præbeat, inanit enim ventrem ab excrementis mensalibus,  
vnde imminet periculum. Si autem euenit ex suffitu carbo-  
rum, sanant clisteres remissiones, odor acris aceti, nihil exte-  
rius frigidum, sed leuis pectinatio capitis. Intus conserua ro-  
sarum cum aqua oxalidis. Si verò accidit ex semine retento  
quotidie conserua rosarum ʒ. j. feminis agni casti puluerati,  
vel aquæ mellisophyli (crua cidreira) vel mellis rosati ʒ. ʒ. pul-  
ueris agni casti ʒ. j. misce.

*Remedia Epileptici.*

**P**rimum: ellectuarium quotidie sumendum in pueris qui-  
dem ʒ. j. ʒ. in adultis ʒ. iij. appellatur theriaca, smaragdo-  
rum gr. x. hyacintorum ʒ. j. & ʒ. feminis pæonia, cinamoni  
radicis pæonia aña ʒ. iij. feminis citri mundi, dictami, vel vuz  
ejus, pulegij aña ʒ. vj. coralli rubri, chermes, rasura eboris,  
gallangæ aña ʒ. ij. syrupi de acido citri, cum melle confecti ʒ.  
j. & ʒ. iij. misc.

Secundum: quotidie ante prandium sumatur pillula j. ex  
aloe, brionia, agarico, semine rithæ, & pæonia. Vel conti-  
nuer xv. diebus potum hunc in aurora post purgationem oxy-  
mellitis schylini ʒ. j. & ʒ. decocti hysopi ʒ. iij. Vel quotidie  
sumat plyniscotici ʒ. ij. cum paucis oxymellite. Vel ʒ. j. elle-  
ctuarij Anticena sequentis: ʒ. f. f. f. baccarum lauri aña ʒ.  
iij. aristolochia, seminis pæonia aña ʒ. ij. castorei thosciscorum  
de schyla aña ʒ. j. cum melle. Vel sumat dormiturus, non su-

I iij

per



perpotans ellectuarium tale. ℞. seminis pæonia collectæ luna decrefcente, caluarie humanæ, non putridæ, cardamomi, pyrettri añã cum fâcharo. Vel puluis fumatur cum conferua rofarum ex melle.

Tertium: in epilepfia stomachali frequentandum est vomitorium raphani tufi ℥. j. affari ℥. ſ. in aqua ℥. viij. ad dimidias, adde oxymellitis ℥. ij. potetur tepidum horis duabus à prândio vario multo incidente. Poſt ſufficientem autem vomitum integra non edatur die, ſed os colluatur cum vino, & rofacea, paulo poſt ſorbeantur ℥. ij. fyrupi de pomis à quo dormiat. Validius vomitorium euadit, ſi recipit ſucci ſambuci verſus ſuperiora Raſi ℥. j. Validius ſi addatur ellebori albi ℥. ſ. uſque ad j.

Item ſomentum frequentandum ventriculo. ℞. abſinthei, ſpicæ, roſarum, maſticis, thuris añã ℥. j. coquantur in vino ad dimidias, & filtrum calens in eo infuſum, ſape ventriculo imponatur. Item poſt purgationem potandum eſt jejuno diebus intercallaribus maſticis electæ ℥. ij. ſoluta in aqua calenti.

Quartum: pomum ſemper geſtandum collo appenſum. ℞. ſeminis pæonia, caſtorei, pyrettri añã ℥. ſ. ſtyracis liquida, quod ſufficiat, induretur cum ℥. j. cedria, vel in defectu laudani in aqua naphæ.

Quintum: puluar conſtituendum quadratũ palmi vnius, & dimidij ſupponendum capiti præſertim tempore humido. ℞. hyſopi, ſtachadis, ruthæ, pæonia, polij, florum roris marini añã ℥. j. modice conquaſata.

Sextum: errhinum poſt purgationem, vt in caphalalgia pituitofa, magis proprium aliud ℞. puluis tenuiſſimus pæonia cum ſucco ruthæ. Validius: ſucci medij corticis ſampſuci, ſucci ſambuci, ſucci betæ facta reſidentia añã ℥. ſ. ellebori albi, euphorbei, caſtorei, ſeminis pæonia pulueratorum, añã gr. vj. injiciantur naribus, auribus autem infundatur puluis nardi cum nardino.

Septimum: gargarifina, vt in caphalalgia pituitofa. Validius



dius: radicis ireos, radicis pæoniae, & schyllæ, añā ʒ. j. ʒ. seminis pæoniae zinziberis añā ʒ. ʒ. passularum enucleatarum ʒ. ij. aceti ʒ. ʒ. mellis ʒ. iij. in tb. ij. aquæ ad dimidiās.

Octauum: electuarium alterans, & confortans, fiat cum sacharo ex schyla contusa, & insoletur diebus quatuor, vel ad ignem addito semine pæoniae. Item bis in mense methridati ʒ. j. Validius: electuarij Raf. pyretri, feseleosstachadis añā ʒ. x. agarici ʒ. ʒ. cardamomi, añā, aristolochiæ longæ, & rotundæ añā ʒ. j. & ʒ. fiat cum syrupo ex pari succo schyllæ, & melle.

Nonum: ablutio capitis ante cænam singulis hebdomadis ex lixiuo decocti assari, senæ, betonicæ.

Decimū: pillulæ singulis quindecim diebus sumendæ ad ʒ. j. ʒ. aloes ʒ. iij. agarici ʒ. iij. Rhab. ʒ. ij. seminis pæoniae drag. j. & ʒ. gariophilorum, cinamomi añā ʒ. j. cum melle rosato.

Vndecimū: in initio accessionis reprimens imponendum est capiti, & locis vicinis, collo, fronti, spatulis, obseruando ab spina. ʒ. thuris, maltichis, añā ʒ. j. hypocistidos, acaciæ añā ʒ. ij. albuminis iij. aceti ʒ. iij. saliter ʒ. iij. quod aduerte misce.

Duodecimū: emplastrum inducens acores, & extreme fanans impositum toti sincipiti. ʒ. armoniaci dissoluti in pinguedine anatis, vel melius milui ʒ. ij. fermenti ʒ. j. synapis tenuissime puluerisati ʒ. ʒ. pæoniae ʒ. ij. centauriæ ʒ. ʒ. seruentur in capite, vsque ad desiccationem, quo ablato vngatur cum pinguedine milui, & rursus reddatur ad emplastrum alternatim, donec acores erumpant. Finis.



CAPVT



CAPVT. XV.

De Melancholia.

Incipit, Cum alicui, &c.

**P**rimò: notificat morbum per principium, & augmentum. Secundò: exequitur signa, & curam Hyppocondriaci. Tertiò: in 2. Si autem cum melancholia, curat maniam. Quarto: 2. Si autem cum melancholia nihil, curat melancholiam per proprietatem.

Aduerte primo: festinandum est in curatione huius propter causas quinque. Prima, quia siccitas tardissime curatur, vt pote per humidam qualitatem minime efficacem. Secunda, quia siccitas in cerebro difficilius, quoniam siccitas cerebro impropotionalis est. Tertia, quia ob intemperaturam frigidam siccam minuitur spiritus à quo pendet curatio. Quarta, quia ob amentiam in posterum refugunt medicamenta. Quinta, quia iudicium in totum non amittitur, nisi ob intemperamentum cerebri, vel imbibitum, vel hæticum; talia autem intemperamenta confirmata insanabilia sunt.

Aduerte secundo: de victu melancholicorum. Cum in omnibus abundet siccitas, licet actiue varient, merito dixit Rasis summopere curandum esse, vt pinguescant, obseruando, ne incidunt in obstrukciones, & excrementitias humiditates, quod procliue est omnibus, qui victu humido vtuntur. Quare ibi res humidæ necessario adhibendæ sunt; somnus itaque abundantior sit, panis similagineus, quia ex farina polinæ magis humectat, qui non excedat diem, vt seruetur integra humiditas fermenti, lac fere conuenit, nisi quod in quibusdam corrumpitur in melancholicum succum, quos oportet illud vitare. Placentæ conueniunt ex sesamo, & amigdalæ cum sacharo. Carnes natura humida, ætate adoleſcentes, gaudia autem, cantus, societates



Cietates partim conferunt, quia inducunt somnum humectan-  
 tem, partim quia retrahunt animum à solitudine exsiccante,  
 partim quia cum extrorsum trahant spiritus, humectant mem-  
 bra arida, & faciunt ad ejus alitionem, partim etiam quia gau-  
 dium tanquam oppositum tristitiæ melancholicæ 6. aphor. 23.  
 sanat, sed potissimum conandum est, vt non modo alitio pa-  
 retur humida, sed vt spiritus splendidi, & ad gaudium facien-  
 tes copiose reparentur per ea, quæ ideo cardialia vocantur, quia  
 spiritus, aut augment, aut illustrant, id quod apud Autores fere  
 nouem modis paratur. Primò, per ea quæ succum præstant ac-  
 comodum gignendis spiritibus, vt vinum, lutea, aqua carnis.  
 Secundò, per illustrantia spiritus, vt margaritæ. Tertiò, per  
 congregantia substantiam spirituum, ne dissoluantur, vt succi-  
 num, & emblici. Quartò, per qualitates primas lapsui spirituum  
 contrarias, vt rosa, in calore; melisophylon, in frigore. Quin-  
 tò, in occulta, vt hyacinthus. Sextò, separatione foliginis atræ,  
 vt berrago ad xantum. Septimò, per odorata à tota substan-  
 tia alentia spiritus, vt moschus, ambra. Octauò, exercitio sua-  
 ui, vt cogitatio dulcium, & melodia. Nonò, per prohibentia  
 vim noxiam abolentem spiritus, vt zedoaria, & smaragdus.  
 Commode autem sumuntur jejuno oua sorbilia, cum sacha-  
 ro, & aqua odorata. Venter autem lenis conseruetur, cum  
 jure pulli coctarum maluarum, vel cum bollo cassiæ. Aër per-  
 petuo odoratus fiat ad augendos, & roborandos spiritus. Bal-  
 neum aquæ dulcis omnium præstantissimum est sequenti in  
 vnctione, cum amigdalina: idem cum cibus probi, & humidi  
 succi sæpe sola sanauerunt incipientem melancholiam 3. de  
 locis 7. Tralianus putat præstare si cum oleo permisceatur  
 tantillum aquæ, exercitium sit paucum non siccat, nec  
 tamen permittatur ouari, ne profunderetur in imaginationibus;  
 vacuatio humoris noxij semper optima est, & adustarum foli-  
 ginum. Quare decessus moderatus iuuat, licet ex natura sic-  
 cet; alimenta verò tenuis succi in adusta melancholia, aliquân-  
 do corrumpuntur, ob acrimoniam caloris; in frigida autem  
 K iuuant



juuant attenuando crassitiem humoris; caro castrati annualis à proprietate laudatur, sicut, & perdicum, turturum, & auium syluestrium, ob odoris præstantiam, & si pulli sint humidiores, maxime enim sanguinem augent, calefaciunt, & roborant columbæ, turtures, passeris cum aliquanto vini odorati, & moschi, apud Rasiū 3. aphor. ult. Panis non valde fermentatus ablatiis crustis, olera humida, & rapa bis cocta ad deponendam flatulentiam. Commendat Matheus cortices radicum buglosæ conditas, condemnans usum foliorum. Verum apud Dioscoridem folium in vino injectum, animi voluptates adauget, & aqua stillatitia foliorum cordialis est; vinum conuenit tenue, clarissimum, odoratum per duas horas ante prandium dilutum ne inflet, domat enim melancholiam non aliter, quam ferrum, dicebat Marcilius de triplici vita. Commode autem illi additur momentum rosaceæ; aqua ipsa cocta sit cum radice buglosi, nec tamen multa misceatur vino timore inflationis. Vestes purpureæ sint odoratæ, sæpe permutatæ, sæpe etiā sanat ablatio causa melancholiæ, potissimum si causa fuit externa, & si orta est ex malo nuntio, bonum fingatur. Si suspicatur deuorasse serpentem, injiciatur serpens deiectioni. Si credit se venenatum, venenum mittatur in decoctionem. Si credit se decapitatum esse, pileo plumbeo tegatur ex Traliano, perpetuo autem mensa claudatur cum coriandris præparatis, vel diacitoneo, à quibus non poterit, vt prohibeatur exhalatio.

Aduerte tertio: de curatione mania ex adusta bile; phlebotomia infrigidat, & humectat corpus totum, sed caput maxime, phlebotomia intelligenda est in multis casibus ad diuersionem, & infrigidationem. Nam cum creditur bilis, non mixta sanguini, vel causa mania immaterialis est, vel cum antea satis phlebotomatum est, quod sæpe accidit in fine phrenitidis, abstinendum est à phlebotomia, infrigidat autem multipliciter, per odores frigidos, oxyrhodinum, emulsionem lactis in caput, infusionem oleorum frigidorum naribus, balnea in quibus superinfundatur capiti multa tepida, lotiones caput humectantes,



hæstantes, quæ omnia in cephalalgia biliosa, & melancholica tradita sunt. Purgatio autem repetita præcedente victu humectante, & syrupo de pomis, sitque purgatio non adurens, sed bilem modice vacuans. Capitis emborcæ frequentandæ sunt, ex tepida cum luteis, quod si non patiuntur purgari, fumant pulverem purgatorium in vino, vel in luteo oui calefacti, modice aperta membranula, apud Tralianum, succedat post balneum unctio corporis ex hydræleo, & capitis ex rosaceo apud eundem.

Quod autem hydræleum præferatur in humectando, causa est quia aqua penetrationē præstat oleo ob summam tenuitatē, oleum autem ob lentorem magis moratur, & humectat. Cur ergo capiti egenti majori humectatione adhibeat rosaceum, corpori verò hydræleum. Dic: quia ea unctio sequitur balneum agitans, quare timet ne caput recipiat melancholicos flatus.

Aduerte quarto: de curatione hypocondriacæ, quod concedit phlebotomiam tentantem, non semper est exequendum, nam cum non suspicamur melancholiam esse mixtam cum sanguine, non est phlebotomandum maxime in initio, cum nondum permixta est, eo quod sanguis oppositus melancholiam, cum minori tamen suspitione audendū est phlebotomare in melancholicis morbis, quam in pituitosis lib. de sang. miss. 16. Causæ sunt quia fax sanguinis magis cum sanguine permiscetur, quam pituita, quæ nondum accessit ad sanguinis formam, ideo simul cum sanguine melius exhauritur melancholia. Altera causa quia ob lentorem pituita hæret vasis, non melancholia.

Tertia, quia pituita ob insignem frigiditatem debilitat innatum calorem infrigidando, & per obstructionem, prohibendo spiritus nutritionē ex aëre. Quod autē additur de cura tentante 3. de locis 7. Quod in dubio aperiatur vena, & consideretur, si enim sanguis erit crassus, & niger, permittatur exire à cōmuni vena, si tenuis statim sistatur, habet contradictiones.

K ij

Prima.



Primi, nam apud Auicenam, licet apareat tenuis, non est statim sistendus: de vena etiam pugnat Mesues asserens in mania eligendam esse basilicam, in melancholia communem; causa varietatis, apud interpretes est, quia tenuis sanguis mania facile recurrit, ideo reuulsio longinquior conuenit.

Dic ad primum: conuenit inter omnes sectionem debere esse latam, & extrahendas esse 3. ij. qualiscunque sanguis appareat; quod si perseveret exitus sanguinis tenuis, suppressus est, nisi in casibus supra, si apertura sit angusta dilatanda est, si ligaturæ validæ laxanda est, si timuit supponendus est ori vas usque quo redeat. Quod si adhuc pergit exire tenuis, statim sistatur, conuenit tamen perpetuò, ut excitetur, & lintheis calidis brachia fricentur, ut crassities melancholica diffundatur.

Ad secundum: cum tam in vacuatione, quam reuulsione requiratur cõmunitas in vase secto, quæ deest in basilica, vniuersaliter sententia Mesues recipienda non est, nisi crederetur ex omni parte fluere ad caput, in quo casu conuenit, phlebotomia basilicæ, simul cum phlebotomia venæ cõmunis, maxime cum omnis atra bilis sit humor crassus 3. de locis cit.

De purgatione autem, purgat Rasis quater intra dies xvj. eo, quod crassus humor paucioribus integre non inanitur. Purgationes validæ sunt pro crassitie humoris. Nam certa huius loci interpretatio non videtur cum Herculano, ut pillularum hic scriptarum sumatur vna quarta, sed cum schylino, & alijs, quod sunt dosis vna.

Cur permiscet decoctum cum pillulis. Causa est quia timet siccitatem pillularum; & debilitatem decocti. Quare iungit vtraque, ut tamen simul perficiat curationem ex præcepto 2. acut. 11. tribus horis præcedant pillulæ ad decoctum.

Quod autem purgantia respiciant pituitam, & non solam melancholiam, causa est copia pituitæ, quæ in talibus propter melancholiæ frigus abundat. Quod interponat purgationibus solos dies tres, causa est, quia velociter subueniendum est ante.



antequam cerebrum perducatur ad prauum habitum; & quia fatius est, non permittere purgandos humores ex toto quiescere. Quare etiam 1. local. 2. in quinque diebus purgauit apoplecticum. Quod autem in diebus medijs consulit alimenta, alentia, & humectantia, causa est, ut subueniat triplici siccitati, scilicet pharmaci, morbi, & vacationis. Vomitoria autem conueniunt cum ventriculus non est debilis, nec inflammatus, & licet ex 4. aphor. 9. melancholicis non conueniat superna vacuatio, verum quia in hypochondriaca fortis est, ventriculo conuenit, sicut & clisteres magis, quam in alijs speciebus.

Aduerte quinto: de melancholia, siue sit per proprietatem, siue per consensum à toto. Si quidem sanguinea est manans à vapore sanguinis qui aduritur, confertim, & vbertim mittendus est sanguis, ita enim mox sanantur, nec timenda est copiosa phlebotomia, licet adsit gracilis habitus 6. epid. sect. 3. cōm. 29. & in ea festinandum est antequam sanguis bilesceat, & transeat ad maniam. Postquam autem sanguis cessauerit ebullire, & capiti impactus est, non ante frons secetur apud Tralianum. Quod autem quidam commendant, ut in suppressione fluxus inferni, eligantur crura, non est recipiendum simpliciter, nam apud Tralianum cum venæ in cubito, non apparent, tunc subjectas secare oportet, idest venas externæ manus, & crurum. Humor enim capitis crassissimus, tam longinquæ vacationi non cedit, sed oportet, ut præcedat reuulsio pariter, & vacuatio ex vena nigra, nisi iudicatur defluxus à toto, vel à cephalica, si creditur influere à partibus infernis. Si verò melancholia melancholica est, frequentes purgationes, & remedia cephalalgia melancholica sanant. Tantum addendum est, quod cum spiritus actuales ex vitalibus gignantur, simul prouidendum est cordi interius, & exterius. Quare condita ex consuetudine borraginis, rosarum, corticum citri, & naphæ, cum puluere diamargaritionis, & diambrae, & auri folia conueniunt, & epythemata, vel sacculi cordiales. Considerandum item melancholiam quandoque oriri, ab immateriali intemperie, quæ solis

K iij

alteran-



alterantibus curanda est, nisi forte prohibeatur defluxus, per leuia vacuantia.

Aduerte sexto: de particularibus speciebus melancholiae, vel lycantropia, idest lupina melancholia, affectio est qua homo transit in mores lupinos, nocte morans in sepulchris, Arabibus vocatur (cutubut) id est tipula, vulgo tauaõ à crebro motu, licet Auicena errans in nomine separet cutubut à melancholia.

Curatio traditur peculiaris, per somnifera, & refrigerantia, & humectantia, eo quod adusta bilis vehementer increuit. Quod autem Aët. lib. 6. cap. 11. tradit, & transcribit Auic. cap. proprio, phlebotomandum esse vsque ad animi diliquium, videtur intelligendum, vt per vices id fiat, vel quia creditur vniuersus sanguis adustus. Quare refrigeratio non timetur, sed habitus vniuersus mutandus est. Amor autem genus est melancholiae peculiare, vulgo amor heroicus, peculiarem habet curationem, & citissimam ex concessio amato, aut saltem procuratur odium, & turpitudine amati, & accessus multus extra rem amatam, & inueniatur sollicitudo aliqua maxima de vita, aut de grandi dispendio.

#### *Remedia Melancholiae.*

**P**rimum: decoctum, & pillulae Rasis hic posita, & frequentanda.

Secundum: syrupus de borrag. Validius fabox. Validius de epithymo, aqua autem in calida melancholia de endiuia, borraginis, & serum. In frigida autem fumaria, melissa. Validiores autem euadunt haec aqua, si incoquantur flores cordiales.

Tertium: in mania decoctum lauando caput, cor, & pedes. Capiti vnus castrati, additis quatuor capitibus papaueris albi, vel folliculi senae, flores, cum folijs borraginis violarum, coquantur, & lauentur alternis, vel magis quotidie cum tepida succe-



succedente vnctione, cum oleaceo, rosaceo, amigdalino.

Quartum: pulvis purgatorius testimonio Haly, & experientia confirmatus, si quaque hebdomada sumatur ʒ. ij. in sero. ℥. epythimi ʒ. iiij. lapidis lazuli, agari ana ʒ. ij. scamoni ʒ. j. gariophyla ij. Vel syrupus purgatorius cephalalgiae melancholicae. Velsumat ʒ. auroris continuis. Decoctum foliorum buglosi, borrag. betonicae ana ʒ. j. polipodij, glyserissae, radicis althaeae ana ʒ. j. ʒ. in ʒ. ij. juris pullacei, collatum quotidie potetur. Aliud solutorium lene in mense sumendum quater, maxime in calida melancholia. ℥. foliorum senae, epythimi ana ʒ. ʒ. polipodij ʒ. j. ʒ. glyserissae ʒ. j. vespere post vnam ebullitionem in jure pulli pingui, vel in sero macerentur, per noctem, in aurora collatum tepido addito saccharo potetur.

Quintum: purgatio in frigida confectionis hamec drag. iiij. radicis ellebori nigri drag. ʒ. cum syrupo violaceo fiat bollus. In calida autem melancholia, sit confectionis hamec drag. ij. electuarij de succo rosarum drag. j.

Sextum: conserua post purgationem. ℥. conseruae borrag. ʒ. iiij. conseruae rosarum ʒ. j. zedoariae drag. ʒ. sumatur co-clear tribus horis ante prandium. In calida autem zedoariae ablata jungatur conserua nenupherina par rosaceae. Finis tractatus hujus.

## CAPVT XVI.

### *De Defectu memoriae.*

**A** Duerte, in morbo omisso à Rasi, frequenti tamen ex Aëtio lib. 6. cap. 23. compendiosum, & sufficientem curationem, pro triplici morbi varietate. Contingit enim primò ex immodica inanitione, vt pote jugibus lacrimis, purgationibus, aut extrema senectate. Secundò, repente inuadit obliuio sanum. Tertiò, succedit ad curatos alios affectus, v.g. ad lethargum, vel pestem. Primi generis obliuio prouidentia est

vt



vt nihil curiose moliamur, sed reſectorio victu contenti ſi-  
mus, nam roboratis viribus redit memoria, fere enim vitia  
quæ ad extremam corporis attenuationem ſequuntur, ſola re-  
fectione ſanantur, vt defectus menſium ex immodica graci-  
litate.

Secundi generis prouidentia eſt præcautio à magno mor-  
bo ccrebri, epilepſia, vel apoplexia, talia enim præſagit is euē-  
tus. Præcautio fit victu tenuante, & vacuationibus repetitis.  
Tertij generis prouidentia requirit ſedulitatem maiorem.  
Oporter in totum abſtinere ab omni humido victu; potiſſi-  
mum à multo potu, à cruditate, à venere, ſape caput purgan-  
dum eſt hyera Ruſſi, apud Aëtium, quæ apud Meſuem voca-  
tur Hyera diacolocynthidos, cujus ſumenda eſt ʒ. ſ. pulueris,  
vel ʒ. ij. ſ. eleſtuarij. Poſt purgationem ſequantur errhina,  
apophlegmatifmi, maſticatoria cephalaigiæ pituitofæ, caput-  
que intra, & extra roboretur, caleſcat, ſicceturque juxta quan-  
tatem qualitatis excedentis. Refert Iaſo Pratenſis obliuio-  
nem quandoque oriri ex calore, eo quod immodicus calor  
ſoligines gignit pro ſpiritibus. Quare ob inopiam tempera-  
torum ſpirituum memoria læditur, quæ ſpecies moderate fri-  
gidis emollienda eſt.

*Remedia diminuta memoria.*

**P**rimum: poſt purgationes ſufficientes. ℥. ramentorum  
eboris, cornu cerui añā ʒ. ſ. quotidie ſumat cum mulſa, &  
tertio quoque die ejus loco caſtorij ʒ. ſ. in mulſa. Secundum:  
imponatur linum capiti, cum acri aceto decoctionis cala-  
minthæ, & caſtorij. Tertium: poſt purgationes dictas quoti-  
die ſumat ʒ. j. conditi galangæ, ʒ. ij. conſeruæ ſtæchados, ʒ. j.  
conſeruæ corticum citri, ʒ. j. ſ. pulueris plyris, & aromatici  
roſati añā ʒ. ij. & ſ. raſuræ eburis, thuris, coriandri præparati  
añā ʒ. j. cum aqua ſaluia, & melle ſiant conditum. Vel ele-  
ſtuarij plyris ʒ. j. ſumat quotidie per 15. dies. Validius: eſt ſi  
interpo;



interponat semen anacardinae ʒ. j. in aqua foeniculi.

Quartum: pulvis continuandus quindecim dies, ex quo sumatur quotidie ʒ. j. in aqua majoranae. ʒ. galanga, macis, cubebae aña ʒ. ij. cinamomi, anisi, rosarum, calami aromatici, foliorum stachados aña ʒ. ij. ʒ. gentiana, piperis longi aña ʒ. j. coriandi preparati ʒ. iij. sacchari ad pondus omnium.

Aliud: galanga, piperis longi aña cum butyro vacino, & melle fiat massa ex qua sumat ʒ. j. redactum ad pillulam j. mane, & tantundem vespere. Vel ʒ. ʒ. aqua vitae mane, cum qua etiam dormiturus vngat occiput.

Quintum: experientia probatum, post sufficientes purgationes, post duos menses, abstineat a cana, vtens in prandio alimentis boni succi, simplicibus, facilis coctionis, quo tempore quotidie olfaciat pillulam describendam.

Transacto autem eo tempore, cum placet memoriae mandare, incat nari pillulam j. pendentem ʒ. j. & cotto obstruat, atque ita legat, qua ablata dormiat, surgens iterum immittat pillulam eidem nari, & facile omnium reminiscetur lectorum, euadetque ingeniosior, & durat plures annos. Videlicet menthae, pulegij, euphrasiae, buglosae, coriandri, roris marini, galli cristae, verbenacae aña siccantur, & in ʒ. ij. pulueris cribrati, adde calami aromatici, styracis aña ʒ. ʒ. cinamomi ʒ. ij. gariofilorum ʒ. ij. ʒ. moschi, mellis, anacardini, galliae trochiscatae aña ʒ. j.

Sextum: vntio de qua pollicetur magnam memoriam, si quater tantum in anno vngantur tempora, frons, synciput, & tandem occiput, videlicet succi euphrasiae, calitrici, verbenacae aña ʒ. iij. collatis adde pulueris radice galanga, ruthae, buglosae, valerianae aña ʒ. iij. stachadis, sinoglosae aña ʒ. ij. anachardi ʒ. j. misce in vnguentum cum pinguedine vrsi. Finis.



L

CAPVT



## CAPVT XVII.

## De Paralysi.

**P**rimo: notificat resolutionem. Secundo: curat frequentem per purgationes. Cuius curam. Tertiò: curat eandem viſtu, & alterantibus. Quarto: curat resolutionem infrequentem ex externa percuffione ſuccedentem, &. Quod ſi paralyſis.

Aduerte primo: de viſtu in cauſa frequenti frigida humida. Oportet eſſe ſufficienter calidum ſiccum. Aër ergo talis eligatur, conuenit vicinitas clybapi, & impoſitio linteorum calidorum, & inſolatio, & immiſſio in tinna aquæ, vel olei ſeminum calidorum, vel vulpis decocta. Vel in vinacea cumulata ſepeliri, vel in arena maxime marina. Commendat balnea, id eſt ſtuphæ, & thermæ ſulphureæ ſalfæ, aut aluminofæ, videlicet tranſactis 30. diebus, apud Paulum, apud Auicenam conſentitur vtilitas ex euacuationibus, eo quod thermæ ſunt euacuationes particulares requirentes vniuerſalem. Recte autem commendat Meſ. vt poſt quoduis horum ſiccans, non ſequatur ſtatim aliquod humectans, videlicet cibus, potus, ſomnus, aliàs enim ſtatim reponitur in corpore ſiccato humiditas.

Secundum: vigilia commendatur, ita vt non ſit vitioſa, ſed cum labore accomodato virtuti, apud Meſuem.

Tertium: exercitium laudatur modo recipiat à re leui, ne repentinus aggreſſus ferat materias ad membrum debile, & modo ſit proprium, vt ambulatio cruri reſoluto, & locutio linguæ reſolutæ.

Quartum: inter alimenta commendantur ſtrobili, cerebrum leporis aſſum, columbi, & magis palumbi, ita vt etiam morari juxta columbarium, ius galli veteris, oſſa gallinarum aſſæ carnes rapacium; Ericci, caro ſalita aſſa, aut frixa cum aromatis,



matris. In vniuersum cibus parcus, potus parcius, ita vt primis 7. diebus solam mulsam prabeat, aut mel rosaceum, aut ptyfanam. Sed ptyfana reprobatur à Rasio nisi in calida causâ; prasente autem febre, vsque ad 40. dies vitur Nicolus iusculis ex farina hordei, & iure cicerum preparato cum oleo nucum, & pauco synapi. In vi autem debili addantur parua aui- culæ assæ, & palumbi ex preparatione Zoar. lib. 1. tex. 9. & lib. 2. tract. 7. Laudat Mesues talos alphasyra, id est turiones brionæ. Haly laudat mel cum nucibus. Zoar. lib. 1. tex. 10. in morbis neruorum gallos potissimum magnos nigros, comen- dat pullos nycticoracium, & cyconiarum, & vt furmentum sit valde purgatum à lolio, est enim infestum capiti, non tamen sit omnino mundum à fursure, Zoar. nutrit pullos carnibus vi- perinis coctis tussis, cum farina hordei, vsque quo depillentur, quorum pullorum vis tamquam summe dissipans, & ad cutem trahens commendat in paralyti, & elephantiasi, cum Galeno 10. simp. cap. de vipera. Commendat Paulus, & Aurelianus aërem lucidum modice calidum maxime maritimum. Vi- num summopere noxium est, vbi tamen vrget necessitas; sit minime tentans caput, tale est aquosum, album, & austerum lib. de euchymia ad fin. & 3. acut. 3. Nam crassa dulcia inagis tentant 6. 4. summa 2. cap. 31. licet Matheus contra sentiat.

Post aliquot tamen vacationes quidam determinant post dies 40. ad latitiam, coctionem, & resolutionem paucum vini antiqui, sed exhibenda est aqua sicut in cephalalgia pitui- tosa, vel aqua sacharata in causa calida, & commodior est ex aqua pluuiæ, nam aliquid adstringit 7. loc. 2. & apud Aëtium lib. 3. & apud Paul. lib. 7. ideo collyrijs expetitur, & fluxibus; ideo tardius corrumpitur 4. de sanit. 12. ideo etiam non valde penetrat neruos. Præterea parum frigida est, vt pote experra adione calidi; ex Oribasio lib. 5. Nicolus exhibet stillatitium liquorem majoranæ, iuæ, saluiæ, primulæ veris cum 6. parti sa- chari, vel mellis, & aromatizat cum cinamomo. 7. in 10. q. 1. 4.

Aduerte secundo: de coctione, licet medicamentum

Lij

pro-



proportione debeat respondere morbo 3. simp. 12. Quare humori difficilis educationis fortior competit medicina, sicut de cephalalgia pituitosa. Verum aduertit Mesf. quod si humor, nec ob multam distantiam, nec ob crassitiem, & lentorem est difficulter educibilis vna vacuatione valida, licet erradicatiue euacuare. Vbi verò secus præstat per plures, ita vt priores sint lenes, tam in coquendo, quam in purgando. Prima causa ne virtus statim resoluatur. Secunda, ne validum medicamentum instar flammæ absumat tenuem, reliquo manente difficillimo ad educationem. Additur tertia causa in morbis nervorum, ne humor motus, & liquefactus à pharmaco magis impingatur nervis. Quo fit vt in humore crasso, apud Auicenam cap. de ouo, & in humore longuinquo à vijs ductuum, vt in morbis nervorum præcipiantur remedia validissima, ita tamen vt in primis diebus, non nisi valde remissa prabeantur, quod Galenus fecit 1. local. de alopecia, & obseruandum est in paralyfi, adhuc magis propter tertiam causam dictam, videlicet quando non jungitur læsio sensuum, & mentis, nam si jungatur in paralyfi, vel tortura, ob periculum imminētis apoplexiæ festinandum est ad magnam euacuationem.

Nec obstat, quod extremis morbis diligentissime extrema remedia adhiberi præcipitur 1. aphor. 6. quia vniuersaliter in curatione à debiliore inchoandum est. Prima causa, quia natura assuefacta debili, postea sine noxa tollerabit forte 2. aphor. 51. Altera causa, quia saepe in initio morbus non plane cognoscitur, quare in applicatione fortis medicamenti veritur insigne periculum. Casus autem in quibus irregulariter incipiendum est à forti, iuxta præceptum 22. 3. de curatione dolorum juncturarum reducitur ad quatuor sen. 4. 1. cap. 1.

Primus: vbi materia turget, quare timetur defluxio ad membrum nobile. Secundum, quando corpus est aptum ad morbum magnum, licet quiescat humor aptus apoplexiæ, vel hæmoptoisi. Tertius: quando morbus est periculosissimus, vt phrenis, & angina. Quartus: quando vis non est tam valida, quod



quod credatur durare posse, usquequo leuia fiant remedia, nec tam debilis, vt nec modo possit ea tolerare, nam tunc exequenda sunt valida statim, quibus ferendis postea non erit, & est casus frequens iuxta aphor. 21. lib. 2. Num autem inceptio à leuioribus in morbis magnis perficiatur sufficienter, cum parua dosi magni remedij, aut requiratur etiam leuitas in qualitate remedij. Dic: præstat incipere à leui, tam in qualitate, quàm in quantitate, maxime in morbis neruorum. Si verò Galenus in alopecia inchoat à cocheis, in paralyfi verò à fætidis, & Mesues in paralyfi, ab exhibenda theriaca, habet duplicem excusationem. Vna: quia corpora eo tempore erant validiora; altera, quia docet curare quando Medicus vocatur, vocatur autem in his morbis Medicus, quando morbus viget, non quando incipit. In qua autem paralyfi, plus temporis abstinendum sit à validis. Dixit Auicena in forti, ob tres causas dictas, quare in leui sufficet expectare 4. dies, in valida 7. in validissima 14. ita vt in validissima in primis diebus mites clisteres suspecti sint, post primos autem dies modicissima paulatim agenda sunt.

Aduerte tertio: de vacuatione, ac primo: de phlebotomia, Aurelianus statim phlebotomat reprobans Erasistratum, eo quod omiserit phlebotomiam, plurimum commendans post statum scarificatas cucurbitas, similiter & Aët. lib. 6. Haly verò 5. pract. & alijs displicet. Nam fere morbus est cacoehymicus, vis imbecilla, multa crudorum humorum copia, & nerui ex frigore male habent. Nisi ergo resolutio sequatur ad casum, vel copiam humoris sanguinei, periculosa est, imò etiam in sanguinea paralyfi propter causas dictas, apud Tralianum parce mittendus est.

Secundum: vomitum fere laudant, cum conditionibus, quod assuetus sit vomitibus, maxime si intermisit consuetudinem: quod fiat in ætate; quod gradatim inchoet à leuibus, causa commendationis est, quia in ventriculis talium multa pituita coassueratur, ob frigiditatem.

L iij

Tertium;



Tertium: clisteres seu reuellentes commendantur, seu vacuantes, maxime quia resolutam habent aluum siccam propter obtusum sensum intestinorum, in quibus etiam gradatio obseruetur ex Haly, licet Auicena simpliciter concedat validos, licet autem mittere in clisteres duplam dosim, & eo amplius, quod per os sumitur.

Quartum: diuretica post sufficientes purgationes summo opere faciunt, ad vacationem crassorum humorum, tam in paralyti, quam in podagra 22. 3. tract. 2. cap. 7.

Nec obstat, quod videntur nocere, eo quod fundunt sanguinem, separant ethorogenia, vacuant seorsim, quare relinquunt humorem crassiorem, quam erat, & ita nocet expectorationi 5. simp. 13. Quare vacuatio multi serosi, siue per urinam, siue per sudorem, in tenuibus humoribus sola potest sanare, in crasso verò non, nisi jungatur cum vacatione crassi humoris qualiscunque abundauerit 3. cris. 3. diutini sudores soli nunquam suffecerunt sanare febres pendentes à crasso, vel mixto humore citra purgationem illius, siue in gallica lue, nec in paralyti, aut podagra.

Non obstat secundo adagium Italum, à nephritide podagra, cuius causam referunt ad vsum diureticorum in calculosis, quasi inducant podagram, quia in corpore pleno calculoso valida diuretica inducunt podagram, in podagrico verò purgato diuretica gradata sanant 2. continent. Commendatur prouocatio sudoris, ad eundem vsum, vincto dorso ex anethino calido. Quare vel hoc nomine commodissime sumi potest decoctum guaici, vel salsa parrilhæ.

Quintum: purgationes repetitæ commodissimæ sunt. Quidam 1. continent. sumunt quotidie pulueris hyeræ 3. j. cum 3. b. piperis, à quo non supra potent, vt moretur in ventriculo. Vulgatio purgatio fit per itinationes gradatas, ita vt sumatur initium à leuissima ad validissimam purgationem. Vel ab vna 4. dosi maxime validi purgantis, vsque ad maximam dosim. In diebus autem intermedijs exhibeantur particulares capitis



capitis vacuationes similiter gradatae.

Quod autem dies interponendi sunt singulis purgationibus, Zoar. lib. 1. tract. 9. cap. de vertigine dixit juxta numerum, dejectionum. Galenus autem 2. local. in alopecia tres dies interponit. 1. continet. praecipitur ut saltē 7. quoq; die: sternutatoria tamen propter magnam agitationem suspecta sunt, ante integram corporis vacuationem, sed si causa est in occipitio, tutiora sunt errhina, si in syncipite masticatoria, & gargarismata.

Aduerte quarto: de alterantibus, pracepta. Primum Traliani, quando oritur resolutio ab intemperatura immateriali, calida, sicca, in qua sola refrigerantia, & humectantia; demum victus omnis haeticus sanat.

Secundum: ex intemperie quandoque oritur immateriali frigida recusans purgatorium, sed solis calidis intro, & extra: sanatur potissimum cum thermis, de quibus tantum docet Tralianus, non esse illis diu immorandum, nec bis in die lauandum, ne immodice siccentur, & ut tempore intermedio persruatur adjumento illarum.

Tertium: in reliquis speciebus alterantia, & roborantia intro, & extra succedant purgationibus cum gradatione, ita tamen, ut ex Haly, si tempus est aestas, aut laeditur, & non iuuatur à calidis, caueamus ab illis; & ex Auicena memoremur, quod in fine curationis resoluentia habeant admixtum aliquid adstrictionis, oportet enim roborare membrum, ne facile redeat affectio, idem Auicena commendat, ut si succedit febris ommissa paralyti, curetur cum acetoso, & melle rosato.

Quartum: ex Haly, & Traliano cap. de melancholia, quando morbi longi post repetitas vacuationes durant, oportet esse contentum probo victu, usque ad sequentem anni mutationem, quia aliter natura infirmatur, ita ut morbus reddatur immedicabilis. Rasis verò post circulum purgationum ad eundem finem intermittit dies decem, quibus transactis redit ad circulum purgationum, incipiens semper à mitissimo.

Quintum;



Quintum: cucurbita commodissime imponuntur in capite lacerti lasi post aliquantam purgationem ad vacuationem contenti humoris, post integram autem vacuationem, ad roborationem innati caloris, sint autem cucurbita angusti oris, cum multo igne, & parum morentur; illa enim tria faciunt ad multam tractionem, sine resolutione. Quare quod 5. aph. 5. commendatur cucurbita magna retinendis mensibus, intelligatur de magnitudine ventris, non oris ex Auic. & Aurel. ex Hippocrate enim lib. de medico, duo sunt modi cucurbitarum, parvus circulus, oblonga cucurbita, ad profundos dolores. Magnus circulus, venter amplius, ubi dolor occupat multas partes superficiarias. Talis enim si dolor profundus est auget malum, apud Hippocratem, eo quod trahens à multa superficie, & contrahens pellit ad profundum. Aurelianus ait, quod si necesse est, cucurbita multae imponantur dorso, incipiendo à superioribus, tam in impositione, quam in extractione, sequente synapismo, vel dropale.

Sextum: commendatissima est etiam perfusio in oleo vulpino, vel Lyenæ. De qua Matheus putat ex Serapione conuenire etiam in initio paralyseos, vel arthritide frigidorum, sed non probat. Nam Serapio in eo capite nihil habet proprium, sed vertit Galenum non exacte; habet enim Galenus 11. simp. 52. eam balneationem morosam vehementer haurire ex profundo, non solum materiam conjunctam in iuncturis, sed etiam antecedentem vasorum, quo fit ut propter eximiam resolutionem, non sit totum ante vacuationem. Lyena autem arabibus est adit, nobis adeps frequens Africæ, similis in virtute vulpi, & licet Galenus in oleo coquat alterutrum illorum, siue viuum, siue mortuum, satius est coquere exanteratas adhuc calentes; nam excrementa sine vtilitate sordidant, præstatque effundere aquam sufficientem parem oleo, cum sænu græco, salua, hypirico, althea, & sale.

Septimum: conueniunt, & frictiones post purgationes, ita ut parti sanæ adhibeantur validiores, agræ verò lenes.

Octauum;



• Octauum: locus imponendi remedij est origo nerui lassi, siue fuerit interna, siue externa latio, benefacit tamen etiam totius vnctio resoluti membri propter nerui continuitatem.

Aduerte quinto: de particularibus resolutionibus, scilicet ex casu, ex permutatione colicæ, & de resolutione linguæ. Primum, si ex casu, initio curanda est cura casus. Victus tenuissimus potius refrigerans, reprimens, phlebotomia ex aduerso precedente, vel vomitu, vel clistere pro varietate ventris pleni, quantitas sanguinis pro varietate casus, & nobilitatis membri percussu. Repellentia autem loco percusso imponantur. Mumia bollus, sumach, mirthi cum mirthyno, & albumine in stupis canabinis, vel in multis lintheolis, quorum alter alteri superinijciatur. Sedato autem fluxu, siue si non timetur fluxio ab initio, si locus contusus, est minutissimas contusiones passus, ita vt jam receperit humorem præter naturam, imponenda sunt, in circuitu quidem repellentia, supra attritionem autem emplastrum laudatum 6. therap. 3. ex oxymelite, cum farina fabarum, & si dolor jungitur addita pice liquida imponatur calens medicamentum. Si autem totum corpus verberibus conquassatum est, ita vt plus sit sanguinis concreti sub cute, quàm impetus fluxionis, intra diem naturalem sanat pellis ouina calida recens detracta 11. simp. 22. Calor enim innatus omnium plurimum iuuat in resoluendo, quod prisce hic, & in oleo vulpino fecerunt, posteriores etiam in phrenitide. Si autem videtur multum concretus sanguis liquandus, commode inspergitur pelli minutissimum sal.

Si verò in casu timetur fluxio, præstat in linteo innoluerre imbuto vino decoctum, sumach nucibus, cupressi mirto etiã expresso. Item exhibeatur præstans remedium Mesues cap. de Rhab. licet corrupte legatur ex Auic. cap. de rubia. Videlicet ℞. Rhab. ʒ. j. rubiæ gr. xv. mumia gr. ij. in vino austero. Quod si post aliquot dies à casu succedat paralytis ex 1. de local. in fin. imponendum est remedium loco citat. vt resoluatur durities, quæ creditur ibi remansisse. Scilicet ℞. farinae fenu græci ʒ. j.

M amo-



amoniaci ʒ. ʒ. ʒ. adipis anatis, lininiceræ ana quantum sufficit ad emplastrum. Nam si repente succedat resolutio ad casum, vel ictum, fere incurabilis est.

Secundum præceptum: de resolutione ex permutatione cholica. Dicitur facile sanabilis est, quia materia est cocta, quare etiam crisis permutationis ad membra externa, & quia materia facta est tenuis, alioqui non posset repente pelli ad nervos, ideo etiam dicente Paulo sensum in talibus fere seruari. Quare apud Haly 5. pract. 22. scribit difficulter curari, intelligendum & credendum errorem esse interpretis.

Curatio fit per remisse calida, aliter materia extenuata extenditur, & magis infestat. Quare ait Auic. permiscendum est aliquid in quo frigiditas vincat, vt glycerissa, in quo Auic. recte fecutus est Galenum, & Paul. & Serap. locantes glycerissam in 1. gradu frigoris, & humiditatis, sicut & 1. 4. tract. 2. cap. 17. commendauit ad sitim licet 2. can. oblitus sentiat inclinare ad calidum humidum. Peculiariter commendat Auicena in talibus medicamentum, sauroi, & ex gummi albescant, quæ interpretes prauè explicant, cum ibi transcribat Galenum 4. de sanitate 11. & Paulum commendantes duo genera acoporum, videlicet populeum, & abietinum. Inungendi sunt cum anethino duabus partibus, violati parte vna, decimoquoq; die sumuntur cass. in aqua faniculi, cum pauco amigdalino, & alantur cum pullis, cum calidis enim fere male habent.

Tertium: in resolutione linguæ, post vniuersales vacationes assidue gargarismata, & si venæ sub lingua tument, phlebotometur, fricetur vndique lingua, cum anacardina, vel cum castorio, & massa mastichis. Optima est cucurbita imposita primis vertebris colli ablatis pilis, & si non sufficit, imponatur ibi vesicatorium cephalalgæ.



*Remedia*



## Remedia Paralyticos.

**P**rimum: continetur primis diebus mulsa simplex, paulo post sic, ℥. decocti stachados, saluix, roris marini. Secundum: ex saluia minute concisa, cum melle despumato fiat electuarium, quod solum primis diebus conceditur. Vel fiat manus christi ex saccharo, & aqua saluix permixto puluere cinnamomi, nucis muschata, zinziberis. Vel fiat erispella ex farina saluiaque.

Tertium: clister in 2. die exhibeatur lenissimus, post tertium infundantur clisteres lenes, cephalalgix pituitosæ. Post decimum validi.

Quartum: digestium in primis diebus, mulsa composita dicta; post septimum, syrup. de stachad. simp. cum aqua saluix, post decimum quartum syrup. de stachados compositus, & oxymel schylinum, peculiariter autem confert capiti, & nervis syrup. Zoar. descriptus capite de tremore.

Quintum: in paralyxi 4. die, in valida autem 7. die sumat hyera simp. ℥. ij. agarici trochiscati ℥. j. post dies autem quinque dupletur quantitas. Post 14 pillularum fatidarum vnam. Vel in jure galli electuarij indi ʒ. iij. β. aut turbith, agarici preparati ana ʒ. j. zinziberis ℥. j. hyera, logodij, agarici ana ʒ. j. in decocto saluix, & stachados cum ʒ. j. mellis rosati.

Sextum: roborat si quotidie sumatur pillula j. dormituro pendens ℥. j. ex assa cum paucissimo castoreo, & apopana-co, vel alternis diebus puluis in mulsa; vel in oxymellite schylino, vel stachadis ʒ. j. hysopi ʒ. ij. radice paonia ʒ. iij.

Septimum: abluatur crebro membrum resolutum, ex aqua vita, & vino albo paribus. Vel aqua saluix, & stachados ana ℥. j. vini albi ℥. β. mellis optimi ʒ. iij. salis ʒ. j. bullita, vel anchini ℥. β. cum catulo vulpis in aqua sufficiente, vsque ad ossum separationem. Vel in musto ebulliente in quibus membrum resolutum moretur.

M ij

Octa-



Octauum: vinctio præcedente, aliter præfente febre ex rosaceo, & camomelino, in frigida autem paralyfi lenis vinctio est ex nardino, cum marciatone, validior addito oleo de castoreo. Adhuc validior lumbrici terrei in clibano siccati, galangi, piperis, ana ʒ. j. mellis lb. j. Aliud simile succi ruthæ post residetiam lb. ʒ. stercoreis columbini, quod sufficiat. Validior est lenimentum apoplectici quintum.

Nonum: suffitius, ʒ. sulphuris ʒ. ij. cum fœnu græco, salvia, hypirico coctis in pluuiali suffiatur membrum resolutum, vel omnino opertus intra papelionem constituatur nudus, & in vinum album decocti dicti mittantur igniti lapides, & sudet præfente medico, quantum possit tollere, exiens ablterfo sudore illinatur ex dictis, sumatque per os electuarium roborans.

Decimum: electuarium mitissimum de stachados, inde florum roris marini, & aurantij. Validius diamoschus, vel plynris, vel nux muschata condita, vel zinziber conditum. Validissimum in sola pituitosa ad febrem protocandam anacardina ʒ. j. vsque ad ʒ. j. à qua dormiat, & tardet cibum. Finis.

## CAPVT XVIII.

*De Stupore, & tremore.*

Incipit, Cum aliquis, &c.

**O**B familiaritatem iungit duas affectiones nervorum. Adverte primo: stupor, & tremor sunt diminutæ actiones, primum sentiendi, alterum mouendi, sicut paralyfis est integra ablatio vtriusque, cum autem ablatio, & diminutio pendean, ab eisdem causis sola quantitate distantibus, fit vt curatio in vtrisque sola quantitate remedij differat. Cur autem diminutus sensus in stupore non appareat, nisi per intervalla, diminutio autem motus in tremore perpetua sit. Causa est quia vir-  
tus



tus sensifica, non est in opere, modo quidem contrahendo musculum vnius partis tantum in motu membri, modo contrahendo vtrumque musculum in sustinendo membrum.

Aduerte secundò: de præsagijs Rasis. Sumitur præstantior prædictio ex parte in qua accidit stupor. Nam si in facie est, præagit torturam, si in quouis alio membro, resolutionem partis, si in cerebro, apoplexiam, vel epilepsiam, si in dorsali, paralysem, aut conuulsionem, si in totum, & perseverat, significat defectum spiritus in radice, quare mortem. Intelligitur item prædictio ex adjuncto, nam si stupori jungitur vertigo, nuntiat apoplexiam.

Aduerte tertio: num frigida lædant nervos. Ostensum est 3. artis parua, quod sicut naturæ per totum valde recedentes a temperamento sunt præseruanda, per contrarium, non per similia, ita & membra à temperamento humano valde recedentia. Sed obstat primò: quod facies, oculi, & os iubentur ad conseruationem foueri multa frigida, apud Cels. lib. 1. Secundo obstat 3. de temp. vlt. sumi indicationem à temperamento naturali ad similia.

Dic ad primum: calor faciei, & oculorum ex parte componentium exiguus est, sed ex parte spirituum plurimus, ob multitudinem sensuum in facie, ideo ea pars coloratior est, & magis affectibus animi mutatur, & magis tolerat nuditatem, & bene habet lotionem cum frigida. Quod verò spiritus actualis accedat, & valde calefaciat membra, monstrant membra resoluta, quæ ob spiritus actualis defectum, repugnantis vtriusque extremo, ab externo calefaciente vruntur, & à refrigerante gelantur, & videtur ea causa symptomatis in quibusdā habitibus aliquam particulam debilem, sentiunt enim per quadam intervalla glaciale frigiditatem modo, modo flammeum calorem, videlicet quia ex obstructione partis, cum non possint accedere spiritus animales, reddunt membrum obnoxium illis immoderantijs, ergo lotio faciei cum frigida ideo roborat innatum calorem, quia spiritus plurimus tenuissimus facillime

M iij

reso-



resolubilis ita coercetur, & per antiperistafim roboratur. *Æ-*gumentum est, quia si calor faciei est valde debilis, ita ut timeatur, nec non roboretur per oppositionem contrarij, præcipitur ut cum vino albo lauetur, & fugiant omnino frigida scilicet in obnoxijis catharro, ob intemperaturam frigidam humidam cerebri. Ideo Celsus citat. cum addit nisi hyems fit, & Auic. de cura epilepsie deniter ablutionem, cum aqua penitus, & ob eandem causam oculi tolerant frigidam, & nunquam rigent, licet Aristoteles 31. prob. 22. magis referat ad pinguedinem eorum.

Ad secundum: agit de alimentis Galenus ibi, quæ cum patiantur, & quo sint similia melius alant. 6. de sanit. 2. requirunt semper similitudinem ad alendum, secus est de agentibus per alterationem. Præterea agit de actû agris, quorum temperies naturæ conseruandæ sunt.

Aduerte quartò: de tremore orto à potu vini confidit Galenus soli abstinentiæ, scilicet quia tenuis substantia est, licet per penetrationem lædat nervos, vel lædens, vel pungens, quando vertitur in acetum. Verum quia tenuis est, & calida, speratur sua sponte resoluenda ex probo victu, frigiditas verò aquæ nivalis densat substantiam nervi, quare ultra abstinentiæ causæ frigorificæ, additur à Ras. calefacientia, qualia sunt longa insolatio, aut sepeliri in arena ad solem testò capite. Tremor autem particularis fere fit à defectu spirituum, cujus agnitio est quia ex quouis labore syncopisat, & ex alimento recreatur. Petenda est autem curatio ex reparantibus copiam spirituum carnibus volatilibus maxime odoratis, & assis, luteis, vino odorato pauco ex dimidio temperato.

*Remedia stuporis, & tremoris.*

**A**D stuporem, & difficilium motum ex crassis humoribus lenimentum coquens, & roborans. Mirrha, amoniacum, dissoluantur in aceto addito camomellino, & croco, & fiat lenimentum. CAPVT,

## CAPVT XIX.

## De Tortura oris.

**A** Duerte: curatio traditur per omnia similis paralyfi, quare lente procedendum est cum coquentibus, & vacuantibus, & in sanguinea cum phlebotomia cephalica; tunc succedat sectio venarum linguæ in vacuationibus item particulis, & localibus reinedijs sensim procedendum est. Præterea memorandum est, cum huiusmodi affectus, quem vocant spasum cynicum, eo quod instar canini intorquentur, quandoque oritur à paralyfi neruorum faciei, quandoque vero à conuulsione.

Si causa est conuulsio, requirit emollientia ante impositionem resoluentium, partim quia humor efficiens conuulsionem saepe est crassus, cum paralyfis ex tenui oriatur, partim quia in spasmo licet non adsit humor crassus, adest tamen contradictio densans neruum, & impediens penetrationem medicamenti. Vniuersaliter autem in tortura, post vacuationē commodè affiguntur cucurbitulae ceruici siccae, ad deriuandū, & calefaciendum.

Postremo cauterium in vena, retro autem partis affectæ, quandiu seruat apertum. Quod ergo in primis diebus locat agrum in loco obscuro, causa est, ne pro lumine inspecto tracto ad faciem, spirituum humor faciei dilateretur etiam cum spiritu, qui in varia inspectione non diffunditur, in se coactus ea calefaciat, & sanet nerui obstructionem, quæ causæ validiores sunt, quam Mathei, hic scilicet, ne ex cognita turpitudine, per flatum aduersum consternatur animus, & alijs reddatur vilis.

*Remedia*



*Remedia Tortura.*

**P**rimum: crebra inspectio in speculo chalibino ex aduerso tortura, ita vt conetur perpetuo dirigere faciem, & tunc precedente vnctione, cum plumiceolis leniter ligetur directa facies.

Secundum: jugis ablutio faciei cum decocto aceti lb. ss. synapis drag. j. ad iij.

Tertium: gargarismata, & errhina, vertiginis; peculiare errhinum est, succi anagalidis ꝑ. j. nucis myristicæ pulueratæ ꝑ. j. sugatur, mox illinatur intra nares.

Quartum: ablutiones, & vnctiones paralyseos, sed si tortura oriatur ab spasmo præcedat vnctio leniens fænu graci, seminis lini, butiri, assungia anatis, medullæ cruris vacini, olei amigdalorum dulcium aña ꝑ. ss. nucis muschatæ ꝑ. j. cum cera. Vel misceatur asipus, cum resoluentibus scilicet galangæ ꝑ. j. zinziberis, nucis muschatæ aña ꝑ. j. olei castorei, & vini albi aña ꝑ. iij. ad consumptionem vini, cum cera, & asipi ꝑ. ss.

Quintum: caro rapacium cocta trita calida, cum oleo nardino imponatur.

Sextum: Suffitus faciei frequens ex decocto camomillæ, stachados, calaminthæ, majoranæ cum lapidibus ignitis.

Septimum: ellectuarium ex semine juniperi, & melle sumatur quotidie ꝑ. ss.

## CAPVT XX.

*De Conuulsione.*

**A**Duerte primò: de spasmo ex repletionem est multo velocior, tam periculosior, quam paralyssis, maxime si sunt duo simul, quæ species vocatur rigor, vel tetanus fere interimēs intra quartū ex ꝑ. aphor. 6. quare victus conuenit tenuissimus

vt



vt in paralyſi, vacuatio tamen tardanda non eſt, imò nec permittenda ſemper concoquentia, ob imminens periculum, localia autem ita varianda ſunt, vt biduo imponantur emollientia, reliquo biduo reſoluentia, ob craſſitiem humoris, frictiones cum linteis calidis, & manu ſemper frequentandæ ſunt, & cum pellibus vulpinis, aut lupinis adhuc calidis membra contegenda ſunt, cucurbitæ verò ſiccæ, ſi materia pauciſſima eſt, commodè imponuntur ſinibus lacertorum, ad calefaciendum, & euocandum ſpiritus ex Auicena. Si verò humor copioſus eſt, vel abſtinendum eſt ab illis, vel ſcarificandæ ſunt, ne humor tractus magis lædat. Rigor qui aſſeritur acutiſſimus ab Hippocrate, intelligitur occupans totum corpus, particularis enim, nec tenuis eſt, nec acutus.

Aduerte ſecundò: de ſpaſmo ex inanitione. Intentio eſt alere cibis ſubſtantificæ, & qualitatiue humectantibus, facilis coctionis, & penetrationis in anguſto ventris, propter denſitatem contractam quales ſunt ſequentes.

Primum, oua ſorbilia, vel tremula, aliquantum magis alentia, & morantia in coctione.

Secundum, addunt recentiores vinum valde lymphatum tenue, non antiquum, odoratum, quod per horam ante potum permisceatur cum aqua cocta, & refrigerata.

Tertium, aqua carnis multiplex, vna eſt ex gallina parum cocta in plurima aqua, cum lactuca, & ſeminibus cucurbitæ conteratur, & poſt integram coctionem per linteum coletur, & præmatur.

Alia: in olla noua operta, & illita cum maſſa, fruſta gallinæ, dempta cute, propter pinguedinē immittatur, ſupra fruſtos ligneos pendula in cacabo bulliente per horas tres, cum auréis decem, aperto operculo liquor exiens ſumatur. Alia: corpus maceratum per diem in vino, tritum in clybano diſtilletur, & addito luteo repente reficit. Alia: fruſta panis, hœdi, & gallinæ mittantur in alambicum additis aqua roſarum, bugloſæ, acetoſæ, pulueris diamanargaritionis drag. j. panis auræ.

N

Quar-



Quartum, ptyfana simplex, cum carne testudinum fluui-  
lium prius lota cum lixiuio, deinde cum aqua rosarū, eo quod  
defunt nobis cancri fluuiiales Gallorum, & testudines nemo-  
rales Insularum.

Quintum: lac asininum, vel muliebre, vel saltem capri-  
num exceptum in vase, in quo infundatur calidum, & laneo  
operimento adhuc calidum potetur, cum saccharo puluerato.

Sextum, balneatio in tepida, vsquequo intumescat corpus  
& statim exeat antequam intumescat, quare sit præsens medi-  
cus, & præstat si in sacculo addantur violæ, flores nymphææ,  
hordeum fractum, folia salicis. Præstat adhuc si addatur lac, &  
magis si est balneum olei, quando non timeretur calor ejus.

Septimum: vntio spinæ dorsi bis in die horis temperatis  
olei violarum, & nymphææ añā ʒ. j. & β. lauentur saepe in fri-  
gida, ad le assungia gallinæ, anatis, medullæ vituli añā ʒ. β. mu-  
cilaginis psilij, tragacanthi, gumi arabici ʒ. j. cum cera alba.

Octauum, restaurantes panes cineritij ex carne testudi-  
num cum saccharo, & amigdalīs, & oua ipsa testudinum, & pul-  
pæ eorum cum gallina cocta.

Nonum, pulli albi nutriti cum lacte, & farina hordei.

Aduerte terriō: in non proportionata ad materiam. Pri-  
mum si ex vulnere est, mittatur vulneri therebentina, cum lu-  
teo, & superponatur althea calida cocta, cum rosacea, spina vn-  
gatur cum amigdalino, & saepe mittatur ager in tinam olei.

Secundum, si ex morſu venenoso, intra duas horas repe-  
tatur bis cucurbita in loco morſus. Vel gallus, cum ano deplu-  
mato supra morſum, & si gallus moritur bonum est.

Tertium, si ex frigore est, solum vntio ad ignem cum  
anethino sanat.

Quartum, si ex dolore, stupæ cum rosaceo, luteis, & la-  
cte. Vel panis calidus infusus lacte, additis luteis duobus. Va-  
lidius est, si addantur opij gran. iij.

Quintum, si ex consensu ventriculi, saepe sanatur vomitu  
ex i. aphor. i.

Sextum:



Sextum, si ex flatu (vulgo cambra) frictione perpetua, & clisteribus resoluentibus simul, cum vntione conuulsionis materialis.

*Remedia Conuulsionis.*

**P**rimum: vntio in conuulsione ex repletionem. ℞. Syracis liquidæ ʒ. j. olei lini ʒ. ij. euforbij castorei ana ʒ. j. cera quod sufficit.

Secundum: vngatur ex terebentina cum aqua vitæ. Vel imponatur sacculus ex fanu græco cum sale.

Tertium: post purgationem, concilians robur nervis, ℞. mentha, salvia, betonica ana m. ss. gariophylorum, piperis, cardamomi, galangæ ana ʒ. ij. radicum consolida, calami aromatici, enula, ana ʒ. ss. rosarum rubrarum m. j. contendantur radices, & cera suauiter, & bulliant omnia in sufficienti vino albo odorato, ad tertias collato, & expresso adde anethini ʒ. j. bulliant ad vini consumptionem, in fine adde euphorbij puluerati drag. ij. croci ʒ. ij. Finis.

## CAPVT XXI.

*De Catharro.*

**A**duerte primò: de victu catharroforum præcepta. Primum aëris immoderantiæ summopere cauenda sunt propter mollitiem, & debilitatem cerebri aptissimi vt lædatur; in lib. de phleb. 8. tum quia aër accedit ad cerebrum, tum quia catharrofi peculiariter habent cerebrum debile, multo autem magis fugienda est frigiditas, cum præcessit calefactio. Nocturnus aër omnino caueatur, quare nec per æstatem aperta fenestra dormiendum est, & perpetuo ante solis ortum surgendum, quædam alia cautiones eleganter traduntur à Celso lib. i. cap. 5.

Secundum: inter cibationes, nec edendum, nec bibendum

N ij

est,



est, & à surrectione ad prandium intercedant horæ sex; à prandio ad cenam octo, post cibum quatuor horis quiescat animo, & corpore i. aliment. i. comode adhibetur lotio capitis singulis septimanis, ex cephalalgia pituitosa, & si fieri potest caput nunquam veste velandum est, Cels. lib. 1. cap. 4. Cæna autem omittatur, aut levis sit, a qua per horas duas, aut tres, vel stet, vel deambulet. Benefacit perpetuus vsus sachari rosacci, potus autem in calida sit decoctum seminis malvæ, vel aqua sacharata, & retentio frigida in ore. In frigido autem catharro aqua glycirrisa perpetuo, rosa tusa, vel origani, vel mulla, immodicus tamen potus perpetuo vitetur, quare etiam iura in cæna conferunt. In calido pultes hordeaceæ, & lac caprinum apud Auiconam; in frigido autem jus cicerum, & taluinæ, quæ fit ex lacte surfurum, cum lacte amigdalino injecto sacharo, potestque construi cum iure pulli.

Tertium: initio integra quies convenit, sicut in reliquis fluxibus, ita ut etiam sternutatio, & clamor obsint. Nec obstat, quod id curat Rasis initio per sternutatorium; quia est cura tentatiua, quare conjectat catharrum pendere à leuissima causa.

Quartum: somnus sicut cibis, & potus, ut pote humectantia oportet esse paucissima. Abstineat à cibo, & potu omnino die, ac nocte, & remouebitur; modus cubandi ex Auic. sit demisso capite, ita enim minus ascendunt vapores, & minus descendit congelatus humor, licet ante prave legeretur.

Aduerte secundo: catharri curantis incipientis præcepta. Primum, aliquando catharrus, & causa catharri conueniunt scilicet in frigido, qui casus non infert dubitationem curantis; aliquando verò variant, quo tempore obseruandum est præceptum traditum 7. meth. penultimo de compositis affectibus, scilicet ut incipiatur à causa, vel ab eo sine quo non; vel ab urgentiori, inter quæ tria urgentius habet maiorem vim.

In principio ergo catharri, quando catharrus, & ejus causa pugnant, maior intentio habenda est ad causam, non solum quia



quia causa est, sed etiam quia tunc nihil magis vrget, in processu autem maior intensio est ad catharrum. Si ergo causa catharri fuit externum frigus citra plenitudinem, linteus valde calidus repetitus sanat. Si verò causa fuit calor externus, imponatur frigidum aliquod, sed docente Mesue sit frigidum potentia non actu, vt rosaceum tepidum, timetur enim ex actuali frigore, ne humor qui incipit concrefcere in capite, magis coaguletur, & descendat.

Secundum præceptum: in initio adhibenda sunt sistencia excessum fluxus. In calido diapapauer, & violaceus; in frigido mirtinus cum melle rosato collato.

Tertium: cauendum est à validis reprimentibus ante integram vacationem, in omni enim fluxu talia inducunt noxas insanabiles propter vehementiam fluxus retenti.

Quartum: securissima sunt diuertentia fluxum, & magis summam diffusionem, modice vacuant lotiones, & frictiones extremorum, multo tamen validiores in frigida causa, propter timorem agitationis; & clisteres in calida refrigerantes, in frigida calefacientes.

Quintum: phlebotomia saepe causa est catharri, propter motum sanguinis effumantis 4. 1. 20. Quare cum timetur effumatio commodè præbentur potandæ statim à phlebotomia aquæ endiuivæ 3. vj. Conuenit tamen phlebotomia in catharro in casibus tribus explicatis à Mesue, Auicena ait minimè conuenire phlebotomiam catharrois, vbi non jungitur tussis: maxime conuenire, vbi jungitur punctio mamillarum. Minoratium autem perpetuo conuenit apparente quauis coctione,

Sextum: vbi impetus fluxionis est maximus, ex quo multi intra diem pereunt, provideatur respirationi difficili per frigidum aërem euentatum, omnino quiescat etiam à locutione, fumat papauerinum, cum aqua iujubarum, & diapapaueris, & si oportet pillulam opiatam. Ad dilationem autem pectoris, imponatur fœca cucurbita modo pectori, modo spatulis,

N iij

lis,



lis, & si oportet juxta dicta phlebotometur.

Aduerte tercio: precepta aucti catharri. Primum, si materia videtur non plurima, nec crassa, addantur diuersionibus dictis alia particulares à capite, per erthina quidem, cum fluit materia ad fauces; per gargarismata magis, vbi ad nares fluit.

Secundum: valent etiam tunc suffitus deobstruentes colatorium, in calido quidem ex decoctis violis, in frigido ex decocta majorana, &c.

Tertium: vt expurgetur valde tenuis humor, valet retentio in ore, & gargarizatio ex papauerino, cum rosaceo; in lento autem humore, cum oxymelte. Quod si iudicatur materia relicta in cerebro, vel multa, vel crassa, purgandus est pituitosus cum pillulis cochijs. Biliosus purgandus cum pillulis sine quibus, cessante jam agitatione catharri, sequantur euacuationes particulares à capite.

Quartum: si omnibus peractis, adhuc defluxio durat, procedendum est cum sistentibus catharrum, non ante.

#### *Remedia Catharri.*

**P**rimum: in calido syrupi violati ℥. iij. pulueris diagarganti frigidi ℥. j. paulatim lambatur. Aquæ autem in frigido sint decoctum vernicis thuris, nucum cypressi. In calido autem aquæ endiuia, & lac seminum frigidorum:

Secundum: minoratiuū fiat in calido, cum ℥. ij. pulpæ cass. in decocto fructuum. Vel cum manæ ℥. j. β. in jure pullj. In frigido autem fiat cum ℥. j. pillularum assagaret, vel mastichynarum.

Tertium: vbi humor concretus est in fronte, inducit dolorem, soluitur impositione sacculorum ex rosis, qui in calida mergantur, & vicissim expressi fronti imponantur sequenti tertio sicco. Valet autem ad coctionem catharri calidi, in introitu lecti potare drag. v. aquæ calentis, vel magis prysanæ cum ℥. j. panidiarum, in frigido autem sit lac surfuris.

Quartum:



Quartum : in quavis materia potissimum in falsa optime facit ad præcautionem, si ter in mense jejunos masticept, & deglutiat Rhab. drag. j.

Quintum: prohibet catharrum calidum frequens sumptio  $\mathfrak{z}$ . j. pulpæ cassiæ proxime ante cibū, & si quotidie dormitūrus paulatim deglutiat syrupi papaveris  $\mathfrak{z}$ . j. syrupi deglyssirrisa  $\mathfrak{z}$ . ss.

Sextum: præservat in frigido frequens sumptio bolli ex pulpa cassiæ  $\mathfrak{z}$ . j. pulueris hyeræ  $\mathfrak{z}$ . ij. & ter in hebdomada deuoret dormitūrus thuris gr. iij.

Septimum: pulueres inspergendi capiti dormituro, vernicis, majoranæ, rosarum, salis vsti añā, & magis perunctoincipite, cum paucissimo mastichino calido. Validiora sunt emplastra siccantia ex cap. de polypo, & vesicatoria, & fontanellæ brachiorum ex cap. de cephalalgia varia.

Octauum: sistētia catharrum calidum, gargarisentur rosacea  $\mathfrak{z}$ . iij. camphoræ  $\mathfrak{z}$ . j. Vel suffiantur ex vernice in aceto infusa, & exsiccata. Vel ex ea, & sacharo, & sandalis cum rosaceo fiant lupini suffiendi. Vel detineatur in ore syrupi mirtini  $\mathfrak{z}$ . iij. bolli armeni, pulueris papaveris añā  $\mathfrak{z}$ . j. Fortius est, pillula j. vel altera fumēda dormituro,  $\mathcal{V}$ . thuris, succi liquiritiæ añā  $\mathfrak{z}$ . j. mirrhæ, opij, croci, añā gr. j. cum rosacea fiant septem.

Nonū: sistētia catharrū frigidū, gargarisatio cū vino, decocti thuris, & vernicis suffitus paretur,  $\mathcal{V}$ . thus, styrax cum pice fiant formula, vel expulvere thuris, cum conserua rosarum lupini. Pomum odorandum,  $\mathcal{V}$ . laudani, ligni aloes, añā  $\mathfrak{z}$ . ij. ss. galliæ drag. ij. ambræ,  $\mathfrak{z}$ . ij. musci  $\mathfrak{z}$ . j. Vel exhibeatur dormituro pillula opiata dicta. Lauentur item brachia, & genua, cum calido decocto, & caput facaletur ex thure, pulegio, origano, baccis lauri calidis.

*De Electione aëris.*

**A**duerte quartò: inter sex res nō naturales de vi, & electio. ne aëris, ad morbos curandos propositiones. Prima, ex de sanitat. ii. aqua, & aër non sunt alia alijs commodiora, sed  
quæ



quæ purissima sunt, & externæ mixtionis aliena, omni & atati, & naturæ conueniunt apprime; præstat autem puritatem illis, lux, flatus, absentia externæ mixtionis. Quo fit vt juxta Oribasium lib. 4. collet. cap. 5. loca aprica præstent vmbrosis, & dies nocti, & aër villæ sit commodior, quam vrbs ad appetendum, coquendum, sentiendum. Aër enim vrbs licet sit calidior, propter quietem aëris calefacti à sole, est tamen multo crassior, & ideo deterior; causa crassitiei, quia non mouetur ventorum flatibus, cum ab omnibus impediatur, & quia bona parte sui vmbrosus est, & propter plurimas, & prauas vrbs exhalationes.

Secunda propositio: multo potentius operatur aër in morbis pectoris, vel cerebri, vel totius; quia ad ea loca immediate accedit, & multo magis operatur in longis morbis, quia operatio aëris licet potens est, tamen paulatim, & magis immutat diuturnitate, quam vehementia agendi, secus quam a medicamentis, quæ velociter imprimunt, morbi autem longi magis egent diuturna, & lenta operatione, quam valida, & simultanea.

Tertia propositio: remedium aëris prauis, ex Celso lib. 1. cap. 3. & migratio ad illum, non fiat nisi hyeme, tum quia vis in hyeme magis valet ad repugnandum aëri prauo insueti; tum quia grauis aër potissimum lædit æstate, & autumno, nam frigiditas hyemis prohibet noxam ejus. Ob contraria verò à prauo aëre ad bonum ineunte æstate migrandum est. Tacuinus autem in aëre epidemico docet perseverandū esse cum habitatione in subterraneis, quia remota sunt à commercio vagantis aëris, & potu poschæ, & odore rosaceæ, & suffitu thuris cum sandalis. Particulariùs autem traduntur remedia aëris prauis, ab Auic. lib. de remouendis nocumentis.

Quarta propositio: agnitio salubris, aut insalubris exhalationis terræ petitur ex indicijs quinque, apud Oribasium lib. 9. collet. cap. 16. & 15. Primum, gleba terræ vbi humore madet, vel expirat, si verò terra praua est madefacta, expirat carbones extinctos. Vrbs ipsa mane ante fumos, & nidorem efflat suauem auram. Secundum, si quis humi cubat, lenior exciatur,



citatur, & cibi appetentior erit, somnus suavis citra somnia perturbantia. Tertium, plantæ omnes suauiter viridescent calore suo saturata, placida, bene nutrita cito maturescentibus fructibus, & odoratis. Quartum, infantuli, & catuli, floridi sunt, viuidi, & bene colorati. Quintum, frumenta, legumina reposita diu durant. Quod si exhalatio terræ grauis est, eligatur sublime tabulatum, nam crassities aëris subsidet. In regione verò salubri locus terræ vicinus commodat.

## CAPVT XXII.

*De Ophthalmia.*

**A**duerte primo: de visu præcepta. Primum: aër tenebrosus pareatur pendente ante oculos pano serico nigro. Nam 1. de causis sympt. 6. spiritus visorius, vt pote modice tenuis ab vtraque immoderantia læditur, scilicet ab splendido rarefaciente, & à nigro incrassante. Succedit splendido album. Nigro verò, vel obscuro fuscum.

Quare maxime recreant sanos oculos medij colores, viridis, & caruleus, quasi dicat, caruleum, color sereni cali (azulado.) Vbi verò ophthalmicus oculus à calida fluxione immodice calefactus est, recreatur non medio, sed externo colore nigro, sicut vbi offenditur splendore, bene habet clausione, quod à natura edoctum est.

Cur ergo non itidem oculus offensus diuturnis tenebris iuuatur splendore, sed magis læditur, & exsiccatur 10. de vsu part. 4. Dic propter vehementiam agendi splendoris, nam 12. meth. 7. reductio ad moderatum, vt sit innoxia, oportet ne sit valde repentina.

Secundum: vestimenta ad collum angusta non sint, quia perpetuo ligatio propter dolorem, & expressionem concitat fluxionem, vltra partem ligatam, quò modo ligatura, supra cubitum mouet fluxum sanguinis ad cubitum, & cinctura  
O angusta



angusta in morbis hepatis obest.

Tertium: ex Auic. cap. 19. & 2. continent. pilorum pro-  
longatio valde obest propter impeditam expirationem juxta  
adagium (*Se queres que o teu filho creça, tosqualhe a cabeça*) attonsi  
verò pili conferunt trahendo excrementa adusta. Licet non  
credamus Auerr. 2. coll. 8. asserent pilos animatos esse, &  
attractice facultate suggere foligines ad alimentum. Verum  
cum pili retineant poros distentos, benefaciunt ad facilem  
expurgationem foliginum.

Quartum: oculus non modo non tangatur, imò nec ali-  
quid intueatur, nam simul cum spiritu humores ad oculum  
trahuntur, quare etiam sanum oculum claudat, quia ejus agi-  
tatio inquietat reliquum.

Quintum: somnus multis nominibus commendatur. Pri-  
mò, quia est otium facultatis visoriae, quare roborat, & non ex-  
haurit spiritum. Secundò, quia humor in somno quiescit. Ter-  
tiò, quia tunc humor introrsum, non extrorsum repit. Quar-  
tò, quia sic magis coquitur humor. Quintò, quia somnus  
narcoticus est. In declinatione vigilia ad resolutionem  
benefacit, si homo sit capite plurimum eleuato, & supra la-  
sum oculum 2. continet. supra sanum hic, supinus autem  
apud Haly.

Dic: cum queritur resolutio, semper acubitus confert su-  
pra partem agram, fluente autem humore supra oculum sa-  
num, & supra dorsum magis, eo quod citissime communicatur  
fluxio oculo sano.

Sextum: caria aut omittatur, aut paruissima sit. Nam apud  
Haly 1. pract. cap. 13. vnum malum est in cana magna, quia no-  
cet oculis propter continuitatem viree cum tenui membrana cere-  
bri. Acida autem reprobantur Auic. cum Mesue. Rasis laudat,  
intelligentur priores de valde acidis mordentibus membranas  
oculi. Posterior autem de remissa acidis conferentibus, ad re-  
primendum, & extinguendum. Dulcia verò reprobantur hic Ra-  
sis, quia in moderato calore augent sanguinem, in valido verò  
bilem,



bilem, qui duo humores abundant in opthalmicis.

Aduerte secundo: de vacuatione præcepta. Primum, quomodoque permisceatur sanguis, incipiendum est à phlebotomia, eo quod timetur inflammatio oculi, non solum propter nobilitatem suæ functionis, sed etiam quia propter nimium sensum, & exiguitatem membri timetur vlcus, aut ruptura, quæ etiam de causa large phlebotomandum est, & extrahendum 3. x. & conandum ut eadem fiat secundatio propter causam explicatâ 3. techn. Nam apud Auic. 3. 3. cap. 9. immissio sanguinis plurimi sanat in hora, & Galenus de phlebot. 17. ad horam diei 4. extrahit 12. iij. & rursus ad horam 9. 12. j. Quod si sanguis immodice tenuis est, præstat præsumere incrassans papauerinum, & iujubinum, ne ebulliat sanguis propter phlebotomiam; succedant autem phlebotomiæ caphalicæ, aliæ magis particulares à capite per sectam venam, tunc cucurbitæ, & hyrundines.

Secundum: sequatur ad phlebotomiam purgatio, sed leniens tantum, ut pote in inflammatione membri, & ea calida. Verum ex præcepto Galeni 4. acut. 76. purgatio exoluens adhibetur, vel sedata jam agitatione, & humore concessio, vel ubi res valde virget, statim in principio primis duobus diebus antequam humor in parte figatur, in quibus temporibus exhibendum est moderatum solutorium 2. acut. 11. & talis casus intelligendus est 13. therap. 15. ubi incipientem opthalmiam vnica die purgatione sanat.

Tertium: omne genus remediorum adhibendum est, tamquam in morbo difficili, potissimum autem ex continent. 2. in antiquis opthalmiis conferunt post vniuersales vacuationes particulares capitis per erthina, gargarismata, masticatoria, aurium perforationes, setones, hyrundines circa oculos, in temporibus, in naso, retro aurem, demum cauteria in conjunctione capitis, aut coronalis.

Quartum: ex 13. therap. vlt. inuestiganda est causa perpetui fluxus, & per contrarium emendanda est, itaque si causa

O ij

est



est frigiditas, & humiditas synapismo curetur; si calor frigidificis ex cap. de cephalalgia calida. Si verò quod frequens est, causa fuerit imbecillitas vasorum cerebri, parua quidem vasa fecerunt, magna verò ubi prius vtrinque ligata fuerint, ex toto praescindantur, vel quod magis placet Nicolò cauterisentur; estque remedium vehementissimum, cum fluxio sit per externa vasa; cum verò per interna, prodest, partim ob communicationem internorum vasorum, cum externis, partim ob defectum alimenti oculi, quare residuum poterit concoquere. Considerandum tamen est, ne ejus longo tempore apertio conservata, reddat oculum minorem, ob atrophiam: Auicena addit non esse exequendam hanc curationem, nisi cum reliqua non contulerint, & post sufficientem vacuationem, & cum dolor capitis sedatus est.

Aduerte tertio: de applicatione remediorum ocularium praecepta. Primum, valde pensanda sunt, tum propter operis nobilitatem, tum quia ob summam molliem facillime effunduntur vulgo (*olhos malos; &c.*)

Secundum: imponantur remedia actu frigida, sicut in auribus actu calida, nam propter pinguedinem multam, & conuersionem cum aëre externo, non offenduntur à frigido, & à calido mouetur fluxio in membro nobilissimo. Nam & in sanitate, oculi nunquam rigent i. problemat. 22. cum aures facile refrigerentur. Præterea spiritus visorius, ab oculo propter raritatem facile exhalat, quare frigida conferunt retinendo spiritum, & non indigent medicamenta actuali calore, ad penetrationem, cum oculi sint nudati cute.

Dubitat Matheus, quare fomenta oculis calida imponuntur, & lac ab vbere calens. Quare explicat sententiam Mesues de conseruanda sanitate tantum, ad quam Mesues addit: siue morbus sit calidus, siue frigidus, fomenta verò quæ extra imponuntur totis oculis, modice calida applicantur, quæ verò infunduntur etiam ad resolutionem, & in morbis frigidis, actu frigida præcipiuntur. Lac verò calens ab vbere infunditur, ne vi-

Ter.



Tertium: ex lib. de medicatrina 9. & 10. in affectibus oculorum, ager curandus est, non ad lucem, ne oculus offenda-  
tur, non a luce, ne fugiat nos effectus, sed ad lucem, id est oblique.

Quartum: timenda sunt quæ lentore participant, aut cras-  
sitie, nam talia, vel cum dolore extrahuntur, vel remanentia  
putrent; oculus enim propter immodicum sensum, & rarita-  
tem 4. local. 2. facillime patitur. Quare omnia mordacia fugien-  
da sunt, scilicet quidquid valde adstringit, vel abstergit, vel  
acre est, vel acidum, vel falsum lib. cit. 1. & 4. oportetque fe-  
re contentum esse insipidis à terrea substantia, siccantibus, re-  
ductis ad exactissimum liuorem.

Quintum: lippa ex Raf. 9. continent. abstergatur, nam  
tollitur grauians, & fit perspiratio, & paratur locus actioni me-  
dicamenti, cum cuspidē radij inuoluto cotto, & madefacti in  
rosacea in principio, in augmento autem in aqua sacchari, sed  
in declinatione cum cotto sicco; lippa autem infestans citra  
ophthalmiam breuiter cessat, si dormiturus lauerit faciem, &  
oculos cum poscha.

Sextum: dolentium oculorum remedia vniuersalia pro-  
ponuntur 6. aphor. 31. Vini potio, balnetum, vacuatio, scilicet  
in repletionē totius, vel capitis; balneum in acriē humo-  
rum citra repletionem corporis, & hoc vel vniuersale, vel par-  
ticulare, quod fomentum vocatur; vinum in crassitie sangui-  
nis in oculis obstructis, sit autem vinum meracius, cum pau-  
cissima aqua, apud Aët. post horas tres à cana leni dormituro  
exhibitum, apud Auicenam, & Galenum 6. epid. sect. 6. tex. 5.  
tale enim in totum aufert dolorem, & hemicranium, & quē-  
uis alium à frigore ortum, vel ab obstructione, non præsente  
plenitudine.

Septimum: in ophthalmia principio conueniunt lenien-  
tia asperitates, abstergentia acrem fluxionem, temperantia flu-  
xi humoris acrimoniam, oui liquor, lac, mucilagines, oui li-  
quor valde merito receptissimus propter causas 17. therap. 27.

O iij

qui



qui si conferatur ad metallica ellota, tutiā, & carusam, minus illis emplasticus est, plus tamen illis lenit, & diluit acrimoniam 4. local. 1. sect. 2. Quod ergo sect. 7. in fine legitur oui liquorem in totum carere vi absterforia, intelligitur ex facultate propria abstergente, lauat tamen magis, quam metallica illa ex modo substantiæ humida, lac verò instilletur ab vbere repidum, iuuençulæ, boni succi, lactantis fœminam quam gestauerit, à tertio mense partus vsque ad annum, innoueturque quauis hora, ob facilem corruptionem, tale enim magis concoctum frigidius est, apud Auic. cap. proprio, & Galenum 4. local. 2. Si verò hæc duo remedia inter se conferantur dixit Galenus citat. lac magis mitigare dolorem, ob maiorem lenitatem butyri, & quia magis ex sero abluit, minus tamen infrigidat. Quare in magno dolore præstantius est ouo; mucilagines autem simul dolores leniunt, & maturant hoc ordine, apud Auicenam 9. Primus locus in humore valde mordaci est mucilaginis psyllij; proximus mucilaginis seminis citoneorum, tertius, seminis fœnu graci, non modo lauantis, & maturantis, sed & resoluentis; valida autem adstringentia, vel emplastica in initio non conueniunt, nec in oculis, nec in fronte. Causa prima vniuersalis est, quia corpus plenum non recipit 3. tegni, alia causa particularis est, quia timetur, ne re-  
tenti acres humores inducant distentionem, dolorem, & vlcus. Adde quod corpore pleno adstringentia oculis instillata exprimunt humorem ad opticos, cum periculo cecitatis, frontalia verò adstringentia exprimunt ad oculos.

Octauum: in augmento, apparente, jam lippa aliqua, addendum est dictis decoctum camomillæ, melliloti, aut fœnu graci, aut puluis tenuissimus candi, & collyria dicta monachera, quia intra vnam diem sanant, & frontalia adstringentia.

Nonum: in statu, conueniunt fomenta, ex decocto rosarum, melliloti, fœnu graci, si aut dolor modicus est bis aut ter in die, sin aliter quater 4. de locis 2. Nam in reperitis fomentis, & similiter in balneis periculum est de plenitudine partis,



partis, convenit tunc permixtio medicaminis ex pari adstrictione, & resolutione: sicut in declinatione oportet dominari resolutionem.

Decimum: si in statu, ophtalmiae dolor rursus exacerbatur citra causam manifestam, suspicio est de erosione corneae, quare illi prospiciendum est peculiaribus remedijs.

*Remedia Ophtalmiae.*

**P**rimum: in ophtalmia calida, in prima die mittantur in oculum sexta quaque hora guttae tres albuginis contusae cum rosacea, & clauso oculo imponatur cottus in eadem imbutus, & linteus similiter imbutus, & expressus complectens totum oculum, & partes vicinas, alligeturque capiti, non laxo, sed citra dolorem. Si vero jungitur immodicus calor, in 3. ij. rosaceae adde camphorae gr. ij. si dolor magis urget extrahatur in rosacea calida mucilago psyllij, si vero major est acrimonia, extrahatur mucilago seminis papaveris albi, & cottus imponendus infundatur lacti, cum parvo rosaceo, vel medulla pomi asii, vel violae coctae, cum rosacea trita, vel caseus recens, non salitus cum folijs apij. Vel luteus assus tritus, cum croco, & rosacea. Validius: folia hyoscyami assa cum luteo. Vel decoctum papaveris, cum liquore oni.

Secundum: in calida ophtalmia, die secunda coquantur in aqua plantaginis, rosa, myrthus, camomilla, foenu graecum, & linteae saepe duplicati, macerati in dicto liquore imponentur oculis, & innoquentur antequam arescant. Vel aqua albuminis contracta cum lacte muliebri. Vel si dolor urget collyrij albi, cum opio 3. j. in albuminis liquati 3. ij. Item frontale occupans tempus dolens, rosaceae 3. iij. aceti 3. j. albumina ij. bolli armeni 3. j. permisceantur. In minori autem calore, rosarum, sanguinis draconis, bolli armeni ana 3. j. cum albumine imposito, toto triduo non auferatur; & instantibus vigilijs adde frontali opij gran. v. Aliud frontale Galeni: cocleae integra,



gra, cum albumine trita, vel thuris, vel foliginis gr. ij. cum albumine.

Tertium: in calida ophtalmia die tertia, collyrij albi, sine opio 3. j. rosacea 3. ij. extra autē tollit dolorē linteolus butyro madefactus oculis impositus 4. loc. 8. sect. 2. post quartū adde sarcocollā trita in lacte mulieris 3. j. croci, spica aloes lota aña gr. vj. cum aqua fœniculi, potestque addi aliquid rosaceæ, exterius autem cottus in decocto rosarum, meliloti, fœnu græci, cum aqua, & vino.

Quartum validum reprimens Traliani: in calida difficili tutiæ lota, post adusta, & extincta in lacte 3. ij. cerusæ lota 3. j. & scorix ferri 3. j. dragacanthi, gummi arabici aña 3. j. opij 3. j. cum aqua pluviali.

Quintum: in initio frigida imponantur remedia calida augescentis. Vel collyrij albi 3. j. spica croci aña gr. v. cum aqua rosarum, & mirthi, supraponatur autem cottus in decocto rosarum, & mirthi: in processu infundantur sarcocollæ 3. j. rosarum, croci, amyli, tragacanthi aña 3. j. & in decocto cotti addantur spicæ, & fœnu græcum modicum.

Sextum: decoctum finiens dolores, in declinatione applicitum in spongia. Bulliant in aqua fœniculi, meliloti, fœnu græci aña manipulum j. rosarum m. 8.

Septimum: si orta est ex percussione, absintium calefactum sape applicetur, vel ceratum calens, ex cera, rosaceo, pulvere cymini. Si verò ex frigore orta est, suffiantur oculi decocto lauri, & cum eodem lauentur.

*De anno inconstanti.*

**P**Rimò definitur annus constans in lib. de aëre, & aqua, & r. epid. 1. initio. Incipiēte autūno pluit, & venti frigidi cōspirant. Sequitur hyems, nec valde procellosa, nec serena. In vere aliquantæ pluuiæ descendūt, & moderātia aëris adest. In aestate calor, & siccitas abunde increscunt, sed ante ortum canis, austri, qui prodiomi, aliter prodioni, id est percussores appellātur



tur pauci flant. Post ortum canis fere perpetui aquilones, quos vocant etheftas, id est annales, vel anniuersarios, quia fere cum legem obseruant 3. epid. sect. 3. tex. 6. & pluuia respondet proportionem ethelisy. Causam autem eorum docuit Aristoteles 2. meteor. 5. eo quod sol transacto solistitio aestiuo (10. Iunii) liquat glacies aquilones, & excitat anniuersarios, sicut sol pomeridianus magis calefacit, quam ad meridiem, & quia nocte cessant illi venti, ideo feruidiores sunt noctes, quam dies aestatis. In tali autem anno, sicut fructus terrae tempestiui redduntur, ita morbi pauci fiunt, & hi constantes respondentes naturae temporis, & boni iudicii, id est non interimentes, non recediuantes, nec cum prauis symptomatis criticantes 3. aphor. 8. De ventis autem dictis Plinius lib. 2. cap. 27. verum licet in multis conueniat annus ferax, & salubris, vel constans, non tamen in omnibus, nam loca palustria feracia sunt, eadem tamen valde insalubria. Vulgo definitur annus ferax: *Ianeiro geoso, Feuereiro ncuoso, Março escadoroso, Mayo ventoso, faz o anno fermofo.*

Secundum: num praestet annum offerre mutationes dictas, an praestet offerre aequalitates temperamenti per totum. Dic: ex Galeno 3. de temp. 4. melius foret annum totum esse temperatum, saltem sit bona sui parte temperatus. Verum plane ita foret, si reliqua in orbe inferiori temperata forent, quia verò sunt, vel contraria, vel ex contrariis constantia, praestat ad conseruationem contrarietas illa aequata, & sibi ex proportionem respondens in aëre sicut, & reliquis. Quare hoc solum colligit Galenus praestare annum, vel totum, vel magna ex parte esse temperatum, quam valde intemperatum.

Probatio assumpti: nam hyeme roborantur, & crescunt radices stirpium, & viscera animalium, quae proportionem radicibus respondent, in aestate verò fructus, & artus quorum neutrum aque fieret, ab immoderato calore; sic vicissitudo diei, & noctis, somni, & vigiliarum, accessus, & recessus solis commodissimi sunt, requirunt tamen ea contraria, ad sanita-

P

tem



tem duo. Alterum, vt respondeant sibi proportionē, sicut elementa in mundo. Alterum, vt mutationes non ex longissimis intervallis succedant, ideo præstat, nec dies, nec noctes esse longissimas, vt sub æquinoctiali, vbi noctes pares sunt.

Octauo: mutationes reddunt locum fertiliorem ex lib. de aëre, aqua ad mediū, in Asia minori propter paucam inæqualitatem temporis, stirpes, pecora, & homines pulcherrima, & facundissima sunt, vnum enim intemperamentum diu durans valde intemperat, nec tamen oportet mutationes illas simul jungi, vel ex paucissimis intervallis succedere, nam ex lib. de humoribus, aër cum valde sensim mutatur, sicut & ætates, & naturæ, annus est salubris, si verò repente morbosus.

Dic 2. aphor 52. & 6. epid. 27. & 3. aphor. 1. ideo insaluberrimum tēpus est, & pestis nuntium, quando sol cum nubibus permiscetur, quod in insula S. Thomæ apparet, & aperiēti se soli caput committendum non est, apud Celsum lib. 1. cap. 2. & flumen inter solis cursum, & urbem præterlabens, locum reddit insalubrem, quia licet præstet excessum vnum anni cito corrigi sequente contrario temperamento, ita tamen sequi oportet, vt in corpore, & capite non asseruet recrementa, vel jam asseruata liquet, quia ratione autumnus, ob breuissimas mutationes partium diei redditur noxius.

Tertius: maxima aëris mutatio ex solis accessu, & recessu petitur, vnde quatuor tempora gignuntur, æstas quidem calida, & sicca, non solum collatione aliorum temporum, sed simpliciter, id est collatione temperamēti hominis, sicut hyems frigida humida, ver in vtrisque temperatum, in passiuis verò ad sicum inclinans. Quo fit vt inter ea tempora ver sanissimum sit, ob tēperiem humoris, quæ gignit, & quia extra trahit quæcunque vitia quæ in profundo corporis latent, & quia excipit corpus bene habitū, & robustū ex hyeme, Autūnus verò omnium pessimus. Prima causa, quia asseruat pessimum humorem atrabiliosum, vltos humores, & sæpe etiam ob esus fructuum, & oleorum etiam prauos, sæpe etiam excipit vires per æstatem debi-



debilitas. Quarta, inæqualitas magna partium diei, si conferatur meridies, ad duo crepuscula.

Diuisio autem horum quatuor anni temporum 2. 1. doctrina 2. cap. 3. apud astronomos solum ex motu solis petitur. Quare numerant ea æqualia, tribuentes cuique tempori tria signa, quia non considerant mutationem, quæ in corpore humano à tempore fit, sed solam varietatem quatuor punctorum Zodiaci. Medici autem cum videant temperaturas dierum variari, non solum sumum situm solis, sed etiam summum exortum, & casum magnorum syderum, & quia considerant impressionem aëris in corpus humanum; tempora autem anni in quibus experimur aërem temperatum breuiora sunt, quàm in quibus intemperatum, constituunt quatuor anni tempora valde inæqualia, & determinant quoduis illorum, per diem exortus, vel occasus alicuius magni syderis. Videlicet, opinabatur Hippocrates, & Galenus 1. epid. com. 1. & lib. de septimanis, & 3. aphor. 14. Oribasius cap. 8. lib. 9. octauam sphaeram esse immobilem, quare cum suo tempore oriretur arcturus 12. dies ante æquinoctium autumnale, opinabatur perpetuo sic oriturum. Ptolomæus verò cum posterioribus astronomicis reperierunt in octaua sphaera motum trepidationis, quo fit ut descriptiones temporum, ab antiquissimis Medicis traditæ, nostro tempore non paruum varietatē recipiant. Scilicet initium veris describitur illis æquinoctium vernale, finis autem ortus virgiliarum incidit æquinoctium vernale in 11. Martij nobis; ortus autem virgiliarum in 24. Aprilis, cum Galeni tempore virgiliae orirentur in 1. Maij. Quare ver nostrum continebit dies 45. æstatis verò initium est Aprilis dies 25. finis autem ortus arcturi qui oritur in die Septembris 17. suo autem tempore in 1. Septembris, quia continet nostra æstas menses quatuor, dies 23. Autumni verò initium est Septembri die 18. finis autem occasus virgiliarum, incidit is occasus nobis ad diem Nouembris 7. suo autem tempore ad initium Nouembris. Quare continet autumnus noster dies 56. initium hyem̃is est dies Nouembris

P ij

bris



bri 8. finis æquinoctium vernale. Quare continet hyemis nostra menses 4. dies 4. Arabes verò temporum diuisiones citra has difficultates constituunt ex sensus experientia.

## CAPVT XXIII.

*De Vlceribus oculorum.*

Incipit, Cum in oculis, &c.

**D**E duobus affectibus oculorum simul tradit, eo quod vnus sequitur ad alterum. Primum, vocant phlctenam, nostri verò pustulam, Anicena vesicam. Alter est vlcus corneæ, quod ad pustulam sequi solet.

Aduerte primò: curandarum pustularum præcepta. Primum, distant hæ affectiones, ab ophtalmia dupliciter, primò, quia cum hic afficiatur cornea, quæ à dura membrana, sub caluaria oritur, in ophtalmia verò afficiatur conjunctiua orta à pericraneo, frontalia, & vasorum sectiones crebriorem locum habent in ophtalmia, quam in pustulis; alterum discrimen, quod in ophtalmia, ob mollitiem conjunctiue fere speratur resolutio, hic ob duritiem corneæ saepe maturatio.

Secundum: non est properandum ad collyrium de thure Rasis suppurans, sed aliquando properandum in cieph albo, cum mucilagine feminis citoneorum, & fœnugræci, & cottus in eadem mucilagine, cum rosacea alligetur oculo, vt compressione sua prohibeat exitum oculi, & si pulsatio procedit perseverans, fiat permutatio ad collyrium de thure reminiscentes, ex Rasio hic, quod si forte pustula est magna è directo pupillæ, fugiantur suppurantia, & substituatur reprimens vocatum à Rasio elcisir, satius enim est, quod reprimatur, resoluaturque si fieri potest, vel saltem, quod suppuratio introrsum mandetur, quam quod oculus procidat.

Tertium: si pustula aquosa est post purgationem cum turbit,



bith, in aqua fœniculi infundatur tutia, antimonium, scoria  
aris, tragacanthum, si adhuc durat perforetur cum acu.

Quartum: si pustula rubra est, primum, lac instilletur, post  
sanguis columbae, aut turturis calens, extra verò pomum as-  
sum cum rosacea.

Quintum: si pustula cancrofa est infundatur collyrium  
album opiatum cum lacte, extra verò luteus cum rosacea, si  
verò malum serpit intro, etiam vsque ad cerebrum, euellatur  
oculus, & canterizetur locus post exitum multi sanguinis.

Sextum: in vlcere praestantissimum est collyrium de plum-  
bo. Rasis cum lacte, vel cum syrupo rosato, & tandem eleisir  
ad cicatricem inducendam, reliqua curatio, & victus ex oph-  
thalmia petenda sunt.

*De anno inconstanti propositiones.*

**P**rima: vbi pars anni deuiat à suo temperamento ad quātis  
qualitatē, incipit humorum proportio corrumpi, quod si  
sequens tempus, & magis etiam tertium defleat à suis tem-  
peramentis, multi morbi generantur. Post discursum verò du-  
orum temporum exemplum est in omnibus statibus lib. epid.  
Galenus lib. epid. 2. 3. aphor. 1. docet cum huiusmodi mu-  
tationes occupant multa tempora, morbos gigni epidemicos,  
vbi huiusmodi lapsus reperiuntur in vno tantum tempore, non  
gignuntur, nisi lapsus valde magnus sit; nam lib. epid. sect. 2.  
text. 5. si vnum tantum tempus defleat à suo temperamento,  
multis est remedium, scilicet contrarie temperatis. Nam bi-  
liosa natura per aetatem acervat bilem immoderatiorem,  
quod si sequatur autumnus frigidus humidus, temperatur, si  
calidus siccus, protinus aegrotat. Quare lapsus vnius tantum  
temporis, quandoque sufficit gignendo morbo epidemico.  
Lapsus autē portionalis vnius temporis minimus nō potest. Qui-  
dam verò, inter quos videtur Aristot. 10 prob. 2. interpretatur  
Hippocratem de mutationibus, id est de successionebus  
temporum, in quibus ob mutationes, etiam si paulatim

P iiij

magis



magis morbi gignuntur, quam in medio, vel fine temporum. Quare lib. de aëre, & aqua præcipitur, vt caueamus hujusmodi mutationes temporum, solstitium scilicet, & æquinoctium, & 6. epid. sect. 3. 27. vt in quavis mutatione temporum nos domi contineamus, ideo aër vespertinus ad noctem incommodat; sed cur sic non vitatur aurora. Dic: in die autē terra nubila vitatur commode, quia respondet is aër crassitie, & pernixione vespertino, in reliquis æstatibus non incommodat, quia est mutatio paulatina ad aërem purum, lucidum, solari vi robotantem innatum calorem, & præstat, vt calor diurnus paulatim accedat, vnde terræ suscipientes solem exorientem, fecundiores sunt, quam quæ suscipiunt illum meridianum, à quo exuruntur repente. Hanc sententiam etiam Galenus recipit tanquam veram, licet non putet esse germanam mentem aphorismi, sed prius relitam, nam mutationes, id est successiones temporum, non maximè gignunt morbos, sicut enim quosdam gignunt, ita & etiam nonnullos solvunt 3. decret. 7. posset tamen infirmari hæc ratio Galeni, si verbum maximè, referatur ad medium, & finem cuiusvis quadræ.

Secunda sententia juxta 3. aphor. 15. ex anni constitutionibus inconstantibus, siccitates imbribus præferuntur, salubrioresque sunt, quia pluviosus annus asseruat plurimū recrementum in corpore, & ea parat putredini. Sed cur non distinguit Hippocrates per actiua qualitates, quæ magis immutant. Dic: simpliciter magis mutant actiua, ideo climata penes illa distinguuntur varia; sed in vno loco major differentia anni eueniens per pluuium, & serenum, quam per varietatem actiuarum. Sed quomodo est salubrior sicca constitutio. Dic: quia in ea pauciores agrotant, num autem sumpto numero pari morborum, sint periculosiores morbi humide constitutionis. Dic in ea adest copia excrementorum, & major putredo, in sicca verò calor acrior est, quare in sicca constitutione morbi erunt breviores, juxta 3. aphor. 7. periculum autem, vel erit par, vel ali-  
quant



quanto majus in sicco tempore, nisi jungatur calor multus humiditati. Redditur enim tunc constitutio pestilens. Illud autem addendum est, ex Celso lib. 2. cap. 1. tres esse constitutiones aëris, in passius, scilicet pluuiosam, serenam, & nubilam, vel caliginosam, quam explicat 1. epid. 8. esse constitutionem, per quam spiritus noster redditur similis externo aëri caliginoso, suntque saluberrimi dies sereni, meliores pluuij, quam nebulosi. Causa duplex videtur: altera, quia pluuij dies jungunt sibi motum aëris à quo corpus distatur, & expurgatur. Caliginosi verò propter summam quietem aëris intro coercet excrementa. Altera, quia summa malitia aëris est crassities 1. de sanit. 16. nubilus autem aër crassissimus est, ut pote permixtus aqua, leuitate sua supralatæ. Humiditas ergo aëris noxia est, sed eo magis quo jungit sibi calorem, ita enim citissime sequitur putrefactio. Vnde sol Martij, vulgo non creditur tutus, sicuti etiam noctes plenilunij, quia talis calor soluit, & non resoluit, ideo etiam per aëstem irroratio pavimenti turba non est, sicut enim calx aqua perfusa magis calefacit 1. Feb. penult. nisi exiguus sit calor qui latet, quo modo in partibus diei moderatis conuenit rigatio hortorum, & terræ, aut si accedatur ad locum paulo post irrigationem.

C A P V T XXIV.

*De Albugine oculo. u. n.*

**A**duerte primò: de essentia morbi, ubi in oculo apparet albedo præter naturam. Auicenna ita distinguit, ut tenuis vocetur nebula, crassa albugo, apud Paulum verò vniuersaliter cicatrix; quæ verò profundior est leucoma. Numerat autem hujus albedinis differētijs tres, vnā ex defectu nutritoriæ assimilantis, respondens vitiligni in cute, id est (*Aluarares*) hæc fere à generatione contrahitur, licet etiam quandoque à morbo, & non admitit curationem. Secunda, frequens

cx



ex humore asseruato in superficie oculi, hæc fere curatur, facilius tamen in pueris.

Tertia: ex vestigio vlcis, nam cum cornea sit spermaticum membrum, cum perditum est, non regeneratur, sed substituitur instar calli, non albescentis, hæc sicut abscissio reliquorum radicalium, in pueris crebro sanatur, nunquam in adultis.

Aduerte secundo: de curatione præcepta. Primum, incipiendum est à leuioribus, & si remedium validum est, imponendus est cottus in cuspide radij, qui tinctus in liquore hæreat paucis pulueri, & applicetur soli albugini, & si succedit dolor, aut rubor, intermittatur curatio, & si oportet infundatur lac. Secundum, ante quamuis applicationem benefacit emoluitio, cum suffitu decocti foenu graci, usquequo facies rubeat.

*Remedia Albuginis oculorum.*

**P**rimum: liquor stillatitius mellis, cum cando puluerato. Secundum validius, os sepia, sarcocola, spuma maris, id est Algonum. Aliud, vitrum plenum floribus roris marini, per dies 40. intra stercus, vel per æstatem, sub terra contentum, effundit aquam potentem. Aliud, stercus hyrundinum valde pulueratum cum melle. Tertium, validissimum est collyrium Rasis hic.

*De mutatione aëris, ex reliquis syderibus præter solem.*

**P**ropositio prima, num puncta quatuor zodiaci, solistitia scilicet, & æquinoctia etiam propria immutent aërem, ultra quam quod sint signa propinquitatis solis ad nos. Præterea ortus, & occasus magnorum syderum, item varietates lunæ penes conjunctionem, & oppositionem, & eclipsim, similiter, & accessus solis, ad varia signa Zodiaci. Distingunt enim corpus humanum in partes xij. & arieti, tribuunt caput; tauro humeros, &c. quasi peragente sole dicta signa otandum sit, ab illis membris, neq; tangenda. Dic: magna lis est inter medicos



dicos nostri aui, multis enim videtur talia considerari à medicis solum, prout sunt notæ propinquitatis solis ad nos. Sed contra lib. de aëre, & aqua, postquam dixit oportere considerari solistitia, & æquinoctia per quæ constat propinquitas solis, addit nec non syderum ortus, & occasus, quæ tamen non momentaneè distant ab illis quatuor punctis. Item cum medici quatuor tempora inæqualia constituent solum obortus, & occasus syderum. Item 1. epid. in procem. & apud Aët. lib. 3. 174. & Haly lib. 5. c. 7. & apud Plin. lib. 18. c. 28. & lib. 2. cap. 40. & apud Arist. 26. prob. 22. & 1. prob. 3. astrorum ortus repente mouent pluuias, serenitatem, ventos, calorem, frigus, ita vt etiam maria, vina, lintea sentiant exorientem canem. Columella ait natos in canicularibus esse incontinentissimos, & facinorosos. Alexander 6. epid. 6. 24. nisi ita sentiamus, inquit erimus peiores piscatoribus, qui ex syderibus agnoscunt incrementum lacustarum in mari. Nec obstat responsio Musæ 4. aphor. 5. quod oporteret oriente cane etiam in polo antarctico calorem augeri, cum eo tempore hyems ibi vigeat, quia sol ex costu canis magis calefacit nos vicinos, illos absentes minus infri-  
gidabit, quia semotos à cane.

Secunda: Lunæ opera in aëre multiplicia apparent. Nam siues per conjunctionem lunæ, vsque ad dies septimum, non interimuntur eo quod caro illorum tunc præhumida est, & intestina rumpuntur, luna enim post solē maxime mouet inferiora, vnde sol paruus vocatur 4. de generatione animalium ultimo, maximè autem dominatur humidis, vnde hominem animalium humidissimum quantitatiue plurimum mutabit, maxime quando agrotat cum humores abundant, nec à natura sufficienter regulantur, in motu verò diurno mouet mare fluxu, & refluxu, & motu illuminationis, aliquando augens aquas, aliquando minuens, vnde non visum est mori hominem, nisi æstu recedente Plin. lib. 2. c. 98. Thadeus, & Vgo 2. aphor. 27. viderunt agros in certa quadra lunæ optime habere, in alia deterrime, idque in toto morbo. Item plena lumine mouet men-  
ses,

Q



ses, & epilepsiam, carnes sub pleni lunio putrent, pessime tunc habent gruidæ, & natu editi. de hist. animalium 20. Conchilia omnino tunc valde austa sunt, & cerebra hominum vulneratorum tunc erumpuntur, ligna tunc casa male sonora sunt, & citissime putrent, oleum in vasis crescit, ita ut quandoque effundatur, & medullæ in ossibus magnæ reperiuntur, fructus omnes reponendi, tunc collecti, citissime putrent, & radix præniæ, tunc collecta, minus siccatur, oculi felium crescant, dormiens sub plenilunio habet faciem liuentem, & dolet caput, & sæpe in hæmoptoisim incidit, & immodicam veneris appetentiam, fructus eo tempore celerrime maturantur, & feratum occisa corpora confestim putrent, animalia tunc occisa non durant imputrefacta, & similia ex corijs eorum cito rumpuntur, fructus omnes cucumerum generis tunc plurimum augentur, punica scinduntur, aquæ puteales incrementum accipiunt, retia, & panni loti corroduuntur; in peste frequentissima mors adest in plenilunijs, & interlunijs; tunc parientes fere fluxu sanguinis periclitantur, si conceptio sit in illis punctis, vel juxta oritur fetus 7. mense, non aliter: Plinius lib. 7. cap. 5. solum sæpe (ait Placentinus 7. medicinæ) germinat inter radices decrefcente luna, arefcit cum augetur, ideo plenilunij noctes magis roridae sunt, ideo venantes canes minus assequuntur vestigia, quia impeditur delatio odoris; apoplexia tunc inuadens perimit apud Tralianum. Jam quod ventos, pluuias, & serenitates, motu illuminationis per quadras frequenter immutat luna, receptum est.

De motu autem proprio lunæ, quod per quadras mutet inferna ostenditur 5. hist. anim. 20. insecta, & multa animalia certis septenis oua pariunt, certis incubant, & excludunt, certis integra figuratio præstatur, & lib. 6. 17. aquatilia ait gestare vtero varie, sed omnia spatio septenario distingui. Septimus dies nato magnam affert mutationem 7. hist. vltim. & lib. de carnibus in fin. Septimo die inædia perit homo, per septimanas annorum dentes prodeunt.

Quod



Quod autem vis septenorū, tam in diētis, quam in cri-  
sibus morborum, ad proprium lunæ motum referenda sit, ap-  
paret, quia sola luna peragrat in toto tempore quartam circu-  
li, & quia ea mutatio maxime apparet in moribus humorum,  
quibus luna imperat. Quare potissimum conspicitur impres-  
sio lunæ in capitis vulneribus, & in morbis materialibus, & in  
affectibus reumaticis, & maxime in pueris, & senibus, quorum  
priores naturali, posteriores excrementitia humiditate abun-  
dant.

Tertia causa horum affectuum lunæ, & syderum quan-  
doque refertur, apud Arist. & Aphrodif. 2. de generatione ani-  
malium cap. 4. ad temperaturam lucis suæ, quia comparatio ca-  
loris lunæ ad solem est comparatio faminæ ad mare, quare  
trahit, implet statu, non dissipat, sicut sol Martij, ideo in pleni-  
lunio etiam æstiuo magis crescunt fructus, & humida, quam  
in alio tempore etiam pluuioso, eo quod calor solaris sufficit  
dissipare, pluuiæ citra calorem congelat, non fundit. Calor ve-  
rò plenilunij iunctus humiditati lunæ maxime replet humidi-  
tate. Iungitur & illa causa, quod apud Ptholomeum est pro-  
prium lunæ, trahere humiditates à terræ visceribus ad superfi-  
ciem. Quare in venis, & membro vlcerato, peragran-  
te luna signum ejus membri, fit maxima repletio. Quidam tamen  
eorum affectuum, non referendi sunt ad lunam, nec ad calo-  
rem sensatum communicatum aëri, sed ad proprietatem calo-  
ris celestis fauentis calori nostro 3. de generatione animalium  
2. vel etiam insensu, scilicet quod stirpes vigente frigore sensa-  
to in aëre incipiente Ianuario germinant, scilicet quia roborat-  
ur calor suus innatus, non à calore sensato, sed à proprietate  
caloris solaris accedentis ad nos, sic etiam fructus eadem pro-  
prietate caloris solaris maturantur; sic agri vigente adhuc fri-  
gore transacta media nocte quiescunt, & melius habent pro-  
pter accessum solis ad nos. Sic sydera quorum lumen, non ex-  
perimur in aëre afficiunt nos, vel benigne, vel maligne, ob pro-  
prietatem caloris sui.

Qij

Ex



Ex quibus colligitur non esse negandā mutationē aëris, & aquæ, & corporū quæ ibidē cōtinentur à corporibus superiori-  
bus, & habendam esse medico rationem eorum, primò quidem  
& maxime solis immutantis aërem, tam motu proprio, quam  
diurno. Deinde conjunctionis, & oppositionis lunæ. Dein-  
de quattarum lunæ, & punctorum quatuor Zodiaci, & ortus, &  
occasus magnorum syderum, ut scilicet in illis nullum medi-  
camentum lubentes demus lib. de aëre, & aqua primo, si pos-  
sunt sine vlllo periculo, magna remedia in aliam diem transfe-  
rantur. Nec probat quod Manard. & Valeriol. lib. 6. disp. 2.  
afferunt de vacationibus celebratis dictis diebus, quæ libe-  
rarunt agros, quia coeuntibus contrarijs indicationibus  
semper sequenda est validior. Nec probat etiam quod dixit  
Zoar. lib. 2. cap. 2. standum esse in omnibus solum ei, quod  
sentitur de calore in aëre, quod ostendit ex arboribus, modo  
serius, modo citius germinantibus, pro vario aëris calore, non  
pro certo accessu solis, vel syderum ad nos, quia ostenditur  
calorem aëris manifestum mutare contenta, non tamen ostē-  
ditur, quod accessus solis, vel syderum non plurimum mutat.

Ostenditur propositio quarta, ex Oribasio lib. 9. cap. 3. &  
4. luna per quadras sui motus illuminationis etiam aërem  
mutat in prima quarta, mouens extrorsum humores verisimi-  
les. Secunda, æstati. Tertia, autumnno. Quarta, hyemi. Item  
sol diurno motu, per quadras refert quatuor anni tempora,  
prima enim quarta complectens horas noctis postremas, spi-  
ritum, & sanguinem mouent extra, ideo sanis iuxta, ac lan-  
guētibus suavis est, & veri similis. Sex horæ sequentes circun-  
stantes meridiem æstatem referunt. Sex vespertina autumnū  
postrema circumbstantes mediam noctem hyemem. Quare li-  
cet vesperi abstinemus à somno, & medicinis, ita ad noctem  
defluxiones augentur, & pessime habent agri, redeuntibus ad  
viscera humoribus, videturque hæc diuisio partium diei, ex par-  
te conformior, quam diuisio Aërii lib. 3. cap. 162. diem artifi-  
cialem secantis in quatuor partes, & noctem in totidem.

CAPVT



## CAPVT XXV.

## De Scabie, &amp; Sabel.

**A**duerte primò: Scabies oculorum est pruritus, rubor, & asperitas palpebrarum internarum: distincta in speciem primam, vocatam Celso asperitudinem, cum sola adest asperitas cum rubore, hæc medicinis cedit; species altera rarissime citra chyrurgiam sanatur, cum intra palpebra apparent mollia grana, vocata Auic. granula; Celso ficiosa palpebra. Tertia, species nunquam citra manum curatur, cum visuntur grana rubra subdura, & in fuscum inclinantia. Celso vocatur callosa palpebra. Sabel verò jungitur à Rasio, propter communitatem curationis. Affectio oculi contagiosa instar panniculi oculum obtegens, apud Græcos venit ea affectio nomine vngula alba.

Aduerte secundò: de curatione remedia vniuersalia fiant tempore interualli, vel cum sanus est ait Ras. fere enim huiusmodi affectiones periodicae sunt, in periodicis autem morbis tempore interualli operandum est, & quia tunc affectio extirpanda minor est, & quia tunc natura curaturo minus succumbit.

Secundum præceptū: ante vsum medicamenti abstergentis, & erodentis, semper præcedat emolliens balneum, vel suffitus, incipiatque à leuiori, & perpetuò consideretur impressio ejus, ita vt medicamentum, vel intendatur, vel remittatur.

Tertium: si localia non sufficiant, palpebra inuertenda est, & interna pars fricanda, vel cum tenuissima lima, vsque ad eruptionem granularum, vel cum indice inuoluto folio ficus, aut parietaria, & permittatur exire sanguis copiose, tunc lauatur oculus cum rosacea tepida, inspergaturque palpebrae puluis aliquis subscriptus; & imponatur doctus imbutus lacte, & rosacea, & vbi dolor magis viget pro rosacea sit rosaceum.

Q iij & si



& si timetur fluxus imponatur frontalia ophthalmiæ; sedat item dolorem luteus assus, cum pullo per medium scissus, & calidus supra tenuissimum linteam impositus.

*Remedia Scabiei oculorum.*

**P**rimo conueniunt remedia albuginis. Aliud: polenta hæmatitis cum melle. Aliud: cortex oui diebus decem ad solem in aceto maceratus, tritus mittatur. Secundum validius: cum jungitur calor. ℞. tutiæ, croci, scorix æris, gummi arabici, æris vsti añā drag iij. mirrhæ, lapidis hæmatitis, spicæ, opij rosarum añā 5. j. piperis albi gran. iij. conficiatur cum vino, & vtire cum albumine. Tertium validissimum est: sieph album, collyrium rubcum Rasis hic.

*De mutatione aëris, ex ventis.*

**P**ropositio prima: ex Oribas. lib. 9. cap. 9. vniuersales venti fere salubriores sunt particularibus. Vniuersales autem ita habent, boreales maxime salubres, sed ob vehementiam non ita suaues. Zephyri ab occidente, minus his salubres, sed ob lenitatem suauissimi sunt, orientales prauis, & vehementes, Austrini caput grauantés sape etiam vehementes, à quo ordine nonnihil discrepat Auic. 2. 1. cap. proprio. Numerus autem ventorum licet non omnino constet, apud Aristotelem 3. meteoror. 21. & Plin. lib. 2. cap. 49. & lib. 13. cap. 34. & Aët. lib. 6. cap. 166. ita verius traditur communi autorum consensu.

Ab ortu æquinoctiali subsolanus Leste, Soão, Leuante. Ab ortu æstiuo Lestnordest, Ab ortu hyemali Euris, Vultur-nus, Lestsuest. Nautæ cum Aët. citat. cognoscunt alterum robustiorem, Aristoteli ignotum in medio quadræ, Nordest: Septentrionalis autem Cardinalis, Boreas, Septentrio, Aquilo, Norte: collateralis versus orientem, Nornordest, collateralis versus



versus occidentē Cirtius Nornoroüest. Nautæ cū Aëtio addūt alium robustiorē in medio quadra à septentrione ad occidentem Noroest, Occidentalis autem Cardinalis, Zephirus, Faunonius, Oüeste, ou Poente: collateralis ad austrum Lybs, Afrius, Oëstefuduest, collateralis ad septentrionem Argestes, Oüeste Noroüeste. Nautæ cum Aëtio cognoscunt alium robustum in medio quadra, ab occidente ad austrum Suduest, Meridionalis autem Cardinalis, Auster, Notus, Sul. Collateralis ad occidentem, Libanotus Sud sudioëste: Collateralis ad orientem, Phænicias, Euronotus Sudsuest. Nautæ cum Aëtio cognoscunt alium robustum, ab occidente ad austrum Sud, ouest.

*De temperamento Aquilonis, & Austri.*

**P**ropositio secūda: Omnis ventus infrigidat, & siccatur, quoniam tollit vaporē calidū humidum proximū corpori, sed alia intēctiones vincunt intēperamenta vēri. Nam aquilonares frigidi sicci sunt, eo quod flant nobis ab Arctico polo gelato, & quia dicebat Aristoteles à locis vicinis nobis, quare flatus eorū est impetuosior, ideo ob majorē distationē magis refrigerant. Austrini verò calidi humidi, eo quod ab adusta Zona terræ perflant, quia ob calorē trahunt copiā humiditatis, unde reddūtur humidi. Addit Auic. 2. 1. doctrina 2. cap. 8 & quia Meridionale mare plurimum est, & sōl vicinus plurimum eleuat vapores.

Patiuntur tamen hæc aliquas instantias. Prima: quia licet frequentissime auster calefaciat, aliquando tamen refrigerat, parum tamen durat, & minus aquilone semper refrigerat, flatur autem auster frigidus fere semper initio veris, quo tempore aues solent aduentare nobis, ideo 2. meteor. 5. vocat Aristoteles hunc ventū ornithias, & quia ejus flatu albet aër, vocatur etiam leuconotum, de quo 1. epid. 1. & 3. epid. 33.

Secunda instantia: habitantibus regiones meridionales, ultra æquinoctialem, contrarium est horum ventorum temperamentum



ramentum, ob contrarias causas, nec id est nouum inuentum, quod gloriatur Manardus lib. 5. epist. 1. cum etiam Aristoteles fateatur 26. problem. 48. & 1. epid. citat.

Tertia instantia est: regiones septentrionales, quæ habent mare austrinum, propter intermedium mare experiuntur frigidos austros, quod euenit nostris Algarabiensibus. Quod ergo ait Aët. lib. 3. cap. 172. austros perpetuo calidos esse, humidus autem non perpetuo, sed plerunque minus exactum est. Quod item Valeriola reprobatur Aristotelem quasi secum pugnet, asserens Austrum à polo antarctico spirare, & cap. 5. quod spirat non à polo, sed à solistitio æstiuo. Dic: prior sententia de tota terra est, posterior de nostra septentrionali.

Propositio tertia: orientales, & occidentales, quod attinet ad vehementiam, omnium maxime opponuntur; sunt enim occidentales blandissimi, ob duas causas 26. prob. 31. & 50. quia occidentales montibus carent, mari abundant, emergit ergo ventus æquabiliter per campos spirans, citra impetum acquisitum à montibus objectis.

Præterea cum venti sequantur fere motum solis, occidentales fere spirant ad vesperam, & quia antecedit eos nothus, & sequitur aquilo, ambo vehementes, ille medius iudicatur blandissimus. Ob contrarias autem causas orientales vehementissimi sunt, apud Aët. citatum: excitantes rheumata maxime enim mouent humores in animalibus, & plantis, vnde creditur foecundus arboribus.

De temperamento autem eorum aperte Aristoteles, & Auicena 1. continent. 115. licet Cardanus neget, orientales inclinant ad calidum siccum, occidentales contra. Causa varietatis est, licet ambo spirent à regione peragrata soli, quia orientalibus, qui fere spirant ad initium diei, adest reëtitudo solis potens calefacere, & extenuare, qui licet postea recedat, sufficit tamen calorem inductum conseruare. Ad occidentalem verò ventum nunquam habet reëtitudinem, quæ sola sufficenter calefacit, nisi approximante nocte, delitescens autem sol,  
nobis



nobis non excitat ventos, Aphrodiseus 2. meteor. 5. humidior, autem redditur ventus occidentalis, partim propter mare, quod plurimum est in occidente septentrionali; partim etiam quia cum minus attenuatus fuerit, minus aridus auasit.

Propositio quarta: particulares venti fere deteriores sunt, quia per longam viam non depurantur, sicut depurantur venti vniuersales, & aqua magnorū fluminum, inter quos qui flāt à campis, & terra perspirata boni sunt, qui à mare salubres hyeme, & vere: & astate calidiores, quam par sit; qui autem è flumine, è conuerso: deterrimi autem sunt qui ex paludibus metallis, & locis conclusis exhalant.

## C A P V T XXVI.

### De Lachrimis oculorum.

**A** Duerte primò: præcepta curatoria. Primum si affectus ex ætate est, fere non curatur, si sequuntur ad alios morbos, curatio est sanatio illorum. Secundum: si causa lachrimarum est defectus carunculae in oculo interno, curatio est immisio incarnantis pulueris. Tertium: frequentissima causa est debilitas cerebri, vel oculorum cum materia; perficitur curatio purgatione, & exsiccatione capitis, & emendatione intemperiei, & interceptione fluxus, & postremo, fontaneis in brachijs ex cap. de caphalalgia.

### Remedia lachrimarum oculi.

**P** Rimum: incarnans puluis tenuissimus thuris. Aliud validius. Sarcacola nutrita 10. sanguinis draconis 4. aloes, croci ana ij. spuma matis pars dimidia.

Secundum: intercipientia fluxum intro, grana thuris diglutiantur dormituro. Si verò causa sit calida similiter deuoret primam, ex subscriptis pilulis. ℞. thuris ʒ. j. mirrhæ, opij,

R croci



croci añā gr. v. cum papauerino, extra verò imponantur frontali lana succida combusta cum albumine.

Tertium: imponenda in causa calida, pulvis ossium, mirabolanorum combustorum cum aqua myrthi. In causa verò mixta ex Rasio hic tutiæ x. corallorum rubeorum, mirabolanorum citrinorum, aloes añā partes ij. piperis dimidiam. Aliud validius, ℥. sarcacolæ diu nutritæ in lacte mulieris partes iiij. tragacanthæ, thuris, scorix ferri, margaritarum non perforatarum añā j. spicæ acaciæ añā ß. amelli, cerusæ añā ij. tutiæ præparatæ iiij. trita perfundantur succo punico acido, & siccentur. Secundò, perfundantur infusione galangæ maioris. Tertio, cum aqua solani addita camphora, & cando añā partem j. Quarto: in causa frigida tutiæ præparatæ, corticum ouorum, aloes optimæ añā 3. j. inuoluta linteo suspendantur in aqua fœniculi, & sæpe in die exprimatur in oculos. In causa autem valdè frigida abluantur oculi cum aqua ardenti.

*De mutatione aëris, ex situ, ex Oribas. lib. 9. cap. ii. vsque ad 11.*

**P**Rima propositio: loca maritima cronicis morbis accommodatiora sunt, quia calefaciunt, deobstrunt, nervis profunt. Mediterranea verò acutis morbis meliora. Quia verò loca insalubria habent aërem sicciorē, & terram magis humentem, salubriora euadunt, & magis frugifera, quæ verò loca metallis vicina sunt, siccitatem habent perfocantem, quare loca thermarum noxia sunt; habentia verò paludes vicinas, in æstate pestilentem auram perflant, quia recipiunt putredines omnes, & quia aqua ipsa per quietem putret. Si verò terra argillosa est (galega) exhalatio siccat, & magis si terra rubra est, morrisca, eu de barro; omnium optima nigra.

Secunda propositio: loca sublimia frigidiora sunt, quia radiorum reflexionibus carent, & tenuioris aëris propter flatum ventorum vndique perspirantium, quare salubrior habitatio est, sed in hyeme obnoxia frigidis morbis. Contra se habet humi-



humilis, & maximè caua, quia senibus, & sincopisantibus confert, reliquis præfertur sublimis.

Tertia: regio confita plantis per hyemem frigida est propter solis inopiam, per æstatem verò suffocans præ repercussu ejus, quare deteriozem efficit habitationem.

Quarta propositio: flumen præterlabens, si moderatum est, inundationibus carens, & terra sicca, saluberrimum reddit aërem, in contrarijs statibus pessimum, & maxime si aqua inundans stagnat, per moram enim putret, & fructus propter immodicam humiditatem non maturantur. Præterea tales regiones arboribus abundant, quod addit ad crassitiem aëris. Postremo ob exhalationes fluminis matutinas, & vespertinas, friget aër; in meridie verò ob aëris crassitiem immodice calet, quare instar autumnæ terra morbida euadit. Regiones verò flumine carentes aërem habent tenuiorem, simul & fructus magis maturescentes.

Quinta propositio: variatur, & aër ex situ adjacentium vrbis, nam si locus proximus versus septentrionem in sublime vergit, calefacit vrbem; si deorsum infrigidat; si planus est minus infrigidat. Si verò locus respiciens austrum, in sublime vergit, infrigidat; si deorsum calefacit. Ad orientem verò, & occidentem situs adiacentis loci, minus variat temperamentum vrbis.

Sexta propositio: Variatur etiam aër ex situ vrbis ipsius. Nam quæ ad meridiem spectant optimæ sunt, quæ ad septentrionem pessimæ, reliquæ mediæ sunt. Causa: quia vergentes ad meridiem toto tempore anni, & toto die fruuntur soles; decliues autem ad septentrionem (auesleiras) è conuerso. Nam & in plantis illæ, quæ meridiem spectant visuntur cum fructibus odoratoribus, maioribus, pluribus, celeriter maturescentibus, gravioris vsus, imò & ejusdem arboris meridionalis pars tenerior, & rarior est, flexibilior, leuior, fabili operi accommodatior, crassioribus, & procerioribus ramis.

Septima propositio: optima constitutio ciuitatis est, cum

R ij

via



viæ omnes rectæ sunt, non sinuosæ, amplæ, maxime si procedunt à septentrione, ad meridiem, partim verò ab oriente, ad occidentem: vna causa: quia tales vrbes ventis principalibus sufficienter purgantur, & citra violentiam; procedunt enim venti citra reflexionem, purgantes fumos, exhalationem, puluerem. Vbi verò venti coguntur reflecti, non purgant, & vario illo repercussu ex vno fiunt multi, quare sequitur magna agitatio in aëre & spiritu nostro. Altera causa: quia sol oriens perfundit vndique calles omnes ab oriente ad occidentem, quando autem est in meridie lustrat omnes à meridie in septentrionem. Quare omnis aër vrbis sufficienter tenuatur, & purgatur.

Octaua propositio: plantæ verò ita mutant, quæcunque ferunt fructum esibilem, aut odoratos flores, aut folia, aut vim habent tenuandi, benefaciunt, vel communicando aëri salubrem exhalationem, vel ipsum per attenuationem purgando; reliqua pro varietate effluxus lædunt, nam praua planta, & olea, vt pote vitiosi succi aërem inficiunt, vnde intelligitur horum aërem salubrem non esse. Crassus etiam redditur aër ex oleosis arboribus, vt ex oliuis, & magis ex resinosis, & ex pinetis, & ex ficis, sic ex permixto multo puluere, vt quando, cum pluuia descendunt multa ranæ, & bufones, sic aër ex igne capiti, & oculis noxius est, maxime ex carbonibus, & radicibus ceptarum, propter perfocatum in illis terræ halitum, & magis si nō habuerit ferrum ignitum.

Nona propositio: cubatio in domo subterranea, nocturnus aër, aut diurnus nubilus, omnia vitanda sunt; redduntur enim in tali statu spiritus nostri nebulosi. epid. 8. quare oportet tunc intra domum se continere. Verum status anni in totū à ventis silens parat pesti. epid. in initio. Quare eligendus est locus qui à ventis purgetur, nam ventus omnis longiorem aëris fruitionem corporibus exhibet, violento motu aërem inducens ex Aët. lib. 3. cap. 162. non tamen ideo probatur aër ventosus, turbat enim spiritus, & humores, & semper caput replet.

CAPVT



C A P V T XXVII.

*De Debilitate visus.*

**A**duerte primò : methodicæ propositiones. Prima propositio: si nascitur ex siccitate scilicet corrugata cornea, vel diminutis humoribus, aut spiritibus oculi, remedia sunt conuulsionis ex inanitione per infusa naribus, oculis, capiti.

Secunda: si nascitur ex crassitie spirituum victus attenuans, boni succi, item medicinæ clarificantes sanguinem, dupliciter autem hæc operantur, aut tenuando substantiam, quod potissimum faciunt decocta adianthi, & fumariæ, vel expurgando crassitiem humorum sanguini permixtam, vt sena, mirabolani, agaricus, item medicamenta resoluentia vapores à capite, & spiritibus, quorum mixtione spiritus crassescunt, scilicet exercitia, frictiones, & pectinationes, reprimentiaque flatus à capite.

Tertia: si nascitur ex tenuitate immodica spirituum, sanatio est ineraffatio citra turbationem, oriza, amyllum, pedes pecorum, conferua rosarum, mirabolani, triphera, item omnia roborantia spiritus ex cap. de melancholia.

Quarta: in debilitate frequenti quæ sequitur, ad materiam decumbentem in oculos, conuenit vacuatio peccantis humoris, verum copiosa phlebotomia cauenda est, minuit enim spiritum, qui copiosissimus ad visum requiritur. Inter particulares euacuationes, errhina aliquanto suspecta sunt magis, quam masticatoria, & gargarismata; vomitus autem commendatus hic à Ratio in causa pituitosa rarus conuenit, frequens verò valde lædit oculos; deturbando ad illos materiam præconatu; vnde in vomitu oculi ligentur, post vacuationem autem roborantur membra mandantia, in causa quidem frigida cum chebulis, aut cum triphera minori Mesues quotidie sumpta. In causa verò calida, cum citrinis, aut cum sapor, tri-

R iij

phe.



phera apud eundem cap. de debilitate visus.

Præterea jurulenta omnia, potiones & euaporantia. ob-  
sunt, paucus verò stertus quandoque depurando oculos iuuat,  
minimus extreme lædit, confert pyramis exuto viridi, & im-  
missio oculorum in aquam, ex cap. de ophthalmia, confert &  
modica exercitatio oculorum, in lectione magnarum literarum,  
& magis in conspiciendis viridibus omnibus, plantis, vitris,  
immodica tamen lectio maxime in literis minutis obest, po-  
tissimum propter radios calcanthis siccantis oculos.

*Remedia in frequenti malo.*

**P**rimum: aqua stilatitia ex verbena, fœniculo, rosa, cheli-  
donia, rutha, & si placet magis abstergere, contineatur in  
vase æneo, & si adhuc magis insoleatur, & si magis adhuc, in  
quavis 3. aquæ addatur candi 3. j.

Secundum: peculiare in causa frigida. ʒ. succi fœniculi  
cocti in æneo vase cum bracteis auri quinque, & depurati 3. j.  
post collaturam adde mellis optimi 3. iij. item bulliat, & in-  
soleatur in vitro, abjiciendo per intervalla faciem. Validius  
evadit si addantur fellis avis 3. ʒ. Distant enim fella, ita ut mit-  
tissima sint piscium, validiora quadrupedum; validiora avi-  
um, & adhuc magis rapacium, validissima reptilium maxime  
jejunorum.

Tertium: peculiare in causa calida. Antimonij 3. xx. tu-  
tiæ x. marchasith 3. v. teratur quodque per se cum pluviæ  
sæpe, aliquoties cum aqua fœniculi, & majoranæ tandem ad-  
datur hæmatites, præparati croci aña 3. j. margaritarum non  
perforatarum 3. ij. muschi ʒ. j. camphoræ ʒ. ʒ. sumach. 3. ʒ.  
redigantur in tenuissimum pollinem.

Quartum: in causa mixta, aqua rosarum, & fœniculi cum  
aloe pulverato elambicetur, & oculi lauentur. Vel fœnu græ-  
ci, radicem althææ aña 3. ij. mundentur, & in aqua pura citra  
fumum coquantur ad tertias collato expresso, adde aloes  
optimi



optimi loti in aqua rosarum 3 ij. candi 3. j. eoque ad cōsistentiam mellis, & per intervalla instilletur, quod si oculi mordicant, ex collyrio abluantur lacte, vel rosacea deluticandi. Purgantia autem sine custodia, & electuaria petenda sunt ex Rasio, & Herculano hic.

*De mutatione aëris propter clyma ex 3. aphor. 14. & 2. de sanit. 7.*

**I**ntemperatissima loca sunt vicina septentrioni, vel austro, maxime si sunt mediterranea (*certō*) nam vicinitas maris remittit utramque immoderantiam intemperamenti. Temperatissima verò sunt inter septem clymata septentrionalia habitabilia, clyma quartum dictum diarrhodos, quae duo discutienda sunt.

De 1. local. maritima 2. 1. doctr. 2. cap. 10. ideo sunt temperatiora aestate, & hyeme, quia aër ex vaporibus magis crassifactus difficilius permutatur ad utramque immoderantiam, sicut aqua crassior tardius calefit in aestate, & refrigeratur hyeme ex 5. aphor. 26.

Sed obstat huic determinatiōni, primo id quod scribitur 21. problemat. 6. hyemem esse frigidissimam, quia frigiditatem plurimam à noctibus conceptam, aër crassus per hyemem deponere non potest; & aestatem feruentissimam esse, quia calorem eximium à diebus aestivis conceptum per noctem non deponit, sicut & lapis, ubi semel calefactus est, magis quam aqua calefacit, & ubi semel refriguit magis, quam aqua refrigerat.

Obstat secundo: quod Alfarab. 10. theor. 3. ait: maritima si habent à septentrione mare, sunt frigidiora mediterraneis, quia saepe perfiantur aura aquilonis. Si verò ab austro calidiora propter oppositam causam.

Obstat tertio: quod in aphorismo citat. scribitur, loca meridionalia maritima esse minus calida; septentrionalia, verò minus frigida, quia mare non universaliter operatur idem in omni



omni tractu terræ. Dic: mare mutat temperiem loci in ratione maris, & in ratione situs maris, & in ratione situs terræ, vniuersaliter enim reddit locum salubriorem 2. meteoror. 2. ob causas quatuor apud Auerroem.

Prima: salugine renititur putredini. Secunda: humiditate vitam prolongat. Tertia: semper inspirant venti aërem purgantes. Quarta: temperat æstatem, & hyemem propter causam dictam modicæ crassitie aëris. Euentus autem intemperamentorum in ponto habet duplicem causam, vnā longissimos æstiuos dies, cum breuissimis noctibus, & longissimas noctes hyemales, cum breuissimis diebus. Altera causa, crassities plurima aëris, licet enim pauca crassities faciat ad aëris temperamentum, plurima tamen facit ad temperamentum.

Secundò: mare mutat ratione situs maris, nec illud est contrarium superiori, quia potest ratione variorum varie immutare.

Tertiò: mutat mare ratione situs terræ, ex Galeno enim aphor. citat. loca meridionalia maritima minus calent, quia cum talia loca sponte sua caleant, temperantur à mari, & è cōuerso in regione septentrionali, quia hæc consideratio continetur in prima, atque adeo habetur solutio ad tria objecta opposita. Num autem vapor magis humectet, concessit Auicenna citat. & constat experimento. Olysiponenses enim habent cures leniores, & facies pulchriores, quia sol ex omni re non eleuat, nisi leuissimum, & dulcissimum in lib. de aëre & aqua quia non eleuat adustum falsum.

Nec obstat, quod scribitur 24. prob. 39. natantes in mare ideo gracilescere, quia vapor maris calidus siccus est, agit enim ibi de vapore eleuato in aëre, sed de humiditate falsa communicata natanti. Nec obstat item, quod supra loca maritima commendantur in morbis chronicis, quia vapor maris humiditate sua fundit excrementa crassa, & siccitate extenuat.

De secundo autem proposito, quod clymatum sit temperatissimum



ratissimum Auicena 1. 1. doctrina 3. cap. 1. induxit parado-  
xam opinionem, quod locus sub æquinoctio temperatissimus  
est. Post quem locum cum Galeno præfert quartum clyma.  
Auer. verò collet. 22. præfert quintum clyma patriam suam.  
Manardus lib. 5. epist. præfert sextum patriam item suam, ar-  
gumento quod sit media secundū æquidistantiam inter æqui-  
noctium, & septentrionem; licet enim Ferraria latitudinis,  
vel eleuationis Poli gradus 41. clyma autem nostrum (diaro-  
ma) gradus 41. sicut quartum clyma (Diarrhodes) gradus 36.  
Sed vere temperiem loci particularem multa faciunt alia, scili-  
cet præter clyma, situs loci, & astra, sicut & anni temperiem alia  
præter solem mutant particulariter. Vniuersaliter autem quar-  
tum clyma est medium clymatum, licet enim sit medium lati-  
tudinis, ab æquinoctiali, ad septentrionem; sextum autem est  
medium latitudinis, sed non clymatum habitabilium, quare  
plurima loca in eo sunt per frigidum intemperata, & ideo rele-  
gandum est à temperatissimo, sed recipienda sunt quartum, &  
quintum, ambo comprehendentia Hispaniam.

Nec obstat quod de lib. de aere, & aqua minor Asia præ-  
fertur Coos, Hippocratis patriæ sitæ in quarto clymate, quia  
in eodem clymate sunt Coos Hippocratis, & bona pars Asia  
minoris, sed ob situm regionis minor Asia præfertur.

C A P V T XXVIII.

*De Suffusione.*

**A**duerte primò: de affectione, quam vocant suffusionem,  
vel cataram, vel aquam, vel imaginationem, licet ima-  
ginatio magis importet principium, reliqua nomina perfectam  
affectionem.

Præcepta autem curatoria sunt. Primum: vacuatio uni-  
uersalis, & particularis minorans, & erradicans, frequentior-  
que in affectibus similibus propter malitiam morbi semel con-  
firmati,



firmati, phlebotomia tamen rarissima, propterea quod rarissime pendet suffusio à sanguine.

Secundum: victus multo tenuior, ita ut abstineat etiam à cana, & exsiccatio, ita ut vinum vitetur, & omnia virulenta.

Tertium: in vitijs citra suffusionem multo remissiora sufficiunt, cum soli vapores fere à ventriculo communicati sint dissipandi. Quare sufficiunt remedia debilitatis visus materialis, cum verò aqua concrevit in oculo validiora applicanda sunt, non tamen quandiu in oculo adest vlcus, aut inflammatio, vel calor prodiens.

Quartum: operatio chyrgica non est tentanda in valde recente, fluxibili, nec in valde antiqua, dura, harente, neque vbi adest obstructio. nerui optici, aut affectio alia prohibens visum.

#### *Remedia Suffusionis.*

**P**rimum: ante impositionem cuiusvis collyrij inspiret in oculum frequenter familiaris quispiam masticans semen feniculi. Vel miratur oculus in vas plenum decocto feniculi calentis, primum autem collyrium est fel hyrci, exsiccati in vase aneo, grana lauri decorticata añā 3. v. serapioni 3. j. gummi 3. 6. cum melle, & vrina pueri non polluti, vel salis gemmæ oppopanicis añā 3. j. in lacte mulieris.

Secundum validius est: felis, succi celidoniæ, feniculi, ruthæ, vini albi añā 3. iij. tutiæ 3. j. amoniaci 3. 6. floris aris, spumæ maris añā 3. 6. distillentur, & cum radio inuoluto cottamponatur.

*De mutatione aeris ex domo, strato, & vestibus ac iuxta domo juxta*  
*Oribasium lib. 9. cap. 13.*

**P**ropositio prima: domus terrestres conueniunt ijs qui egent refrigerari, vel viribus sunt debiliores, hamoptoicis;



cis, & cephalalgicis, reliquis tabulata meliora. Secunda: magna domus praestat vi valida, & materia multa discutienda, in contrarijs parua.

Tertia: sublimis tecto respirationem facilem efficit, & caput leuat, humilis improbat.

Quarta: cujus fenestrae respiciunt meridiem, optima sunt ad calefaciendum; in egentibus autem refrigerio praestant aquilonares januae, & fenestrae. Secundo loco sunt orientales pessima occidentales, quia mane quando lux suauissima est ea caret, & vespere cum nocte per astatem astuosissimas habent.

Quinta: parietes tenues patent intemperaturis continetis, praestant ergo crassi, qui mitiores sunt, & minus frigidi, ex lateribus quam ex lapidibus, illi autem calce visum tentant.

De mutatione autem ex strato juxta eundem cap. 14. Propositio prima: optimus decubitus est in lectica, pessimus supra duram terram, nam & duritie injucundus est, & flatu terrae corpus replet.

Secunda propositio: si lectica humilis est, exhalationi terrae obnoxia est, si excelsa timoris plena est quasi pendeat, optima ergo est mediae altitudinis.

Tertia propositio: parua est molesta nimis, magna lassat errando, media ergo magnitudinis optima est.

Quarta propositio: firma sit, non concussa, quare funes valde contenti sint, ne corpus vacillet, & strata inferna non valde mollia, nam & impense calefaciunt, & laboriosam faciunt in lecto versionem, coreacea autem strata, primo frigefaciunt, paulo post valde calent ideo incommodant.

Quinta propositio: situs sublimis ad caput, affectibus capitis prodest, & promouet fluxiones vterinas, sed lassat continendo corpus sublime, quare extra illas necessitates praestat aequalitas.

Sexta propositio: stragula splendida, & valde pincta feriunt sensus, varia autem, & figurata vacillanda mentis occasionem praebent.

Sij

De



De mutatione autem ex vestibus, quæ locum aeris sup-  
plent, propositio prima in membro debili operimenta, & li-  
gaturas oportet ejusmodi esse, ut prohibeant à debili mem-  
bro immoderantias aeris, & defluxiones, oportet esse hujus-  
modi, non ea copia, ut rarefaciant, aut trahant ad debile.

Secunda: quod de victu priuatorum scribitur, per æstatem  
oportere indui vestes oleo infectas etiam à Galeno in com-  
mentar. non recipitur, nam munda, de solo contextu, nih il-  
lilox æstate conueniunt, ut pote refrigerantes citra mole-  
stam grauitatem, eo quod identitas contextus non conseruat  
exeuntem vaporem, & aer liberè means magis refrigerat, hye-  
me verò contraria.

## CAP. V. T. XXI X.

## De Dolore auris.

Incipit, si cum dolore.

**A** Duerte primò: methodi curatoria præcepta. Primum:  
ante injectionem medicaminis, semper emundetur au-  
ris leniter cum cotto in cuspide radij.

Secundum: injiciantur medicamenta actu tepida, ne ab  
immodice calido, aut frigido offendantur, ob tenuitatem mē-  
branæ, & os substratum.

Tertium: mittantur guttæ tres, agro jacente supra sanā au-  
rem, & post horam vertatur supra agram; injicianturque qua-  
ter in die, ut suppleatur frequentia injectionis paucitas in-  
jecti liquoris.

Quartum: in dolore externo, ut pote membri ignobilis  
vicini nobili, repellentia non conueniunt.

Quintum: in dolore intensissimo, sedatio doloris præce-  
dat ad vacuationem juxta præceptum 4. i. cap. 4. in reliquis  
sumatur initium à vacuatione.

Sextum:



Sextum: phlebotomia conuenit copiosa in calido dolore, ob doloris vehementiam, & adhuc magis in inflammatione. Purgatio autem magis conuenit in frigido dolore, & in calido non inflammanti. Si verò jungitur inflammatio, purgatio leniens sufficit vsque ad initium declinationis.

Septimum: in critico dolore reprimenda omnia vitentur, & modice iuuetur crisis emundatione auris, fomentis, & emplastris anodinis. Si verò morbus criticans esset grauissimus, etiam per cucurbita, & emplastrum atrahens adiuuetur, quod tamen non caret periculo, ob vehementiam doloris ex humore tracto.

*Remedia in dolore auris.*

**P**rimum: in initio doloris calidi rosacei ꝑ. ij. amigdalini ꝑ. j. aceti ꝑ. iij. coquantur ad consumptionem aceti. Validius est, rosaceum, cum paruo succo cucurbitæ, vel parietariæ. Validius, in ꝑ. β. liquoris, opij gr. x.

Secundum: in frigido dolore nardinum, & lininum bullitum in capæ cauo, cum aceto sub quintuplo. Validius est, si addatur succus raphani, vel ruthæ, vel fel tauri, cum adipe anatis. Validius est, si in ꝑ. β. liquoris additur opij, castoris añā gr. v. sequaturque postea injectio solius nardini.

Tertium: in dolore flatulento sacculus ex millio, & sale torrefactis, vel suffitus per canulam meliloti, camomilæ, anethi, majoranæ, baccarum lauri, absinthei, pulegij.

Quartum: in maturatione calidi doloris, addatur mucilago seminis citoneorum, & altheæ, vel diaquilone minori, cum camomelino fiat vnguentum, & liquidum infundatur. In frigido autem dolore addatur assungia gallinæ, vel anseris. Vel fiat vnguentum liquidum, cum diaquilone majori, & sesamino. Maturat simul, & resoluit in causa mixta emplastrum ex farina ordei, cum decocto altheæ, & camomelino. In frigida autem causa cape assum, cum butyro contusum.

Quintum: emplastrum rumpens inflammationem, cape

S iij

co-



coctum, cum butyro, & fermento. Validius, radix lilij, cum melle, & butyro, & linino? Validius, si addatur radix ireos, & finus columbinus.

*De Motu, & quiete.*

**P**ropositio prima: ex Oribasio lib. 6. cap. 1. & 2. & 14. Quiescere conuenit post cibum, & in initio, & augmento accessionum, & in hora somni. Decumbere verò in morbis acutis, ne lassentur vires defectæ ex acuto morbo, & inædia. Nam in diuturnis per interualla accessionum motus conuenit.

Secunda propositio: figura cubandi ita varianda est. In affectibus capitis conuenit sublimis, dempta phrenitide, in qua perturbatur ex eo decubitu. Conuenit etiam sublimis in asthma, & thoracis affectibus, quia sedentes facilius respirant. Si verò affectio est defluxio ad intestina, conuenit inclinatio ad illa. Si vrget dolor colicus conuenit decubitus pronus. Si ventriculus tarde concoquit, decumbat supra sinistram, ita vt hepar amplectatur ventriculum; si verò affectus possidet renes, aut vesicam vitet supinum decubitu; si inflammatio diuturna, aut schyrrosa occupet jecur, aut splenem: cubet supra affectam partem, initio autem supra oppositam.

Tertia propositio: de speciebus exercitiorum. Quædam sunt valida: alia velocia, nonnulla vehementia. Validum est, quod peragitur magna musculi contractione, licet non celeriter, vt magnum pondus sustinere, vel accliuus ascensus. Velox verò dependet, ex veloci non vehementi musculi contractione, vt pulsus vehemens, mixtum ex valida, & veloci contractione, vt fossio, inter quas differentias plurimum debilitat vehemens, quia plurimum resoluit. Minus autem validum, vel velox. Distant autem plurimum duo membra postrema, quia velox varietate motus magis siccatur, quam replet trahendo, validum autem magis replet continuo tractu, quam siccet motus frequentia.

Quarta



Quarta propositio: quædam magis vnum membrum, quædam aliud exercent, vt stare, inclinare lumbos, incedere, & ambulare, crura, & scriptio manum, vox thoracem, inspectio minuta oculum, cogitatio cerebrum.

Quinta propositio: ante exercitium oportet præcedere frictionem, vel vnctionem, vel aliter corporis emollitionem, quia est dimensio stadij in equo cursuro, ne repentinus motus violentus, aut rumpatur vas, aut obstruat. Agnoscitur autem terminus exercitij ex nocte 2. de sanit. 5. cum corpus non amplius tumet, & quando floridus color carnis florescit, & alacritas ad motiones minuitur, & sudor vel adhuc calens minuitur, vel jam incipit frigere, sicut autem ante incepti-  
nem exercitij oportet præcedere emollitionem, quam vo-  
cant preparatoriam, ita ab exercitio non statim quiescendum  
est, sed vtendum est apothepia, vel recuratoria exercitatio-  
ne, ea est levis exercitatio ad exercitationem eorum, quæ li-  
quantur per exercitium, quale est deambulatio in equis fatiga-  
tis, currendo. In nobis autem cohibitio spiritus, extensio bra-  
chiorum, & crurum pandiculatio, lenta deambulatio, & frictio,  
quæ in fine exercitij ad præcautionem lassitudinis adhibetur.

CAPVT XXX.

*De Graui auditu.*

Incipit, Cum in Auditu, &c.

**A** Duerte primò de methodo propositiones. Prima, si cau-  
sa est surditates auris, dirigatur auris ad radium solarem,  
& cum manu extendatur auricula, vt foramen rectius consti-  
tuatur, & cum spicillo auriculari molliter circumtrahatur. Si  
verò induruerit prius, emolliatur immisione amigdalini, post  
emendetur, vel cum spicillo, vel cum lenimentis, vel per sy-  
ringam mulla injiciatur.

Secun-



Secunda, in causa frigida frequenter purgationes humoris crudi repetita exiguntur, localia autem tardentur, & retententur leuiores; quod si laedunt, omittantur, difficile enim est permittere quantitatem profuturi remedij, procedit autem commodè ad infundenda, cottus ex decocto emolliente, & attenuante.

*Remedia grauis auditus.*

**P**rimum: vacuans per interualla crudos à capite humores, ℞. salis gemmae, piperis ana gr. ij. castorij j. puluerentur, & per interualla sumantur in ouo sorboli gr. v.

Secundum: suffitus auris ex capite superiori. Vel ex vase angustiori, quod diu conseruauerit oleum.

Tertium: injiciatur absinthii succus cum sale. Validius, gariophilorum ʒ. β. mastice gr. ij. seminis porri gr. vj. crasse trita buliant in ʒ. β. rosacei, & instilletur tepidum, vel castorij gr. ij. rosacei ʒ. j.

Quartum: in causa calida, succus vtriusque punici (Romāa) coquatur in cortice suo, vsque ad modicam crassitiem cum aceto, thure, & rosaceo, & instilletur.

*De Sermonē, ex Oribasio lib. 6. cap. 7.*

**P**ropositio prima: locutio omnis replet caput, vel quia vox praequirat efflationem 4. de locis 6. efflatio autem propter vim expressi pectoris exprimit in caput vasa. Dissoluit item vires propter efflationem, quae violenta est pectoris constrictio, & sitim inducit propter ingentem aëris calefacientem motum. Quare obest ophtalmicis, & sanguinis quomodo-cunque effusioni, conuenit autem comatosis.

Vociferatio quae editur orantibus, & concionantibus, cantantibus, praestantissimum exercitium est, habetque usus quinque. Primo enim dilatat, abstergit vasa omnia, & meatus,



rus, eo quod ad durationem vocis ad acutiem, & eleuationem ejus requiritur attractio frequens, & plurima aëris per os, per nares, & per vniuersam cutim.

Secundò: rarefacit, & lenem efficit carnem hac vicissitudine aëris modo tracti, modo pulsæ, cum reliqua exercitia concilient carni duritiem, & densitatem, vnde apparet experientia ex reliquis exercitijs reddi homines ingenio magis hebetes, ex cantu verò ingeniosiores.

Tertiò: vt liuaretate modo exhaurit musculos laxando, modo roborat intendendo, cum enim editur sonus acutus, prolongatur collum, & mentum sursum, quare tenduntur muscula ceruicis, & consequuntur eandem tensionem thorax cum ventre. In graui autem sono laxatur, deprimiturque collum, & mentum, quare, & pectus, & venter.

Quartò: excrementa corporis maximè capitis, & pectoris per dilatationem, & calorem meatuum excernuntur, multi enim muci à capite legentibus prodeunt, & vapor crassus ex ore exit, & per cutem roridus sudor.

Quintò: Omnes excessus intemperamentorum moderantur, nam valido illo aëris tractu spiritus noster refrigeratus quantitate, & qualitate calet, humida verò excrementa absumuntur. Sic siccitas plurimo aëris tractu temperatur, calor verò immodicus eadem aëris copia refrigeratur.

Tertia propositio: iucunda est vociferatio, sicut & reliqua exercitia post aluum purgatam, & deambulatio postea sequatur, vel aliquanta frictio, incipiatque à sono grauissimo, paulatimque procedens ad acutissimum, vnde rursus fatigata vi redeatur ad grauissimum, vt scilicet progressus fiat paulatinus, satiusque est memoriter recitare, quam legere, quia ita animus magis intendit modulato exercitio.

Optimæ sunt ad recitandum, quæ includunt frequentes vocis varietates, qualia in musica vocantur (mudanças) & ex versibus Iambici, vel Saphici, hoc nomine præstant eligiacis.

**T****CAPVT**



## CAPVT XXXI.

*De Hamorrhagia narium.*

Incipit ex his, &amp;c.

**A**duerte primò: methodi præcepta. Primum: si fluxus debilis est, licet incipere à remotione causæ; si verò validus, ab eo quod magis vrget, id est vt sistatur per valida reuolentia, vtrumque tamen non tarde complendum est.

Secundum: si causa fluxus est bilis vacuetur cum tamarindis, mirabolanis, & cassia, ex cephalalgia biliosa. Præterea infigiderur, & incrassetur sanguis, potissimum membrum à quo prodit, intro quidem cum papauerino, & aqua portulacæ, & chalybeata, extra verò cum bolo armeno, & poscha rosacea. Succi verò infigidantes imponantur membro vnde fluit sanguis, & si ex toto corpore totum infigiderur, & vbi vis tolerat, in frigida mergatur. Si verò causa est serum plurimum, sanguis exsiccandus, & calefaciendus est cum decocto thuris, & nucum expressi. Vacuandumque serum cum mirabolano, & succo iereos ex cap. de hæmoptoisi.

Tertium: plurimum potest reuulsio valida per ligaturas, & cucurbitæ è regione naris appositæ, natibus, spatulis, hepatis, lieni, & magis sectio cephalicæ affectæ. Quod si fluxus impetuosus est, vel causa fluxus est plethora, semel plurimum exhauriendum est, si verò contra, fiat sectio angusta, & per interualla horarum paucissima quantitas crebro extrahatur.

Quartum: victus parcus infigidans, & incrassans, amilum, pedes, oriza, acetaria, & portulaca cocta, & cruda, & indumenta paucissima, & laxa maximè iuxta collum.

Quintum: localia sistencia hæmorrhagiam. Quædam id operantur congelando, vt camphora, & opium; alia crustam inducendo, vt cauterium potentiale ex vitriolo, & calchanto,  
aut



aut calce, vel actuale. Quædam conglutinando, vt thus, & gypsum, alia adstringendo, vt bursa pastoris, & aloë. Nonnulla à proprietate, vt stercus asini, aut porci, aut hæmatites, & jaspis suspensa, inter quæ tutissima sunt adstringentia pariter, & glutinaria.

*Remedia.*

**P**rimum fronti applicetur gypsum in albumine. Validius ex Rasio gypsum, cinis cartæ, galla, sanguis draconis, calx, vitriolum ( *caparroza* ) vel albuminis, & amyli aña insuflatur.

Tertium: Validius si continuo insuflatur, vel inspergitur lenimento imbuto albumine, calx aurificum, & penitus naribus inferitur, ea constat chrisocollæ ( idest tincal ) fecis vitri ( *latram* ) partibus septem, mixtus autem pulvis detur ( *pos de soldar.* )

Quartum aliud: stercus asini, vel porci recens, vel aridum immitatur naribus.

Quintum: emplastrum laudatum s. therap. 4. ad omnem hæmorrhagiam. ℞. aloës ij. thuris j. cum albumine, & pilis leporis tenuissimis, sequenti die si fieri potest de ligatione ejus primi quatuor circuitus comprehendat vulnus.

*De Frictione ex Oribasio cit. cap. 17. & 20. & Galeno 2. de sanitat. per totum, & Celso lib. 2. cap. 14.*

**P**ropositio prima: compendiosissime natura frictionum explicatur ab Hippocrate hic. Frictio dura ligat carnem, mollis soluit; multa attenuat, mediocris augeat. Cum enim diuidatur frictio penes quantitatem, in multam, mediocrem, & paucam; penes qualitatem, in duram, mediocrem, & mollem. Hippocrates expressit in diuisione qualitatiua duas differentias extremas, eo quod habet effectus extreme contra-

T ij

rios.



rios. In diuisione autem quantitatis explicauit vnũ extremum cum medio, eo quod habent affectus similiter oppositos. Pauca enim frictio cum nec trahat sufficienter alimentum, nec sufficienter roboret calorem membri, ad alitionem, non sufficit augere carnem.

Secunda propositio: ad finiendam febrim præstans est remedium, cum febris non est valida, nec jungitur inflammatio, aut sudor multus, & febris obtinet jam statum vniuersalem, & adhibetur in declinatione particulari iuxta 11. therap. 10. fiat autem frictio in junioribus à quatuor, in maioribus à sex viris, scilicet ne dum interim pars vna fricatur, altera rarefacta frigescat, fricenturque juniores centies; adulti ducenties cum hydreleo calido, & præstat si sit camomelinum, & in tepidiori febre etiam addatur vinum album. Constituuntur autem ita fricantes, vt priores duo, alter à dextro, alter à sinistro fricent brachia vsque ad extremos digitos. Duo sequentes thoracem, vsque ad inguina: postremi duo crura, vsque ad imos digitos, tandem leniter contrectetur collum cum capite. Frictionum modus est, vt incipiat à leni, & terminetur pari lenitate; in medio sit celer, & præmens, & semper magis superne deorsum, quam è conuerso homine constituto, primum quidem supino, postea prono, scilicet vt exercitatio sensim incipiat, & finiat, & præterea vt excrementa in parte posteriori ad anteriora mandentur:

Tertia propositio: si procedente frictione succedit sensus vlcerosus, vel parua tollerantia, vel immodicus calor junctus multæ implaciditati, vel pulsus, aut respiratio valde debilitatur, aut crebrescit, vel febris intenditur, & paulo post nō mitescit confestim cessandum est. Si verò hæc absint, apparet hilaritas vultus, tumor carnis, pulsus non languescens, perseuerandum est, & licet post frictionem febris æqua redierit, ea declinante rursus fricandum est. Nam paulo post sæpe apparet vtilitas, scilicet quia febris non redit, vel mutatur, in alium typum, vel redit vehemens, sed semel tantum, vel fit  
conti-



continua, nec tunc oportet turbari, nam cito cessant. Quare amplectendum est remedium, vt generosum, cum conditi-  
nibus dictis.

## CAP V T XXXII.

## De Dolore dentium.

**A**duerte primò: conseruandorum dentium præcepta vl-  
tra Auicena, & Doctores hic. Primum, benefacit si non  
dormiatur ore hyante, eo quod non exhalat ad dentes flatus  
ventriculi teter, cum habeat exitum.

Secundum: optime facit si semel in mense mudentur  
erradico lapide, & appposito parcissimo vnguento, & aqua  
forti, papyro, farina ordei; aut semel in hebdomada colluan-  
tur, cum aceto schyllino, in minori necessitate cum vino, in  
quibus dissoluatur trochiscus, scilicet ossium dactylorum 3. ij.  
coralli rubri 3. j. farina lupinorum 3. iij. schylla assata 3. vj.  
radicum iridis 3. iij. trita cum melle conueniant in trochiscos  
dragmales. *Item a raiz do memandro posta na coua do dente tira  
a dor.*

Tertium: si gingiba immodice tumeat, aut liueat, scari-  
ficentur, & valde præmantur à sanguine, coquente collutio-  
ne vini nigri decoctionis rosarum, saluia, balaustiorum.

Aduerte secundò: curandi doloris calidi præcepta. Pri-  
mum in initio contineantur in ore refrigerantia, & præstat  
esse aliquid abstergens, vt reprimatur fluxio humorum, verum  
vbi copia humoris inflammat gingibam, vel dentem disten-  
dit, magis sedat dolorem leniens aliquod, vt decoctum mal-  
uæ, & violarum.

Secundum: si materia fuit sanguinea, aut mixta, diuer-  
tenda est simul, & euacuanda, cum phlebotomia caphalica,  
& si creditur communicari ab inferioribus eligatur vena cõ-  
munis, sequantur scarificationes, aut hyrudines, in dorso,  
T iij                      mento,



mento, gingibis sub lingua. Si verò causa est biliosus humor merus, præsta cholagogum phlebotomiæ. Quod si jungitur inflammatio, sufficiunt tamarindi cum cassia, & mirabolanis, vt constat ex cap. de cephalalgia biliosa.

Tertium: vniuersale est remedium, aqua communis, vel magis rosacea, cum sub triplo aceto, & in maiori calore ad 3. j. liquoris adde camphoræ gr. x. vbi verò dolor magis vrget suffiatur cum imbuto (id est infundibulo) ex semine hyosciami, vel leniatur dens dolens cum camphoræ, & pyretri aña gr. x. in syrupo aceroso. Validius, & rosacei 3. ij. opij gr. v. in quo inuolutus cottus comprehendat totum dentem; vel deglutiat pillulam j. opiatam ex cap. de catharro.

Aduerte tertio: curandi doloris frigidi præcepta. Primum, collutio in initio cum calidis permixtis adstrictioni, post maturatorijs, & resolutorijs, decoctum gallæ in vino, & aceto, post decoctum vernicis; deinde decoctum passularum, & caricarum; benefacit masticatio pyretri, educens pituitam, & si cum puluere origani, salis, seminis synapis inuolutis in lintheo fricetur dens cum gingiba. Vel ex staphysagria, & pyretro aña 3. j. cum pauca cera fiat capsula denti. Vel fricetur cum aqua ardenti.

Extra valent fomenta ex millio, aut sale, aut cape assum eum linino. Vniuersale autem in omni dolore ita paratur. Radices altheæ coquantur ablato meditullio, tundantur, & addita farina camomilæ, scœnu græci, & seminis lini, & camomelino imponatur calidum.

Secundum: vbi dicta non sufficiunt, suffiatur dens, ex semine hyosciami cum styrace. Validius est, si in oximellit 3. ij. opij gr. v. cottus intinctus imponatur, vel cauterizetur dens cum oleo ebulliente, scilicet in cuspide radij intincto cotto; vel cum aqua forti, aut stylo ignito, aut tenacula immittatur sape frustulum thuris seruens, immittatur autem, vel foramini, vel radici dentis, præstatque in huiusmodi cauterizationibus, vt partes sanæ operiantur petia imbuta rosacea.

Aduer-



Aduerte quartò: curanda erosionis præcepta. Primum, emendetur putredo post applicationem frequentem cotti in-  
tincti in aceto, decocto melanthij.

Secundum: impleatur foramen folijs auri, vel cum ma-  
stice, in frigido sanguine draconis. In calido suffiatur semi-  
ne hyosciami cum styrace. Valent cauterizationes dictæ; quod  
si dens vndique illinatur in aqua forti, in posterum non do-  
let, sed tractu temporis frangitur.

Tertium: non est temere extrahendus dens, si enim cau-  
sa est in gingibis, lædit cum augeat defluxum; si in nervis ali-  
quando prodest propter faciliorem vacuationem materiæ, ali-  
quando obest propter auctum dolorem. Si causa est in dente,  
sanat extractio, & non fiat nisi sedato dolore. saltem cum nar-  
cotico, & dente exacte scarificato.

*De Ambulatione, ex Oribasio cit. 21.*

**P**ropositio prima: deambulatio commodum exercitium  
est, cum scopus est deducere infra superiorem humorem,  
sed oportet vt sit multa, & contenta, ita vt crura modo plus,  
modo minus moueantur, & gradiendo corpus incumbat, mo-  
do calcibus, modo digitis pedum; si enim fiat extremis di-  
gitis renitentibus, & aluo supresso, impense prodest, oportet  
autem, vt instar reliquorum exercitiorum incipiat, & conti-  
netur mitis, in medio autem fiat vehemens.

Secunda: suscipit variationem deambulatio ex loco, &  
aëre in quo fit, ita vt accliuus, jejuno homini dilatat meatus  
omnes spirandi, quia in valida corporis eleuatione, cum mul-  
tus spiritus exhauriatur, necesse est plurimum aërem trahere  
ad eum alendum, quia confert talis deambulatio obstructis,  
& asthmaticis. Decliuus verò laboriosa est cruribus, sed om-  
nium maxime materias capitis deorsum deponit, quæ fit in  
breui spatio, vel circumuoluto, capiti nocet ob spirituum ver-  
iginem. Progressus in arena valde firmat totum corpus, &  
mate-



materias infra deponit. Quæ peragitur in pomarijs, vel viridarijs blandissima est, sed caput repletur tum propter odorem, tum propter loci humiditatem. Omnibus præfertur quæ efficitur in sublimibus tabulatis (*varandas altas*) ær enim ibi est purior, quare expers flatuum terrestrium, & cum tabulata cedant gradienti, materias deorsum trahit. Quæ verò peragitur juxta mare attenuat, & siccatur, quæ verò in mediterraneis minus. Quæ juxta flumen humectat, juxta stagna verò lædit. Reproba est quæ in locis fit cauis, vel sub tecto, sub dio verò optima est, mediocris sub vmbra arborum, cum arbores salubres sunt, si peragitur in loco à ventis silenti excrementa dispergit, si in ventoso variè operatur juxta venti varietatem. Nam boreas thoracem lædit, ventrem, & sensus roborat; Austro autem corpus, & maxime cerebrum infirmat, & replet: Solanus ferit, malusque est; Zefirus jucundus, & blandus, sed vniuersaliter propter frigiditatem densantem minus dissipantur excrementa, quod si in loco à ventis silente, si sub cœlo sereno fit, leuat, & attenuat, si nubiloso, replet, & grauat. Inæqualis minus fatigat, sed minus etiam firmat corpus, quæ si per æqualem campum fiat; quod quæritur ab Aristotel. 1. probl. 10. & 13. causa, videtur quia assiduitas vnius motus magis fatigat, quam si fiat in motu permutatio: qua de causa vt minus fatigemur in quouis exercitio, manus, aut pedes commutamus membra ipsa, sic deambulatione per inæquale spatium, cum fatiget vicissim, modo quidem superiora in ascensu, modo inferiora, in decliui, magis alleuiat, quam si æqualem viam vno motu conficeremus; verum si motum aliquem intersecamus quietibus, vt fit in breuibus deambulationibus magis fatigamur, quam in conficiendo iter longum, & continuum, & in processibus, propter quietes medias magis fatiganur. Causa diuersitatis inter hunc casum, & priorem, videtur quia quietes mediæ causa sunt, vt excrementa per exercitium liquata defluant ad iuncturas calore fatigatas, quare repletæ laborant: vbi verò motus non interpolatur quietibus, sed motuum, & figura-



gurarum varietate fit, vt modo ex vna proprie exhauriatur spiritus scilicet, & excrementa, modo ex altera, quare ita singula proprietates minus laborant.

Propositio tertia: variatur & deambulatio, penes quantum, & qualitatem, nam pauca, & quiete conuenit cibatis, & a somno expergefatis, lassitudinemque soluit, purgatis exercitandis, exercitatis dolentibus, quamuis corporis partem; totum corpus graue habentibus. Robusta verò, conuenit vbi placet meatus distendere, carnem augere, calefacere. Multa verò conuenit vbi caput, aut thorax male affectum, & aut vbi destituimur alio exercicio. Penes tempus item sic matutina aluum emollit, spiritus attenuat, vapores dissoluit, vespertina verò dissipat flatu, & somnum allicit.

## CAP V T XXXIII.

## De Pustulis oris.

**A**duerte primò: curandarum pustularum oris præcepta. Quas Græci apthas, Arabes alcola (*boca danadi*) appellamus. Primum: si leuia sint vlcera non errodentia, illinantur cum rosacea infusi corticis bugie, vel illiniatur ex rosaceo, & amylo, vel ex puluere dragacanthi, & gummi arabici in syrupo rosaceo. Si verò sola sit excoriatio optimus est puluis ligni putrefacti, caries (*cauncho*) consolidans autem in vlcere non profundo ita paretur. ℞. gallæ ʒ. j. rosaceæ ʒ. vj. aceti ʒ. ij. ad consumptionem liij. partis, cum quorū os colluatur. Validius rasura pergameni, aluminis, gallarum aqua ʒ. j. in st. si vini maneant ʒ. viij.

Secundum: in causa calida conuenit præcedere phlebotomiam cephalicā, & scarificationem sub mento, vbi in collo. In frigida autem præcedant cochiae.

Tertium: si vlcera errodunt inungatur crebro, cum ægyptiaco in aqua plantaginis, mundato autem vlcere insper-

V

gatur



gatur puluere ex mastiche, thure, corallis, & in aurora colluatur os cum vino calido.

*De Gestatione, & alijs particularibus exercitijs, ex Orbasio lib. 6.*

23. & sequenti.

**P**ropositio prima: gestatio media est inter motum, & quietem singularium partium, estque æqualis exercitatio; quia non habet diuersitatem partium motarum à quiescentibus, & placidissima, quia nulla pars laborat in deferendo, sed omnes aque deferuntur. Præterea patitur omnem varietatem iuxta robur, & velocitatem gestantis, quare nihil minus magnis exercitijs operatur.

Secunda: in veteriosis inducit vigiliam, quia roborat corporis tenorem, cujus dissolutio torporem inducebat, in vigilantibus verò inducit somnum, quia eleuat vapores suaues soporiferos.

Tertia: ex speciebus gestationum leuissima est in lectica: perpulchra, gestandus est autem jacens, qui valde debilis est, vel febriens, sed non pernissimo spatio, nam aliquando id febrem excitat, sed longiusculo reliquis præstat sedentes gestari. Item veteriosis commodius est sedile non testum: In vehiculo (andas) vel curru vim habet emolliendi stabiles morbos propter varietatem motuum in ascensu, & descensu, similiter, ac nauigatio in tranquillo mari, nisi quod gestatio in vehiculo habet aerem minus aerem, & siccum. Quare longis morbis non aque commoda est, quæ verò peragitur in mari, potissima est ad morbos longos, propter contrarias, & vehementes mutationes, dummodo parum mouetur, modo vehemensissime, & velocissime, & modo animus securitate torpet, & modo timore turbatur, quare operationem efficit albi veratri. Æquitatio verò hoc habet deterius supra dictis, quod fatigat inguinem, si autem fiat per impulsim (de arremeco) laboriose concutit corpus, & est intensissima thoracis.



cis exercitatio. Quare requirit repentinam, & vehementem intentionem spiritus, sed ob distensionem septi valde roborat ventriculum, redditque sensoria propter contentionem multo purgatoria. Gestatioque in lectica, aut cathreda 1 die peragitur per stadia 8. & in sequenti tantundem, inde quotidie superaddantur stadia quinque; in vehiculo verò incipiat à 30. desinat in 60. qui naui peragitur incipiat à 60. desinat in 120. vbi autem intentio gestationis est prouocatio somni, vel sedatio doloris, terminus est ablatio symptomatis præter naturam. Complent autem 8. stadia miliarium vnum, perficiunt autem miliarium vnum iactus balistæ, sicut leucam nostram miliaria quatuor.

Quarta propositio: venatio terrestris ex Tacuino est immodica exercitatio, maxime insuetis, infrigidat, & siccatur. Quare qui conficiunt venationes, redduntur obnoxij morbis, piscatio verò infrigidat, & humectat.

Quinta propositio: ex eodem, & Oribasio citat. Lustratio commoda est solis validis, carnosiss, non aptis ad pthysim; efficit corpus musculosum, sed parua carnis, & firmæ, dissoluit pinguedinem, aquam inter cutem, & tumores omnes; ad lustram autem accedunt exercitia, quæ vocant vmbrailem pugnam, vbi cum vmbra certatur modo manibus, modo cruribus, modo calcibus. Præterea gesticulatio nisi quod hæc etiam imbecillioribus conuenit, & magis firmat humeros qui præcipue exercentur.

Sexta propositio: cursus vehemens exercitatione calefacit corpus, & firmat maxime ventriculum, sistit fluxiones, licet in initio magis videatur eas mouere. In affectibus autem renum, profluuiio seminis, & schyaticis, commodissimus: licet enim schyatici initio vix queant moueri, progredientes satis currunt; iuuantur autem valde omnes dicti propter discussionem materiæ intro contentæ, partim propter contentionem extra pellentem, sed caput ex retento spiritu repletur, & si sit operto corpore, mouet sudores, nudo verò densat carnes.

V ij

Septi-



Septima propositio: natatio perpetuo lædit caput, quia constituit pronum, calefacit, & firmat, & attenuat corpus propter contentionem motus, particulatim autem quæ in mari fit prodest scabiosis, elephantiacis, hydropicis; quæ autem in fluvio, nervos debilitat propter frigiditatem, & humiditatem aquæ, quare raro admittenda est, perpetuo autem corpus perungendum, & fricandum est, & repente insiliendo in aquam, ut ita præcalfacta cute, & ex immersione celeri densata non læditur.

Octava propositio: saltus differt ab exiliendo, nam exilire, est variare poplitem, & crurum articulos corpore eodem loco manente, quod tripudiantes faciunt. Saltus verò est violenta totius corporis ejaculatio. Prior potenter deturbat corporis excrementa, crura verò sufficienter olit, & roborat, nec thoraci incommodat. Saltus verò potentiùs pellit deorsum menses, uterum retractum, hæmorrhoidas, sed propter retentionem cohibiti spiritus thoracem concutit.

Nona propositio: pillæ ex Oribasio 3. & Galeno lib. proprio omnium est exactissima, & laudatissima exercitatio, cum in ea omnia, & singula membra omni genere, & motus, & quietis agitentur. Numerantur autem ejus tres species. Prima ubi ludens, vel ad parietem, vel ad socium jactat pillam unica contentione; qui motus stabilitate crura, & brachia dorsumque intro comprimit. Secunda præstantior, in qua per modicam distantiam ludentes coguntur intendere aciem, & progredi, & ad modum varie ad omnem differentiam positionis movere corpus, ne pillæ eludat capientes. Tertia, exercetur per longum intervallum grandi pillæ, cum copioso sudore, & motibus tum velocibus, tum validis, quare solis robustis juvenibus convenit.

Decima propositio: jactatio alter nobis ludus similis est (*ludum cum barra*) est incommoda capiti, & thoraci, propter magnum conatû in cohibito spiritu, atque ideo replet caput, & thoracem, sed naturalibus membris commodissima est, sufficienter



cienter calefacit, frigidum, & ascescentem ventriculum, & humeros, carnemque auget,

## CAPVT XXXIV.

*De Angina.*

Incipit cum in diglutiendo.

**A**Duerte primò: curanda anginae præcepta. Primum, requiritur in calida festinatio maxima, nam quandoque intra quartam horam perimit. Quare phlebotomia copiosa, & repetita, sequentibus scarificationibus dorsi, & sectione sub lingua, post phlebotomias lenitio, cum cassia, tamarindis, vel prunis ex cephalalgia sanguinea. Vel mannae ℥. j. rhabarbari ℥. ij. in ℥. vj. aqua buglosa, in quo tempore toto validis reprimentibus est gargarizandum.

Secundum: transacto principio, quod aliquando breuissime fit post dies tres, in frigida autem post multo plures, agendum est intro suppurantibus, ad quæ sequantur rumpentia simul, & extrahentia.

Tertium: postremo rumpendum est cum acuto ligno immisso per canulam, vel cum digito violenter impacto, & cum res desperata est aperiatur guttur inter duas cartilagineas ad respirationem, & sanata angina vlcus consolidetur.

*Remedia in angina.*

**P**Rimitur in initio calida. Succus pinici dulcis acidi gargarizetur. Vel rosacea infusi rhois, vel papauerini diamoronia ℥. s. rosacei ℥. iij. misce. In frigida autem diamoron, vel dianicum cum raceto.

Secundum: in angimento calida, lac gargarizetur, cui ad dioposet medalla cassia, vel mulla decoctarum caricarum, &

V iij

pas



passularum. In augmento autem radices ireos, hyssopi, adyanti aña m. glycerrisæ, passularum, caricarum, seminis lini, fœnu græci aña 3. β. mellis 3. ij. in aqua sufficienti redeat ad 3. viij.

Tertium rumpens; gargarizatio ex oximellite deuretico, & magis schyllino, cum decocto caricarum, & magis addito synapi, & salgema.

Quartum: vnguentum extrahens in calida, mucilaginis, seminis psyllij, & citoneorum aña 3. β. fermenti, caricarum aña 3. j. medula cassiæ, butiri sine sale aña 3. β. violacei 3. ij. In frigida autem dialthea 3. j. β. mucilaginis, fœnu græci, & seminis lini aña 3. β. fermenti, caricarum aña 3. j. amigdalini dulcis 3. ij.

Quintum: à tota substantia curat stercus canis sola offa palti, ex quo vulnerato insusetur gutturi, vel cum melle illinatur. Extra verò filum perfocata viperæ, & magis tinctum in murice circumdatum collo, vel caput viperæ collo appensum.

*De Somno, & vigilia.*

**P**ropositio prima: ex Oribasio lib. 6. cap. 4. & sequentibus, & Galeno 2. aphor. 1. somnus semper humectat, calorem innatum roborat, externum minuit. Quare in non febriente referto prauis, id est, crudis succis calefacit, in jam febriente refrigerat, videlicet quia cum innatus calor auctus per somnum, sit contrarius frigori, & calori lib. de tremore, & palp. 7. merito refrigerat extraneum calorem.

Propositio secunda: ex varietate partium aceffionis, & dici. Si in initio aceffionis, & augmento somnus lædit, non est lethale indicium, in declinatione verò si lædit lethale est. Nam in declinatione ex natura temporis iuuat; in reliquis verò temporibus, si quidem morbus est intermittens, dormiendum est in interuallo, quia scilicet voluit retrahere humorem fluentem ad mineram, ad faciendam aceffionem, ad vniuersam



nam eutem. Vigilia autem præstat in accessione; si verò accessio paulo longior est, status etiam, & declinatio accomodati sunt somno; incommoda verò sunt principium, & tempus antecedens principium: augmentum si breue est dormire potest, aut si incipit post mediam noctem, si longum maxime, si incidit per meridiem vigilandum est.

Ex horis verò diei naturalis, nox potissimum post horam tertiam accomodatissima est; dies vsque ad meridiem non incommodus. Vespera incommodissima. Causa præter alias videtur quia accedente sole ad nos roboratur innatus calor, & cum somnus proportionetur crisi propter coctionem, & pugnam, requiritur adiutorium cœlestis solis accedentis non recedentis.

Tertia: vigilia in duobus casibus maxime prodest, unus cum quaritur resolutio per halitum, & maxime ad minuendum ea quæ in ventre sunt. Trahit enim vigilia à ventre, sicut contra somnus retrahit ad ventrem, ideo statim à somno non famescimus. Alter casus ubi succi intro repunt, quod maxime accidit in crassis, & frigidis succis. Spiritus enim in tali abundantia extrameare non possunt, quare intro retenti augent crassitiem, & obstructionem eorum. Quare in talibus somnus malum est summum. Permittendi sunt tamen parum dormire, tum ad reparandas vires per vigiliam absumptas, tum ad coctionem humorum procurandam.

Quarta: ex probatis Auctoribus, matutinus retinet excrementa, quare non confert, nisi in his qui per noctem male coxerunt. Addit Celsus lib. 2. cap. 2. oportere tales, si hora matutina dormire non possunt, saltem in lecto quiescere, si necessitas cogit ad surgendum, ut peracto negotio redormiant. Meridianus verò nisi in gracili corpore, cum robusto capite laedit, non solum retinens, sed gignens de nouo excrementa, & catharticos, nervos amolliens, quia cum somnus omnis habeat noxam replendi capitis, & de conuerso vsunt coctionis promouenda, meridianus infert eam noxam validiorem, cum  
juuetur



iuuetur à calore diei ad replendum, & caret vtilitate, quia non habet tempus sufficiens coctionis integræ, quæ sola inanit caput. Nocturnus verò habet noxam paucam, vtilitatem multam, in studiosis verò ob lucubrationes antelucanas concedit idem Celsus longis diebus meridionari, quod si vigilia excessit, præcipit Auicena lib. de remouendis nocumentis tractu 6. odorare rosam, si somnus excessit odorare muschum.

## C A P I T U L U M XXXV.

*De Tussi.*

**A** Duerte primò: curandæ tussis præcepta. Primum in tussi etiam calida, actu frigida propter asperitatem, quam inducunt pectori, cauenda sunt; quare præcipit Ras. etiam cum aqua permisceri syrupum violaceum.

Secundum: si sequitur ad catharrum, sananda est curatio: ne catharri si verò ad calorem, vel frigiditatem alicuius partis, ea pars primum contrarijs curanda est, & emendanda.

Terrium: vbi molesta est somnum auferens, per opiata sananda est, & magis providendum tussi quæ pendet ab acri defluxu, vel vbi imminet periculum rupturæ.

*Remedia Tussis.*

**P**rimum: in calida, syrupus violaceus. Validius, syrupus iujubinus. Validius, papauerinis, & eo magis si in 3. iij. addatur pulueris dragacanthi 3. j. contineatque in ore contrauo bechicas, & frequenter amyllum in iure pulli, & dormiturus potet ciathum aquæ calidæ post penidiarum 3. j.

Secundum: purgatio sine custodia frequentanda, pulpæ cassiæ, vel manna. Validior est, si soluiatur in decocto pectorali, vt liquiritiæ additis 3. ij. dragacanti, vel R habarbari.

Tertium: vnguentum in calida mucilaginis dragacanthi, & gummi



& gummi arabici, assungia recentis, butyri sine sale, violacei  
& amigdalini ana cum pauco croco, & cera alba, vt fiat spara-  
drapum ex violaceo cum cera.

Quartum, in frigida tussi syrupus adyanthinus, validior  
de glysirisa. Validior de hysopo, potentiores sunt trochisci  
Rasis hic.

Quintum: purgatio sine custodia agarici 3. j. pulpæ cas-  
sia 3. j. vel jus galli veteris cum 3. β. carthami, fœniculi, pas-  
sularum vrticarum ana. Validior, purgatio est ex 3. j. & β. pil-  
lularum de agarico. Vel pulpæ cass. 3. vj. agarici 3. ij. cinamo-  
mi gr. x. cum saccharo.

Sextum: vnguentum dialtheæ, vel mucilaginis, fœnu græ-  
ci, seminis lini, adipis anserini, butyri recentis ana 3. β. mirrhæ  
3. iij. amigdalini 3. j. β. cum cera.

Septimum: in tussi non calida, carica, vel dactili pleni-  
cando, & asfi, item puluis mane sumptus ex cando, farinæ  
fabarum, glyserisæ ter in hebdomada jejuno mulsam potet.  
Quotidie fumat terebentinæ 3. j. jejunos. Validius, est loch  
de pino, siue celema ( *lambedor.* ) Validius loch sanum. Vali-  
dius loch de schylla.

Octauum: in antiqua molesta tussi auferente somnum,  
pillula j. aut duæ Rasis dormituro. Item suffiatur jejunos cō-  
tinuis diebus puluere Rasis hic, prasente pure in pectore, quo  
absente prastat per infundibulum ita suffiri. ℞. hysopi m. j.  
liquiritiæ, passularum ana 3. ij. seminis fœnu græci, & lini ana 3.  
j. & β. in tb. iij. aquæ ad dimidias.

*De Inanitione, & repletione.*

**P**ropositio prima: commodissimum est quotidie alui be-  
neficium. Nam lib. de aëre, & aqua, & 6. aphor. 33. qui  
aluum humidum habent, minime morbis corripuntur. Qua-  
re in omni valerudinario oportet non spectare.

Secundò: commoda & promouentia sunt clyster cōmu-  
nis,

X



nis, vel in siccitate intestinorum, ex oleo solum insulso ꝑ. de sanitat. 9. quia parat in postremum ad facilem dejectionem, supra autem in affectibus calidis conueniunt jus pulli, in quo coquantur malua, pruna, beta, mercurialis, collatum addito sacharo potetur hora vna ante cibum, vel pulpæ cassiæ ꝑ. j. anisi gran. x. cum sacharo fiat bollus sumendus eadem hora. Vel conserua alexandrinæ ꝑ. iij. supra potati seri ꝑ. iij.

In affectibus autem non calidis aloes ꝑ. ij. formentur pilula ij. sumenda mane; vel resinæ terebentinæ, aut larinæ optimæ drag. ij. in nebula madente, aut Rhabarbari dragma ꝑ. in vnica ꝑ. sachari rosacei.

## CAP V T XXXVI.

## De Asthmate.

**A**duerte primò: curandi asthmatis præcepta. Primum, si est à sanguine, phlebotomia basilicæ, & repetita. Si propter retentionem infernæ vacuationis, etiam crura secantur, & prouocetur assueta vacuatio. Si propter catharrum capiti prouideatur.

Secundum: in frequenti asthmate pituitoso, sanat in interuallis purgatorium, & vomitus frequens vsus commodus est, accommodat frequentatio vacuationis propter sedem pituitæ, in ventriculo, simul cum medicamentis pectoralibus attenuantibus, & abstergentibus iuxta 7. local. 6. sed repetita propter longitudinem morbi, post quæ sequantur suffitus siccantes residuum. Conferunt pulmones omnes, & dulcia præsertim, si habeant iunctam abstersionem.

## Remedia Asthmatis.

**P**rimum: vbi causa non valde frigida est, remedia tussis dicta. Item quotidie pulmo vulpis siccus ad ꝑ. ij. cum decocto cōmodo. Item punicum dulce parte superiore quadripartitò



partitò scindatur, & ablato meditalio membranoso repleatur cando, & inuolutum madente lyntheo sub cineribus affetur, fumantque grana eximie lenientia vocem, & pectus; item emplastrum imponatur pectori dactilorum, caricarum añā 3. ij. radicū maluæ, & altheæ añā 3. j. & β. post coctionem, tritis adde stercoris, terebentinæ añā 3. j. cum mucilagine fœnu graci, & seminis lini. Item ex 7. local. passulæ optimæ exacinatæ (sem bagulho) fœnu graci lotum coquantur in octupla aqua, vsque ad dissolutionem, collatum expressum quotidie calidum potetur addito sacharo, vel 3. j. syrupi violacei.

Secundum: in valde frigida valent remedia Rafis, & post purgationem suffitus tussis. Vel mane, & vesperi per dies quatuor, ita suffiatur, thuris, mastichis, sulfuris, lythargiri, sanguinis draconis, aluminis, picis añā cum albumine coeant, & immissa calamo ferulæ ad ignem, & prunas euaporent, à suffitu autem sumatur coclear mellis ad leniendam asperitatem.

Aduerte secundò: de affectibus animi immodici. Affectus multis mortem, plurimis morbos accerferunt. Nam 1. de sanis. 5. non paucos sanauit sola moderantia affectuum. Argumentum est, quod faminae zelotypæ perpetuo agrotant, quæquam primum habent viros beneuolentiores conualescunt. Nō secus qui paupertate, & mœrore quodam detinētur. Quod autem sollicitudo vitæ breuiet; ostēdunt curiales, & literati, quorū vita breuior est, quam mechanicorū, & ciuiū. Ex opposita verò ratione diuitijs oppulētī corripīūt arthritide, & apoplexia.

Secunda propositio: repentinus timor sæpe sanauit in morbis, in quibus sanguis impetuose ruit extrorsum, sicut grandis ira nonnunquam sanauit validas obstructions externas.

## CAPVT XXXVII.

### *De Pleuritide.*

**A**duerte primò: Primum, phlebotomia conuenit copiosa, tum quia locus affectus maximè obnoxius est plethoræ, propter vicinitatem duorū viscerū summe sanguineorū cordis,

X ij & he-



& hepatis. Qua de causa inter inflammationes internas pleuritis frequentissima est, tum quia sectio cubiti citissime trahit à pleura. Quod ergo legitur 6. epid. 3. ultimo pleuritim impedire venæ sectionem, commode explicandum est ex Galeno in com. Verum in pleureticis phlebotomia aut excusanda, aut parcissime exequenda est in casibus. Primus ubi pleuritis leuissima est, quales euenire solent, cum sputo subcruento de qua 6. epid. citat. Secundus, cum jungitur fluxio ventris, quo casu præcipit Tralianus, vt licet in alijs fluxibus non sit statim illis repugnandum, in pleuritide statim sistatur, quia debilitat citra vtilitatem, & creditur prouenire ex pure inflammationis communicato, cohibita autem alio per fomentum adstringens, statim sequatur phlebotomia. Tertius, si pleuritis sequitur ad alium morbum in quo præcessit sufficiens phlebotomia. Quartus, si pendet à mera cacochymia, cuius indicium est si post phlebotomiam symptomata non sedantur, & adhuc magis si sequitur dyspnea aut syncopis. Quintus, si expuitur sufficienter coctum, debilitatur enim per phlebotomiam vis naturalis ad expuendum.

Secundum: num fomenta debeant antecedere venæ sectionem variant Auctores. Nam Tralianus damnat medicos non prius fomentantes. Contra aut. m. docemur 4. continet. & à Matheo hic, postquam constat de vera pleuritide.

Dic: si constat de pleuritide vera, & de plenitudine corporis non est præponendum fomentum, quia replet, si verò enim constat de his ambobus, adhibendum, quia saepe excusat à plebotomia, etiam in vera pleuritide 2. acut. in initio, & 13. therap. 21. Nu. iquam in inflammationibus ante phlebotomiam vteris euaporante auxilio fidenter, id est certo, sed tentatiue ad iudicandum, num subsit plenitudo, nec ne: fomenta autem pro humoris varietate mutanda sunt. Tralianus autem ita commodè parat in biliosa ex sola calida, & decocto camomillæ. In pituitosa ex lana cum anethino calido. In sanguinea apponit sacculum ex millio. In melancholica imponit



nit facculum ex furfure in decocto camomelli. Adnotauit etiam Auicena, quod fomenta humida etiam si non iuuent, non nocent; sicca verò si nocent, magnifice nocent. Verum aliqua ex humidis etiam periculose adhibentur, vt decoctum in aceto, apud Hippocratem citat. Modus autem imponendi fomenti ex Hippocrate addiscendus, sicut numerus ex Galeno cap. de ophthalmia.

Tertium: vnde secundum est, ostensum est 3. thegni, quod fere à basilica affecta, ita vt non taret secundatio ex eodem vase. Si tamen in initio morbi, vel quod frequentius est in processu credimus humorem fluere non à solis partibus rectis, sed & ab aduersis, vel ab inferioribus, cuius indicium est, quod post aliquot sectiones affecta partis dolor non minuitur, secundum est ab aduersa, vel ab inferna.

Quantum autem ad mutationem vtriusque coloris, scribitur 2. acut. 11. vsque quo pro albo ruber est, scilicet explicante Galeno de sang. miss. 14. Per album intelligit minus rubentem. Cum enim sanguis mutatur in rubriorem, vel nigriorem, vel in magis variegatum priori sanguine, propter varietatem partium sanguinis putrentis, transpositus est iam sanguis noxius, qui continebatur in parte inflammata. Verum admonente Galeno citato, in vna missione rarissimò spectatur ea mutatio, quanto ergo minus nostro auro spectanda est, cum multo parcius mittatur sanguis. Colligitur, quod si non adest interna inflammatio, nec maligna putredo, sanguis primò extractus magis putret, quia innatus calor intus vigens extrorsum pellit extraneum. In casibus verò contrarijs posterior sanguis deterior est. Colligitur etiam cur putrens sanguis petat summum vasis, vel ob calorem languentem, & inde etiam est, quod in pelui non apparet putridus, sicut in vasculis, quia pars dispersa putrens latet.

Num autem albus sanguis, qui quandoque innatat sit putridus. Dic ex lib. de atra bile 2. Pituita abundans in vasis innatat in sanguine extracto. Agens enim calor extraneus in hu-

X iij

midum



midum, nigrefacit, si verò in subjectum siccum, albefacit, nam sanguis rubens actione calidi ignei albus reddi non potest. Accidit autem eam pituitam putrere, & tunc quo tempore innatat duplici nomine, & quia pituita, & quia putrens; pituita autem sua sponte innatat propter flatuum, copiam, initium enim coctionis multiplicat flatum, consumatio extinguit.

Quartum: de purgatione autem conueniunt lenientia sola, & si venter astrictus est, addi potest 3. β. Rhab. in ptyfana infusi, verum purgatio integra, non est exequenda 4. die iuxta Matheum hic, & 4. acut. 76. sed tradente Galeno in com. hic sicut in reliquis acutis, vel purgandum est in primo initio dum adhuc turgent humores, nec dum firmanur in parte, idque rarissime exequendum est iuxta 7. aphor. 24. & 2. acut. 10. vel declinante jam affectione, & remissa febre, quod præceptum in acutis omnibus exequendum est tanquam maximi momēti. Nam 13. meth. 19. non solum in febre continente, sed etiam in tertiana, prohibet purgationem, antequam febris aliquo pacto remittatur.

Quintum: summe cōmendatur diuersio ad partem extimam, per profundam scarificationem, & cucurbitam in loco dolente, apud Tralianum, & 4. continent. tanquam certissimū medicamentum, cum non est plenitudo in corpore. Nam humor trahitur à nobili ad ignobile, quia partes extimæ minus nervosæ sunt; tum quia non præmuntur à costis similiter internis. Gordonius putat esse curationem suspectam, quia si erratur, magnifice erratur. Vulgo apponuntur spatulis, vt sit diuersio paulo longiquior, & proinde securior, vbi non habetur certitudo de integra vacuatione totius. Conjectura autem integra vacuationis, apud Mes. est quod sint acti 8. dies morbi, apud Paul. & Auic. 14. sed conjecturale est.

Sextum: num repellentia conueniant in pleuritide. Nam Traliano in totum displicent. Auic. cū Mes. rarissime admittunt, videlicet cū vocamur in principio, si humor paucus est, & non fixus. Dic: triplex indicatio haberi potest ad applicanda repellentia in pectore inflammato.

Prima



Prima est à dignitate membri inflammati, juxta quam scribitur 11. meth. 17. pectus, & renes habere medium locum inter membra quæ requirunt perpetuam roborationem per adstringentia, & membra quæ illud non requirunt.

Altera indicatio sumitur à situ partium pectoris. Nam in affectibus pulmonis propter multam molem interpositam, adstringentia externa, magis replebunt pulmonem, in pectore verò ipso affecto parce concedit, scilicet ut subaudiatur. Quod si inflammatio occupat partes externas pectoris, conferent adstringentia externa; si verò occupat pleuram, præstat non adhiberi propter periculum ad interiora repellendi.

Est etiam tertia indicatio ad expectorandum humorem inflammantem, & ob has postremas duas indicationes præstat in inflammata pleura non imponi adstringentia.

#### Remedia Pleuritidis.

**P**rimum: emplastrum sedans dolorem. ℞. Radicis altheæ coctæ, & preparatæ ʒ. ij. florum camomillæ ʒ. j. farinæ hordei ʒ. iij. cum violaceo, & camomellino.

Secundum: fomentum ex decocto camomillæ, violarū, melilloti. Validior est si pro violis recipiat sænum græcum. Vnctio autem mitissima est ex violaceo, validior ex amigdalino calido. Validior ex vnguento pectorali. Validior vnctio tussis frigidæ, aut cerotum ex ea. *Malvas pizadas com unto, ou com mançiga crua, cabeças de macella, & farelos, feito disto emplastro, posto sobre a pontada. Ou folhas de violas, macella, coroa de rei cozidas, de ste cozimento molhem meada, ou fetro, apliquese.*

Tertium: expectorans in valido calore, mucilago psilij extracta in aqua buglosæ, cum pauco syrupo violaceo. Remissius est lac seminum frigidorum. Remissius ptylana. Remissius lac furfuris cum amigdalino, & penidijs.



*De Alimentis: ac primum de necessitate alimenti.*

**P**ropositio prima: cum constemus quatuor elementis, talia autem perpetuo dissipantur in mixtis, multo magis in viventibus, cum vita sit permansio calidi in humido, in lib. de morte, & multo magis in animalibus, actuali enim calore constant non potenciali, vt multa stirpium 3. simp. 6. & inter animalia non minimum homo, tum quia est animalium calidissimus 10. probl. 55. tum quia cutem habent tenuissimam, ideo dissolutioni aptissimam 3. de hist. 11. eguit necessario substitutione quatuor cōponentium, & terra quidem restituitur cibo, aqua potu, & ignis respiratione, & pulsu 1. de sanit. 3. in quo loco per potum intelligit cibum liquidum 7. aphor. 17. 2. libr. aqua non nutrit, licet possit connutrire 3. acut. 17. 4. aphor. 17.

Præterea intelligendum est omnia hæc ex omnibus ijs restitui, sed maiorem partem singulorum, ex certis scilicet solida, & spermatica magis ex solido alimento reparantur; carniformia autem magis ex liquido.

Nec obstat, quod scribitur 4. therap. 3. carnem reparari ex medio alimento solidi, & liquidi. Quia 1. de sanitat. dixit partem aqueam in nobis reparari liquido alimento, 11. autem meth. dixit carnem nostram restitui ex alimento medio solidi, & liquidi.

Nec obstat item, quod oportuerit ultra cibum, potum, aërem, parari quartum alimentum igni; quia cum intrus ardeat cor, quod motu perpetuo ex aëre citissime reparat ignem, pars aëris tracti per pulsum, & respirationem, seruit aëri resolutio, pars regenerando igni dissipato, non secus quam piscibus, ex eodem cordis calore parat perpetuam migrationem aquæ in aërem, vnde refrigeratur.

Secunda: quod autem horum sit magis necessarium. Dic singulata ita necessaria sunt, vt quouis ex toto deficiente pereat homo.



homo. Non enim potest constare, sine omnibus quattuor humoribus, & elementis, lib. de natura humana in initio, vincit tamen in perpetua necessitate respirandi ignis, deinde aer, aqua, & terra. Ratio est quia tenuia citius dissipantur, & vehementiorem calorem habent, & nisi substituantur, citius immutant hominem, quare respiratio plus potu, potus plus cibo necessarius est. Argumentum afferunt quod exeuntes carcere plus appetunt aerem liberum, deinde potum, tandem cibum; ideo etiam natura parauit igni, & aeri internis, copiosissimum alimentum. Continens enim idem praestat aeri, & igni, quod terra plantis.

Tertia: cujus ex his tribus malitia danosa plus sit. Dic, eodem ordine, nam quod citius, & magis immutat plus operatur quam quod tardius, & minus, & licet cibus plus in corpore morietur, magis praestat frequentia aliorum in alterando corpus in solido alimento. Adde quod illa duo accedunt ad corpus fere non mutata, alimentum vero mutatum. Item apparet morbos maxime lethales, & repentinos oriri ex aere prauo, deinde ex aqua praua, postremo ex malo cibo. Sicut conuerso nihil potentius expugnat morbos diuturnos comodo aere 6. epid. sect. 2. com. 20. Item maxime immutatio regionum ex varietate climatum oritur, minor ex varietate aquarum; adhuc minor ex varietate alimenti. Addit rationem particularem, cur aqua malitia plus obsit, quam cibi, Aristotel. 1. probl. 14. Quia plus sumitur aqua quam alimenti. Quod tamen idem Auctor scribit probl. 13. mutationem aquarum magis cauendam esse quam aeris, vniuersaliter recipiendum est. Nam si conferatur mutatio inter extremos aeres magis noxia est, quam mutatio inter extremas aquas & malitia extrema aeris pestilentior est, quam aqua, nam 8. de hist. 19. pisces non patiuntur pestem, Indus vero si permutetur ad Sclauoniam, aut infirmabitur, aut morietur, Auic. 1. 1. de complexionibus, in prauo tamen tractu terrae, vulgo recte magis timetur mutatio aquarum, quam aeris. Causa est quia in prauo intervallo terrae aeris mutatio non est insignis, sequitur enim varietatem coeli, cujus comparatione tota terra punctum est. Aquarum autem

Y

di.



diuersitas in paruo interuallo terræ, immo in vno oppido potest esse insignis, quia oriuntur à partibus terræ distantissimis in substantia, & temperamento.

## CAPVT XXXVIII.

## De Hæmoptoisi.

Incipit cum sanguis, &c.

**A**duerte primò: curandæ hæmoptoisis præcepta. Primum si procedit à palato, vel gutture, vel cerebro fere salua est, sanatur adstringentibus, gargarizationibus ex cap. de angina, & prouidendum est membro mandanti phlebotomijs cephalicæ, & sanguis tenui victu minuendus.

Secundum: si procedit ex naribus, cautius agendum est, nam sæpe est criticus, vel peryodicus, sanans multos morbos, talis nullo pacto sistendus est, vbi verò excesserit, sistendus est per adstringentia, & secanda est vena communicans parti mandanti.

Tertium: in sistendo sanguine spiritualium, primo tenuis victus imperandus est, ita vt per totum diem naturalem abstineat, in sequentibus parcissime edat. Varianda est ergo ratio medicamentorum iuxta varietatem 7. local. 4. Nam si causa creditur ebullitio sanguinis, infrigidantia sanant; si apertio osculorum, adstringentibus perficitur. Si ruptura vasis, validius adstringentia simul, & glutinantia. Si verò erosio, narcotica sanant, & cibi euechymi perpurcato corpore, in omnibus tamen medicamentis thoracis adstringentibus oportet permisceri aliquid calidi attenuantis, ob distantie longitudinem, quod affectus naturalium membrorum non requirunt. Sanguis autem extrahatur modo parce, modo abundanter, & cacochymia si adest purgetur similiter, vt in hæmorrhagia narium.

Quartum



Quartum: hamoptoisi obnoxij, quod Celsus docuit vniuersaliter lib. 2. cap. 2. quam primum plenitudinis initium senserint, statim sibi sanguinem mittant, & praterca se temperent à multo esu carniū, præsertim pectorum galinarum, ex Traliano, & ab inducentibus ebullitionem sanguinis, siue internis, siue externis. Adstringentia autem externa in hamorrhagia pectoris parce conueniunt, in hamorrhagia pulmonum nullo pacto lib. de const. art. 17.

*Remedia.*

**P**rimum: expurgans bilem apperientem vasa. ℞. pulpæ tamarindorum ʒ. vj. Rhab. ʒ. j. cum saccharo, vel mirabol. citrinorum contractorum ʒ. j. tamarindorum, prunorum añā ʒ. ʒ. j. j. j. coquantur ad tertias, collato expresso adde syrup. viol. ʒ. ij. Si verò sit causa hamoptoisis plurimum ferum sanguinis, loco Rhab. substituatur agaricus. Vel in multa coquantur chebulorum ʒ. ʒ. collato adde succi ireos defaecati ʒ. iij.

Secundum: restringens feruorem. Continuo deglutiat succum portulacæ, & hypocistidas, sileat, quiescat iunctis infernis artubus, sumatque quotidie trochiscorum de terra sigillata: Vel validius de charabe ʒ. j. syrupi mirtini, & adyantina añā ʒ. j. ʒ. Vel conseruæ rosarum ʒ. j. tragachanti, gummi arabici, balaustiarum, cornu ceruini añā ʒ. j. cum syrupo citoneorum.

In valido autem feruore sumantur mucilagines psylij, syrupi papauerini añā ʒ. ij. hæmatitis lotæ, cum aqua plantaginis ʒ. j. Vel feminis hyosciami albi ʒ. j. & succi plantag. ʒ. ʒ.

Vbi autem calor non vrget. Radicum symphiti majoris contusarum ʒ. ʒ. in aqua cisternæ ferrata, aquæ plantaginis, aquæ portulacæ añā ʒ. ij. coquantur ad tertias, addito amyli, gummi arabici añā ʒ. j. sumat mane ʒ. v. frigidas cum ʒ. j. syrupi myrtini, & ad vesperam tantundem.

Y ij

Ter-



Tertium : sedata hæmorrhagia emundans frequentandum in aurora mēdice calidi. Ptyſanæ optimæ ꝑ. iij. lactis ſeminum frigidorum ꝑ. ij. ſachari ꝑ. j. in diebus continuis. Facilitans autem ſputum in ſalſo humore eſt ſyrupus violaceus. Vel validius papauerinus ꝑ. iij. pulueris dragacanthi frigidi ꝑ. j. & ſ. ſucci liquiritiæ ſeminum cottoneorum añā ꝑ. ʒ. ʒ.

*De Quantitate alimenti.*

**P**rimum : ſanitas conſtat duobus cardinibus , altero re-  
plente , altero vacuante, Hippocrates lib. de dietis. Tunc  
enim præſtat ſanitas quādiu, reſpondent ſibi mutuo hæc duo  
proportione. Nam quia alimentum neceſſarium eſt ex pro-  
poſitione priori, & nullum alimentum vacat excrementis, cū  
non habeat hominis ſubſtantiam, requiritur ad ſanitatem exer-  
citium reſpondens proportionē copię recrementorum, ſere  
autem ſolent peccare in cibo per nimietatem, in exercitio per  
parcitatem, propter hominum ſegnitiem, juxta Hippocratem  
6. epid. 4. tex. 22. Exceditur autem magis in copia alimenti  
in hominibus ſere, & ſuibus. Cujus cauſa videtur ultra paulo  
ante explicata de copia caloris, & tenuitate cutis, immodicus  
appus conſeſſus à natura hiſ animalibus ; ſuibus quidem ob  
eſitatem, quam natura illis dicauit. Hominibus verò ob co-  
piam ſpirituum ad animi opera. Quare plurima attractione  
alimenti pollent, ſicut pueri, & conualeſcentes.

Secunda propoſitio: inter exceſſus deteriorene ſit in cibo  
quam in potu. Dic in potu, apud Celſum lib. 1. cap. 2. ſiue quia  
homo inter animalia plurimum potat 1. probl. 55. ſiue quia hu-  
midum non moratur, quare non bene coquitur ; ſiue quia in-  
temperantiæ in potu ſolent eſſe majores, eo quod non ita gra-  
nat potus ſicut cibus; ſiue quia interponitur pauco alimento.  
Quare alimentum fluctuat, & non coquitur; ſiue quia cogitur  
distribuī alimentum ante coctionem. Quare locum Celſi (&  
ſi male) corruptum eſſe arbitrantur, victus autem delicatis, &  
otio-



otiosis replet corpus crassis succis 2. de fract. 27. inedia autem repentina, edit carnes mucolas, artificiosa verò siccas 1. de art. 30.

Tertia propositio: quantitas alimēti moderata, est qua responderet calori innato, demptis his quibus imminet periculum plethoræ 1. aphor. 15. Nam primo de causis morb. 3. sicut ligna oportet respondere proportionem igni, ita alimentum quantitati caloris nostri. Si enim fuerit amplius alimentum, quantumvis natura calidum refrigerat per suffocationem, ut vinum. Sola enim temperata quantitas excalefacit, quamvis natura frigida sit, ut lactuca 3. de temp. 4.

Verum hæc consideratio sufficit ad inveniendam quantitatem alimenti in homine sano, nam in agris, non est exhibendum, quantum conficere possunt, cum ex alimento imminerant mala in agris, sed exhibendum, quam minimum possint durare, usque ad statum, quod cum minima noxa possunt conficere, juxta quod scribitur 3. de sanit. 12. minus alimenti dandum esse, vel quia non eget, vel quia non coquitur.

Quarta propositio: signum modicæ quantitatis est, ut accedat prope ad saturitatem, remanentibus famis reliquijs, quæ post horam unam consumantur 3. 1. doctrina 2. cap. 7. consumuntur autem, ex fumis replentibus, ob calorem ebullientem in alimento, sicut ollam ad ignem non oportet apponi plenam, vel etiam quia incipiente ventriculo coquere alimentum, remittit pristinum chylum meseraicis. Quare fames ex toto cessat. Addit Avicenna citat. indicium ejus moderantia. Edendum est igitur quandiu non accedit magnitudo pulsus, & paruitas respirationis, cum qua sententia recipiendus non est simpliciter. Videturque delusus ex lib. de usu pulsuum in materia. Vera autem sententia colligenda est, ex 3. de causis puls. 16. Quod moderata cibatio reddit pulsus magnos, & aequales; immodica autem efficit pulsus inæquales, & respirationem parvam.



## CAPVT XXXIX.

## De Pthysi.

**A**duerte primò: de tabidorum curatione præcepta. Primum: lactis potio inter vlcerum remedia maxime pulmonis commodatissima est, ob causas vulgatas, modo obseruentur in ea tradita à Galeno 7. therap. 6. & ab Oribas. 4. comp. 4. & à Constantino, & Mesue cap. de pthysi. Primum sit lac mulieris, aut asinæ, aut saltem capræ sanæ exercitatæ, in excelso passæ stirpibus exsiccantibus.

Secundò: fugatur in vbere, aut saltem excipiatur in olla opperta lyntheco, aqua calens effundatur, & quæ intra vas aqua plenum locetur, emulgaturque supra sacharum pulueratum, & emuletum statim sorbeatur, prius tamen exsuffata spuma.

Tertiò: quandiu moratur in ventriculo, fugiat vinum, seu coagulans, ideo etiam pueris interdicitur, nec aliud alimentum illis permittitur, machinandusque est citus descensus à ventriculo, ad quod benefacit, vt post sumptionem vigilent, aut deambulent, non tamen laborent.

Quartò: eo descendente potest aliud supra potari, & rursus tertium si tollerent. Operatur autem lac primum euacuationem eorum quæ in ventre, & intestinis contineatur, post modum ad vasa means optimè alit, nec amplius deicitur; incipiendumque est ab 3. iij. addendo quotidie 3. j. vsque ad vi. Quod si propter dictorum incuriam, ace scat, aut corrumpatur, aut concre scat, nocentissimum euadit.

Quintò: oportet vt non iungatur aliquod impedimentum ex relatis 5. aphor. 64. capitis imbecillitas, fluxus biliosus, febris magna, illia murmurantia sitis: verum in catarrho obest lac in initio, nam posterius caprinum maturat catarrhos 2. canon. In febre autem ardenti exhiberi potest, si prius  
extra-



extrahatur butyrum, deinde permittatur in aëre temperato nocte una, mane autem eo agitato auferatur spuma, & exhibeatur, quandiu intentio est emundare vlcus incipiendo ab ℥. iij. lactis cum ℥. j. biscocti panis, paulatim minuendo biscoctum, vsquequo solum lac detur. Emundato autem vlcere, cum intentio est consolidare, incipiat permisceri biscoctum, vsquequo solum biscoctum detur, memorantes ex 10. continent. cap. de pthysi, quod antiqua vlcera pulmonis indigent exsicari, à lacte autem laduntur.

Secunda propositio: num euacuationes conferant, dissident Auctores, nam Mesues cum Auicena concedit repetitas phlebotomias, & lenes purgationes, Rasis verò non meminit phlebotomiæ, & aperte prohibet purgationem. Dic, in initio quando adhuc intentio ad causam præpolleret, nec vlcus valde impressit, sicut in reliquis vlceribus conuenit vacuatio humoris prohibentis consolidationem, maxime cum in pthysi propter paucam eurentationem calidi innati humores videntur, quod ostendit membrorum innutritio, & pillorum casus. Verum intentione vlceris facti dixit Actuarius 3. meth. 18. in omnibus febribus comòdam esse aluum mollem, deimpis his quibus iungitur aliquid purulentum gratia inflammationis, vel vlceris, vt pleuritis, pthysis, exanthemata. Quare fere fluxus spontaneus in pthysi prauus est. Verum artificiales purgationes, ex capite de pleuritide initio pthysis conferunt.

Tertium: balnea licet hic simpliciter commendentur, apud Mesuem exactius adhibita antè declinationem perniciofa sunt, mouentia prauas materias per corpus, & debilitantia. In declinatione verò conueniunt iuxta modum à Mesue præceptum.

Quartum: cum vlcus requirat mundificationem simul, & consolidationem, possunt quidem ambo simul perfici, sed multo præstat, vt per dies intendatur soli abstersioni, post succedat consolidatio, ita tamen vt inter consolidandum redeatur,



deatur, & 2. & 3. ad interponenda abstergentia ubi res exigit.

Quintum: sacharum rosaceum experimentis Auctorum frequentissimum sanauit etiam deploratos. Verum oportet ex Mesue, ut procedat etiam abstersio sufficiens, præterea copiosissime exhibeatur. Nam Auic. non audet dicere quantitatem, quam sumpsit mulier, quæ desperata euasit. Herculanus verò memorat aliam similiter sanatam dedisse lib. 4.

Sextum: ubi vera curatio non speratur, paulatina exequenda est, scilicet ut præcedente aliqua absterfione continentur valida exsiccantia, scilicet abstineat ab omni humido, qualia lac, & res coctæ. Præterea crebro vtatur phylononio persico ad ʒ. ij. Præterea sacharo rosaceo, cum tragacantho, & bollo armeno, pulmone vulpino, cum trochiscis de charabe, & syrupo mirtino. Suffitu ex bollo armeno calefacto irrorato cum rosacea, & vino albo, post quem adhibeatur suffitus asthmaticorum.

*Remedia.*

**P**rimum: mundificantia: syrupus adyanthi, hyssopi, jus ciccerum, lac, puluis dragacanthi cum melle. Loch de pulmone vulpis. Item ellectuarium album de radice ireos recentis infusæ, per noctem in syrupo rosaceo ʒ. ij. dragacanthi ʒ. j. candi, penidiarum ana ʒ. j. ʒ. sachari lb. j.

Secundum: consolidantia: sacharum rosaceum etiam, cū omni alimento, & phylonij persici ʒ. ij. Herculanus memorat exhibuisse se cuidam, ad sedandum dolorem ʒ. ij. & cum non profecisset exhibuisse iij.

Tertium: alentia: oua testudinum fluuiialium in iure gallinæ exhibita, vel intra gallinam missa. Item ejusdem testudinis caro prius lixiuio lauetur ad odoris ablationem, deinde in rosacea, coquaturque cum ordeo, & ex ea tusa, cum amigdalibus, & sacharo fiant formulæ. Item aqua coclearum stilaritia, & cocleæ ipsæ, Alit autem, & consolidat simul jus quotidie mane



mane sumptum. Scilicet pulla impleatur sacharo rosaceo, deinde usque ad dissolutionem coquatur teraturque, & colletur.

*De Qualitatibus alimentorum.*

**H**Æ sunt temperamentum, succi probitas, vel malitia, crassities aut tenuitas, facilitas aut difficultas, in coquendo aut conficiendo, multa, aut parua alitio, & rursus velox, aut tarda juxta respectus ad quadam membra, aut juuandi, aut lædendi.

Propositio prima: de temperamento in alimento, quatenus alimentum non consideratur temperamentum. Nam quatenus tale, omne quod vere est alimentum, & non nomine tenus, excalefacit, quia reddit hominem quantitatie calidiorem, quam præerat 3. de temp. 4. augendo parte crassa sanguinem, tenui autem spiritum, licet qualitate inducta in membrum, quam operationem non habet, ut alimentum, sed propter vim medicamentosam secum permixtam, sæpe alterat corpus varie, neque id negavit Galenus citatus asserens omnia alimenta, & quomodocumque temperata similiter augere calorem innatum. Agebat enim ibi solum de augmento quantitativo conuenienti alimento, ut alimentum est. Nam quod ex lactuca gignatur sanguis, & caro frigidior præexistente, & ex capre calidior, affirmavit 6. epid. sect. 5. text. 35. ex professo, aliter enim corpora non reducerentur per alimenta opposita suis intemperantijs. Ideo temperamenta alimentorum nullibi Galenus tractat lib. de alimentis, sed in lib. simplic. quæ agunt de medicamentis. Quod Hyeremias non aduertens 3. de temperamento citat incusauit Galenum.

Secunda propositio: de cibi, & succi probitate, & malitia. Habent cibi omnes quo lædant, & quo juuent, nisi quod quidam occulte, quidam manifeste, sicut enim in medicamentis, sic in alimentis difficillimum est re-

Z

perire



reperire aliquod, quod cum plurimum proſit, nihil tamen obſit 3. acut. de oximellite, & 1. epid. ſect. 2. tex. 30. Agnoſcitur autem leuitas, aut grauitas alimenti, ſicut & aqua, ex Hippocrate lib. de affectionibus, ita quod modice ingeſtum nec diu tetinetur, nec noxam aliquam infert, non ruſtum, non flatum, non dolorem, leue eſt, quod ſecus graue. Alimenta ergo boni ſucci ſunt, quæ ſanguinem pro quarto humore plurimum augent, lib. de cacochymia in initio, & 2. aliment. de lactuca. Cauſa eſt quia 6. epid. 4. tex. 28. ſanguis quando educitur de tota maſſa, appellatur malus, vel bonus, & varie coloratus,

De quarta autem ſubſtantia malus dici non poteſt, nec aliter coloratus, quam ruber. Quod autem lib. de plenit. in fine dixit, quartam ſubſtantiam per ſe ſolam poſſe reducere per malum colorem, & per quamuis intemperiem, non pugnat præcedentibus, quia ſanguis ſolus poteſt reddi intemperatus, vel male coloratus, cæterum malitiei nomen non poteſt habere, vel non rubri quandiu ſanguis manet. Alia autem prauī ſucci ſunt alimenta differentia ſpeciebus, iuxta varietatem cacochymia, quam gignunt. Quædam enim aſſeruant bilem flauam, alia atram, nonnulla pituitam, quædam aquam; ſerum autem ſeparatur ab aqua 1. de ſanitat. 13. vt videlicet alterum horum ſit excrementum ſecundæ coctionis, alterum tertiæ, quædam autem alimenta omnem cacochymiam, & vocantur excrementitia, apud Oribiſ. de confectione ciborum.

Tertia propoſitio: de craſſitie ſucci, & tenuitate. Vocatur tenuans alimentum, quod non gignit craſſum, nec lentum ſuccum, magis verò attenuat craſſitiem in vaſis reperimentam, & impedit lentorem, eſt que maximè huius viſus vſus. Nam diuturni morbi plurimi, contemnentes vniuerſa medicamenta, ſolo viſtu tenuante ſanati ſunt. Quo circa dicauit illi Gallenus peculiarem librum in initio de viſtu attenuante. Quod ergo attinet ad ſalubrem viſtus rationem. Ex hominibus; quidam minus, quidam integre exercentur. Qui integre



gre exercentur, commodè sumunt etiam crebro crassa alimēta. Qui verò minus exercentur, oportet vt in totum ab illis abstineant, vtantur verò his quæ gignunt succum moderatum in tenuitate, aut crassitie, aut etiam absolute victu tenuante. Qui verò nihil exercentur, solo victu tenuante contenti sint. Præterea hæc duo postrema gratia hominum ex lib. de euchymia 2. vltra parcitatem dictam, requirunt per intervalla medicamentum attenuans, vel etiam vacationem.

Nec obstat, quod lib. de sang. miss. 7. legitur intemperantes non esse vacuandos, tales autem cum non leuiter exercentur, intemperantes sunt. Solum enim significat Galenus in intemperantibus non sufficere, ad præcauendos morbos vniuersales vacationes; quare vel non sunt illis admouenda manus medicæ, vel non sine prædictione.

Quod attinet ad cibos mali succi, oportet ex lib. de Euchymia 13. vt in totum ab illis abstineant, non modo hæc duo postrema genera hominum, sed etiam hi qui integre exercentur, si modo sui juris sunt, nam tales non valde timent necessitates mutandæ consuetudinis. Quare quod Celsus scribit in initio, tales nullum genus cibi vitare debere, quo populus vtatur, & quod scribitur lib. de aëre, & aqua, sanum hominem præsentia aqua vti debere, nullam diligendo, non sunt consilia ex toto sequenda, licet verum sit eos qui integre exercentur, sine vllò incommodo attingere nonnunquam cibos cacochemicos lib. de euchymia 2. & 3. Verum non ideo decipiantur, quia in præsentia noxam non sentiunt, tractu enim temporis sentient. Nec item imitandi sunt tales ab ijs, qui non integre exercentur, experimur enim eundem hominem quandiu exercetur non lædi alimento, à quo postea vehementer offenditur, lib. de euchymia 13. & 2. de aliment. facult. cap. de cucumeribus, & ex Auicena 3. 1. doctrina 2. cap. 7.

Quarta propositio: substantiales qualitates alimentorum sunt multum nutrire, tarde nutrire, difficulter concoqui, non tamen eadem sunt, sicut nec eorum contraria, nam multa

Z ij      alitio



alitis sequitur familiaritatem succi cum natura humana. Difficultas coctionis sequitur difficultatem transmutationis, vel simpliciter, ut siliqua, vel in ordinem ad nativum calorem, ut fungi qui licet laxissimi deijciuntur tamen incocti. Cito autem nutrire convertitur cum facili coctione, quod enim facile coquitur, & distribuitur, cito nutrit, quod difficulter, tarde 2. aphor. 18. facilis autem coctio cum pauca alitione ita se habet. Omne quod facile coquitur parum alit, Hippocrates lib. de aliment. non tamen è conuerso, omne quod parum alit facile coquitur, nam & siliqua, & nux indica, cum parum alant, difficulter tamen concoquuntur; sic etiam difficulter concoquere ad multum alere se habent, quod enim multum alit, difficulter coquitur 7. therap. 1. quia multa alitio præter lentorem, vel crassitiem humidi repositi requirit similitudinem ad corpus humanum; non tamen è conuerso, omne quod difficulter coquitur, multum alit, ob instantias dictas.

Quod tamen vulgo conceditur ex 2. 1. doctrina 2. cap. 15. luteos molles, vinum, lac multum alere, non est simpliciter recipiendum, facile enim coquuntur, sed tantum collatione ad alia similis coctionis; sunt tamen bene, & velociter alentia.

Cur autem nihil valde nutriens citò coquitur, causa est, quia calor innatus sicut & extraneus, non alitur humido aqueo, quod opponitur igni vtrique qualitate, sed aereo facile inflammabili, & ad durationem plurimum permixto aqueo, & terreo, unde euadit lentum, & crassum. Indicium est quod suila caro, & furmenta participant humido, etiam ad tactum lento, & pingui, qualia sunt igni externo cera, & oleum, lentum ergo, & crassum oportet esse quod multum alit, tale autem difficulter alteratur.

Quinta propositio: est & peculiaris alimenti qualitas, quod certum membrum, aut offendat, aut iuuet; idque nonnunquam



quam ex manifesta vi, nonnunquam ex mirabili aliqua proprietate homini incognita, sicut amuleta, & appensa 2. local. 2. Inuestigandæque sunt priores illæ qualitates ratione, posteriores solo experimento, & sicut reperiuntur hæ familiaritates, & inimicitia inter alimenta, & partes corporis, ita & inter alimentum, & certum hominem. Quo fit ut alimenta sua natura optima, tali homini pessima, & è conuerso, de quibus determinatur 4. ad Almanf. 4. & 2. aliment. de cucumeribus, quod alimentum quantumuis bonum, si huic peculiariter est noxium, est fugiendum; si autem vniuersaliter reprobum est, & huic peculiariter est experientia cognitum, & suspectum habendum est, nec nisi raro concedendum.

## CAPVT XXXX.

*De Cardiaca.*

**A**duerte primò: curandæ cardiacæ præcepta. Primum, in morbis cordis necessaria est phlebotomia sæpe, cum ibi sit fons sanguinis, & visibiliter morbi ejus depēdeant ab eo. Si ergo sanguis est causa, fiat magis frequenter, quam copiose, propter membri nobilitatem; si tamen timetur inflammatio, vel ebullitio sanguinis in corde, semel exauriatur ꝑ. j. & β. Si tamen causa est melancholica, ut plurimum mixta est sanguini; in pituita verò magis conuenit vomitorium, agaricus, elephangina, sicut in biliosa elect. rosatum, & Rhubarbar. Verum etiam in his duabus cacochymijs, si creditur permixtus sanguis, præstat ut præcedat parua phlebotomia à dextra basilica. In vaporosa à sinistra, ait Auicena: scilicet quia sanguis sinistri ventriculi magis vaporosus est; verumtamen vitentur vacuationes, quoad fieri potest in accessione, procedaturque solis diuerrentibus, & si timetur inflammatio præstat vacuare cum leniente, quam cum exolvente.

Z iij      Sc.



Secundum: roboratio cordis semper intendenda est per odorata, & alterantia, ita ut intemperamentum frigidum per calidum emendetur, sed calidum per frigida, quibus permisceatur parum calidi, partim ut deducat medicamentum ad cor, partim ne spiritus qui solis calorificis roborantur, ex mera frigiditate deficient, unde acufantur qui ex trochiscis camphoratis dempserunt crocum.

Tertium: considerandum item est, num causa cardiacæ sit immaterialis, & cauenda sunt vacuantia, aut immodicus sensus cordis, & hebetandus est alimentis crassi, & lenti succi, & humectantibus, ut lacte, & narcoticis.

*Remedia.*

**P**rimum: syrupus in calida, de acido citri, de pomis, rosaceus. Validior nenupharinus. Aquæ autem sunt acetosæ, rosarum, lupulorum, endiuæ.

Secundum: syrupus in frigida, de cortice citri, de bysantijs, borraginis, fabor, de buglosa compositus. Aquæ autem sunt buglosæ, milissæ, fœniculi, naphæ, vel exhibeantur aquæ stilatitiæ cum sacharo.

Tertium: electuarium in calida sunt diamargaritum frigidum, vel corallorum, perlarum, hyacintorum, smaragdorum aña, dentur sape. In frigida autem diamoschum, diambra, præciosum est alchermes. In causa autem mixta permisceantur utrique pulueres in sacharo soluto in rosacea, fiantque rotulæ.

Quartum: epythemata in calida, ℞. rosarum, acetosæ, nymphae aña ʒ. ij. aceti ʒ. j. vini odoriferi ʒ. ʒ. In frigida florum borragin. buglosæ aña ʒ. j. melissa roris marini, ocy-mi, ligni aloes, zedoariæ, doronici, gariophylorum, cynamomi, nucis myristicæ, corticum citri aña ʒ. ʒ. ambræ, moschi aña gran. iij. vini maluatici ʒ. j. aquæ buglosæ, & melissæ aña ʒ. iij. aceti ʒ. ʒ. occupentque liquores bonam  
pectoris



pectoris partem, & ex eisdem simplicibus ablatis liquoribus formentur sacculi.

*De Ordine sumendi alimenta.*

**P**ropositio prima: reprobantur summo opere alimēta variarum facultatum simul sumpta, siue ea compositio sit à natura, siue ab arte, tum alibi, tum 1. acut. 18. Cum enim alia accelerent exire, alia tardent, & remorentur exitum, sequitur turbatio ventriculi inquietans humorem: item cum sint varia in difficultate coctionis, aliud corrumpitur, aliud verò exit incoctum, proponit exemplum de naturali mixtione, in lente, & brasica simul cum jure sumptis, vnde intelligitur incommodè ambo misceri.

In artificialibus proponit. Vbi sumitur cerebrum, vel oua cum sale, aut melle, subaudiendum est oua esse dura, & mel, aut salita plurima, mel enim, & salsa exire festinantur, cerebrum autem, & oua dura morantur, similiter inquit, & iura plurima. Causa est, quia jungitur ibi aqueum, quod facile labitur cum pingui innatante, & morante, quo nomine offae in jure pingui, vel etiam in butyro, aut oleo turbat, maximè si supra potatur. Iura verò bonarum carniū, cum pauco pingui plurimum permixto laudantur. In regimine Salernitano:

*Oua recentia, vina rubentia, pingua iura.*

Ob eandem causam varietatis, apud Plutarchum in problemat. difficillime coquuntur, & in farcimina, & acetaria turbant ventriculum, & inducunt cholera similiter, & extra alimentum, apparatus coquorum reprobatur 2. de alimentis. Sape enim populi vno edulio vrentes, diutius, & salubrius viuunt, maximè si non est caro, & adhuc magis si nec pisces, vt Iapones, & Galenus 6. de sanitat. 8. ad prandium panem sine obsonio sumebat, ad canam addens obsonium exemplo athletarum, sic vina mixta vomitum mouent, & aquarum mixtio pessima



lima est, apud Serasim 3. 1. 8. Argumento sunt etiam morbi in-  
numeri diuitum, ex optimis suis varietatibus, & salubritas ru-  
sticorum, & mechanicorum ex victu simplici, licet prauo. Ar-  
gumento etiam est optima nutritio pueri solo lacte aliti.  
Monstrat autem experientia perniciosam esse quandoque  
permixtionem ex duobus generibus lactis. Nam ultra causas  
dictas ex varijs alimentis, plus sumitur 3. 1. doctrina 2. cap. 7.  
Nec obstat, quod varietas est suauior, quia in assuetis, sim-  
plex victus non est insuauis, & suauitate prapollent noxæ  
dictæ.

Secunda propositio: quod Galenus citat. vsum Athletarum  
sumentium ad prandium solum panem, ad cænam autem  
carnem vulgo interpretantur, quasi in cæna solam carnem  
sumerent, qui sensus non videtur recipiendus, ait enim fuisse  
id vulgare suo tempore, & se quoque id imitatum esse,  
qui tantum sumebat ad cænam panem cum carne. Auicena  
3. 1. cit. citat ex eo athletas solitos fuisse ad prandium sume-  
re solam carnem, ad cænam solum panem, in quo ultra prauam  
interpretationem lapsu memoria præuertit citatam sen-  
tentiam, quod alibi quandoque commisit, vt de partitione  
cibi in epilepticis, & de bonitate aquæ 2. 1. cap. 16. Secunda,  
quod hyeme sit frigida, æstate calida, & de initio morbi in  
parturientibus computando 2. 4. tractatu 2. cap. 1. & de ele-  
ctione sagapeni, juxta Diosc. quod sit intrus album, foris ful-  
uum, peruertit Auicena 2. can. & quod refert Auicena 1. simp.  
de ventriculo gallinarum, ex Galeno 13. 3. de debilitate di-  
gestionis, & Mesereon pellem intrinsecam gullinæ roborare  
ventriculum dicit esse fabulosum, & de causa nutritionis  
sturnorum, & cicutæ 6. 4. 2. in quibus omnibus nomine Ga-  
leni, tradit contraria Galeno.

Tertia propositio: permixtio alimenti triplex est, primò,  
quando scilicet post vnum sumitur contrarium. Secundò,  
quando ex duobus contrarijs fit vnum edulium. Tertiò, quā-  
do condimentum additur contrarium alimento.

De



De prima varietate scribitur 3. 1. citat. conferri, quod post alimentum intemperatum sumatur in eadem mensa aliud contrariè intemperatum ad emendationem prioris. Et Salernitani,

*Sumere sic mos est, nucibus sociando racemos.*

Et rursus:

*Post pisces nuces, post carnem caseum manduces, &c.*

Conceditur autem hæc contrarietas in vna mensa, quando intemperies alimenti est magna, & id quod addito contrarium paucum est, magis iuuans via medicamenti, quam lædens gratia inæqualitatis.

In secundo vero casu, & multo magis in tertio commoda est permixtio, quomodo laudatur in proœm. aliment. edulium ex lente cum ptyzana, & pinguis caro commode assatur, gracilis verò concoquitur, quia fit ex illis per coctionem, vel condimentum vnum temperamentum, quia non sequitur conturbatio, quomodo 5. de sanit. 8. in hysteriis, & laganis, nisi multo melle saturentur in conditura, forent nocentissima omnium alimentorum, & 1. aliment. ait mel in constructione illorum bonam partem malitiæ emendare, in ijs quorum viscera obstructa non sunt. Significans in obstructis, talia azyma euadere incolumia. Extra dictas tamen necessitates omnis permixtio lautitia coquorum reproba est.

Quarta propositio: ex eadem conturbatione inæqualium, fieri videtur, vt assaturæ operæ, præsertim piscium, inter venena numerentur, & quod consulitur, vt assa fere non operiantur, & chuscus operus choleram inducit, & quod præcipitur vt assa pisces non recalefiant (juxta adagium, *peixe requentado, amigo reconciliado, guardar delle como do dia-bo.*) Quorum causa videtur vapor efflans concretus, ab operculo, redit ad assaturam, & ingrediens poros permiscetur, cum interna parte calida, quare fit summa inæqualitas ex parte concreta, & altera parte æqualiter calida vaporante, quæ inæqualitas tantum potest in ventriculo, vt succedat multis

A a

fluxus



fluxus alui, vomitus, intellectus turbatio, & nonnunquam intra diem mors 5. 4. & 8. ad Almanf. præsertim cum concretum ipsum pingue sit, euaporauit enim sursum pars pinguior, & multo magis si pinguedo infesta est ventriculo, vt in piscibus, quare reprobis est mos multarum canarum, cum aliæ assaturæ, alijs supra ponuntur ne refrigescant. Coctum autem opertum si quiescat redditur suauius, vnde laudantur rusticorum canæ. Causa, quoniam quando ad ignem bulliunt, pingue separatim à reliquo iure feruet, sicut calor validius separat in metallis, quare ob parvam mixtionem, & inæqualitatem minus suauia, & minus commoda sunt, separata autem ab igne suauiter permiscuntur, nec vapor descendens lædit, nam in liquido iure bona sit permixtio, & æqualiter omnia reperiuntur. Ex eadem causa recalcinatio in pluribus edulis reprobata est, nam si ad ignem morantur putrescunt, & exhauritur innata humiditas, si non morantur, non penetrantur vniuersim ab igne, quia remanet inæqualitas, sicut in assatura cooperta, nisi quod in assatura calor est intro, frigus extra accedit. Ideo autem pisces minus tolerant recalcinationem, quare molles sunt, sicut duræ carnes tolerant, vt vacina, & leporina, & inter pisces, magni fricti, qui obduruerunt extrema superficie ob fricturam. Magis autem lædit ea inæqualitas in ijs qui butyrum recipiunt, eo quod facile concresecunt, ideo etiam cocta in clybano carbonario suauiora sunt, circumdata æqualiter per totum calefcunt, ideo etiam assata in furno suauiora sunt.

Quinta propositio: vbi tamen varia alimenta in vna mensa sumenda sunt, oportet ex 1. de sanit. 13. vt præcedant humida pingua, & facile corruptibilia, eo quod, priora viam parant descensui alimento, posteriora autem per moram vitiantur, secunda alimentorum sæpe.

Contra primum tamen est, quod oliuas duras concedit initio mensæ loco citato, & citrum durius, & radiculam, & cetera, & mora licet adstringentia. Dic: licet qualitates dicto simpli-



simplices sint, oportet vt præponantur alijs edulijs, vbi verò conueniunt contraria facultates, sequenda est potior, in citatis ergo si cum garro sumantur vincit lubricitas, ob morsum, sicuti & morsus nomine falsi pisces præcedere debent 2. aphor. 17.

Contra secundum autem de pinguibus est, quia talia præhibent appetentiam 2. aphor. 21. item si sequitur leuis cibus, innatat, si grauis, lubricat, & ante coctionem descendit. Dic: pingua cum aluum leniant, & cito corrumpantur debere præcedere, ob malitias autem adductas, parum, & raro sumantur.

Contra tertium, de dulcibus est vsus vulgaris. Dic: dulcia laxant robur ventriculi, & cito inflammantur, & leniunt, quorum nullum post cibum conuenit, vtuntur tamen illis ita, ne initio satient, & tollant appetentiam, sicut lacte, & lacticijs maius malum existimantes minus, edere quam corrumpi alimentum.

Num autem seclusis dictis illis conditionibus, cibus difficilis coctionis habeat præcedere. Controuersi sunt. Nam Scrapio, & Constantinus volunt crassa præcedere, cum Haly. 1. præf. 6. eo quod fundus ventriculi calidior est, & vniuersaliter sumpsisse occasionem ex 2. de hist. animal. 22. E contrario ex Auicena 3. 1. citato præcipit subtilia præcedere, & Isac vniuersalium 37. ita vt Hispanus etiam intra vnã speciem præponat elixa afsis. Dic: videtur sentiendum, cum Gentili 4. 1. Syrafi, & alijs, quod in alimentis in quibus non reperiuntur tres illæ conditiones, tenue & facilius coctile præcedat, nisi vbi interuallum inter vtramque non est majus, quam interuallum coctricis fundi ventriculi ad os. Nam licet fundus ventriculi in homine nihilo sit carnosior, immo tenuior ore. Verum ob calorem, ex ventre ascendentem magis communicatum fundo, melius perficitur ibi coctio, & quia ibi alimentum occurrit immediatè calori coquenti, sicut in cacabo citius coquitur, quod immo residet. Consil. autem 22. problem. 1.

A a ij

putat



putat tantam esse proportionem partium ventris inter se, quanta est vacina ad arietinam, & huius ad pullinam, in quo videtur excessisse. Item secundò obseruandum non est vt tenuem præcedat, quando ventriculus admodum biliosus est, periculum enim est de adustione tenuis in fundo. Item tertio obseruandum non est in ventriculo famelico valde; exhibenda enim in eo. sunt crassa 3. 4. citat. partim quia exhibero tenui constringitur ventriculus ob auiditatem, & post refugit crassum, seu tarde alens. Partim etiam quia ab ichoribus biliosis corrumpitur tenue. Quod ergo Haly. 4. pract. 13. præcipit in jejuniante, offerri primum humidum, vt olera, & jura, videtur intelligendum si euomuit, quod ibidem talibus præcipitur.

## CAPVT XXXXI.

*De Cholera.*

**A** Duerte primò: curandæ cholerae præcepta. Primum non oportet medicum terri symptomatis in ea frequentibus. Sed si vacuatio deficit, à conjectata cacoehymia iuuetur, non vtrinque simul, sequitur enim inquietudo propter oppositos motus, sed modo quidem vomitus, modo fluxus prouocentur. Iuuatur in calida cum potu 3. vj. ptysanæ sufficiēter calentis; in frigida verò cum mulla dissoluta, & vtroque si vrget flatus adde cymini 3. 8. infra verò lauatiuum ex 3. xv. ejusdem liquoris addito rosaceo, & luteo, & si timetur vlcus, etiam fabo caprino quæ duo remedia sæpe iterentur.

Secundum: vacuationes infra ventrem, diuertentibus, scilicet validis ligaturis sæpe innouatis, cucurbitis sæpe repetitis supra hepar, splenem; & ventrem; verum supra vmbilicum cautius agendum. Vidit etiam Schylanus hic, quod etiam non ita pridem accidit cucurbitam supra vmbilicum impostam repertam esse adipe, & perimisse. Prouocatur item sudor potu 3. j. vini albi, & 3. iiij. aquæ valde calentis, a qua panis  
ope-



operiatur, & dormiat, aut si toleret tantulum, mittatur in balneum à quo sudet.

Tertium: adstringentia non conueniunt aure vacuationem cacochymia, transacto tamen vno die, vomitus sistatur propter valida symptomata, fluxus verò non sistatur, nisi cum excefferit.

Quartum: cibus ante mundationem noxius est, sed subueniatur perpetuo odoribus, & aspersione faciei, & calefactione extremorum vbi refrigescunt, & auibus asis aspersis rosacea cum muscho ante nares discerptis, & odore calentis panis, & cum oportet etiam aqua carnis, & vinum tenue lymphatum cum rosacea; subueniatur autem sibi cum succo punicorum, & citoneorum, potus enim nocentissimus est.

*Remedia.*

**P**rimum: epithema imponendum ventriculo valde infrigidatum in linteo duplato, nec permittatur calefieri. ℞. sandalorum rubrorum, ros. rubrarum añā ʒ. ij. galliā ʒ. j. camphora gr. v. rosaceā ʒ. iij. aceti ʒ. j. & β. potest intendi frigiditas addito succo plantaginis, remitti cum succo menthae.

Secundum: cerotum imponatur ventriculo cum aceto, & mellino, aut ex mastice dissoluto in albumine. Validius est laudani, mastice añā ʒ. j. thuris ʒ. β. sandalorum alborum rubrorum, seminis sumach añā ʒ. j. anthera, corallorum, achaciae, hyppocistidos, fidiā, balaustia añā ʒ. β. cum terebentina.

Tertium: in sistendo fluxu, vngatur venter cum rosaceo, quo calidum toleret superasperso puluere seminis rosarum ʒ. ij. mastice galliā añā ʒ. j.



*De Tempore sumendi alimentum.*

**P**ropositio prima: definiendum est ex coctione præcedenti peracta. Nam tardatio replet ventriculum prauis humoribus. Anticipatio gignit cruditates, eo quod descendit crudum simul, cum cocto 3. 1. citat.

Sed obicitur vniuersim quarto: subtile præcedens descendit manente crasso, cur non idem accidit hic. Responde hic alimentū secūdo, sumptū est æque tenue priore, sicut est in vna mensa, cum tenue præcedens descendit reliquo ob crassitiam renitente ad descensum. Sed ex hac responsione sequitur posse summi crasso non dum præcedente alimento cocto. Addenda est ergo causa secunda, quia prohibetur ventriculus ab operatione sua vniendi, & assimilandi in alimentum præcedens. Adde tertium: quia necessario permiscetur crudum, cum cocto, quare aliquid cocti manet, & corrumpitur, aliquid verò incoctum, cum reliquo descendit.

Secunda propositio: num autem cibus semel sumptus vniuersim exeat à ventriculo. Dic: non retinetur in ventriculo totum, vsque ad integram coctionem. Neque est noua Gentilis opinio 13. 3. tract. 3. cap. 8. Nam aperte 3. naturalium 13. si interuallum inter duas cibationes tripartiamur, peracta 1. 3. aliqua portio alimenti apponitur hepati, & intestinis, & tamen alimentum bona sui parte manet in ventriculo totum, vsque ad sequentem cibationem, alioqui statim famesceremur. Quantum autem sit spatium 1. 3. dixit Galenus 2. aphor. 17. esse varium, nam in famelicis multo citius trahitur ad membra, & in vigilantibus, & in exercitationibus.

Altera ratio experimentum, quia paulo post assumptum alimentum, pulsus, & actuales actiones apparent vehementiores, quod autem ejus vehementiæ causa non sit, quod quidam imaginantur distributio prioris alimenti relictæ in ventriculo, sed portio noui assumpti, ostenditur ex aphor. citat. com.



com. ex duobus his symptomatis docet agnoscere, si alimentum modo sumptum celeriter, aut tarde nutrit.

Tertia ratio: num vrina statim ab assumpto cibo albet, & saepe ubi sitientes bibimus, statim profundimur rore, & refrigeramur etiam summa extrema. Item quia 2. aliment. citat. docet alimentum lubricum debere praecedere, eo quod quamprimum coquantur descendunt. Et Isaac vniuersalium 4. aperte dixit illa descendere reliquo alimento manente in ventriculo. Auicena etiam 3. 3. citat. dixit, remanere aliquid cibi assumpti in ventriculo, usque ad horas 15. insitians alimentum exire à ventriculo per partes, & non vniuersum.

Quod autem legitur 3. naturalium 4. vim ventriculi retentricem retinere alimentum in ventriculo, usque ad integram coctionem, intelligit quoad plurimum, & crassum alimenti, sicut & in morbis, usque ad statum operatur retentrix, & tamen in augmento expellitur aliquid puris, & seminis. Vel dic retentricem operari toto tempore coctionis in varijs partibus.

Tertia propositio: quanta autem sit duratio vniuersi cibi in ventriculo. Dic: ex Ras. 11. continent. 1. apud quosdam definiri horas 12. apud alios 22. Citat autem ex Galeno conclusionem athletarum cibatorum suilla, quod durat horas 15. plus minus. Auicena autem 13. 3. citat. dixit tempus aequalis remanentiae esse in 12. & 22. Quae verba cum sumpta sint, ex Rasio citat. habent hunc sensum. Integra cibatio levis alimentum in valido ventriculo, in contrario autem statu 12. quae expositio conuenit, cum precepto eiusdem 3. 1. doctrina 2. cap. 7. quod in duobus diebus ter edatur, & cum eo quod scribitur 13. 3. citat. initio capitis quod durat fere horas 15. & cum eo quod scribitur 13. 3. tractu 2. cap. 1. Quod comprehensio ventriculi durat horas 10. Nam reliquae quinque tribuunt tractui alimenti, & expulsionis eius à ventriculo. Quare Gentilis expositio non videtur recipienda, explicantis Auicenam agere de cibatione magna, quae sumebatur ad horam duodecimam dici,



diei, cuius duratio est vsque ad horam 22. Oporteret enim iuxta eam computationem homines intra diem naturalem cibari plus quam bis. Neque item recipienda videtur expositio Nicolī ferm. 5. quod cibus crassus moratur horas 16. in ventriculo, & in secunda coctione quatuor, & in tertia duas, ideo præcipiebatur antiquis, vt interuallum coctionum esset horæ 16. Verum non aduertit, quod cibus sumendus est æstatim post inanitionem ventriculi, non post peractas omnes coctiones. Alia autem litera quæ legitur 13. 3. tract. 3. cap. 6. tempus remanentiæ cibi in corpore, licet non displiceat Odonio in lib. de cæna, & prandio, non videtur recipienda, partim quia verba Rasis de ventriculo sunt, partim quia ibi est sermo de ventriculo, non de toto corpore, licet autem determinentur horæ 16. ad moram integræ cibationis in ventriculo. Verum in vigilia prius anticipat descendere, ideo non spectatur.

Quarta propositio: de numero autem cibationum. Dic: Ficinus lib. 1. de triplici vita, 7. quaque hora præcipit, sed agit de studiosis, & imbecillis innato calore. Azarab. theor. tract. 12. cap. 1. & cap. de febre phlegmatica, tribuit cuique coctioni horas sex, sed oportere 6. quaque hora edere vacuato jam ventriculo.

Celsus lib. 1. cap. 3. præcipit magis in die bis, quam semel edere. Præstantiores autem Arabes conueniunt in duobus diebus ter esse cibandum, qualis est Auicena citat. & Ras. 4. aliment. 4. & Haly 1. præct. 13.

Dic: iudicium variari penes ætates, temperaturas, anni tempora; penes ætates, quia 5. de sanit. 6. decrepiti ter in die cibandi sunt, imbecilles veró 4. 7. theor. 6. in quo ordine pueri locantur. Verum inclinantes videntur Consiliatori doctrina 12. cibandum ter in duobus diebus. Iuuenes autem, & adolēscētes bis in die. Causæ horum notæ sunt ex quantitate calidi, & mollitiæ carnis 1. aphor. 13. & 14.

Penes temperaturas, humidis vna cibatio sufficit, duplex lædit,



lædit, è contrario gracilibus : 4. ad Almanforem 4. vbi juxta aphor. 60. lib. 7. sic biliosis bina, pituitosis vnica 2. acut. 29. Iuxta tempora autem anni. Nam hyeme apud Hippocratem lib. 3. de dietis, & Celsum citat. non est prandendum, nisi quis habeat ventrem valde adstrictum, in alijs autem temporibus bis cibandum est.

Iuxta vires autem, antiquis fere vnica cibatio satisfaciebatur robustioribus, nobis debilioribus fere necessaria est duplex, imò etiam quibus jejunis fuit. bilis ad ventriculum, commodissime hora diei 2. aut 3. sumitur panis cum absonio leui roborante ventriculum. Tralianus de cephalalgia ex ventriculo. Nam panis solus est ex corrumpentibus ventriculum, dicebat Syras. 3. 1. citat. Galenus autem videtur obtinuisse validum ventriculum, qui solum panem ad jentaculum sumebat 6. de sanit. 8. in reliquis verò præstat, vel adjungere, vel sumere intinctum panem vino, & expressum : colligitur pluribus ciuibus crapulosis, & otiosis commodissime ad sanitatem esse Ecclesiastica jejunijs, ne perpetua bina cibatione repleantur.

## CAPVT XXXXII.

### *De Debilitate coctionis.*

Incipit, cum stomacho.

**A**duerte primò: curandæ debilis coctionis præcepta. Primum, si causa est in alimento sumpto, vitetur. Causæ autem ex parte alimenti vitiantis coctionem sunt 12. numeratæ ab Herculano hic. Si verò jam secuta est cruditas propter calorem, aut etiam consuevit is qui cruditatem patitur, noctu propter ardorem sitire, antequam conquiescat, apud Celsum lib. 1. 8. iij aut iiij. 3. frigida per syphonem hauriat, & omnes cibationes porione aquæ frigida includat, quia roboratur ita,

Bb &



& temperatur immodicus ventriculi calor. Hippocrates autem 2. acut. 22. exacte docet talium gubernationem, scilicet ut si quispiam excessit in cibo tradat se somno, non minus quam in nocte solemus, scilicet ut significet non esse interrompendum somnum, usque ad integram coctionem; dormiendumque in hyeme citra omne frigus; in æstate citra calorem, juxta epid. 3. 1. citat. multis cooperiri indumentis benefacit coctioni, & 6. epid. 4. 20. calidas naturas per æstatem increasat frigidum cubile, quia cum æstus omni tempore molestus sit, & noxius, tempore tamen somni longe maximè, quia interturbat somnum, auferens coctionem, quæ eo tempore infirma est; quia tamen multi, ob talium cruditatem partim ob consuetudinem tunc dormiendi, partim ob mordaces assumptorum vapores dormire nequeunt, subuenit lenta deambulatio, quia sic saltem promouetur descensus alimenti, ad loca validiora coctionis; ex quiete autem citra somnum nihil horum comparatur. Sed cur vulgo præcipitur magis somnus à prandio, deambulatio à cæna.

Dic: post prandium sequentia exercitia rapiunt crudum ad vasa 1. aliment. 2. quare præstat quiete prohibere noxam imminentem, ut ita ventriculus magis amplectatur alimentum, post cænam autem somnus succedens excipit cibum innatantem, quare subuenitur deambulatione descensum promouente.

Sed cur in cruditate Hippocrates prohibet quietem, cum 3. therap. 5. nihil magis in ea commendetur, & Celsus citat. præcipiat, ut quiescat in lecto, licet non dormitur. Dic: illic curant cruditatem jam factam, in qua vnica curatio est quies, ne crudum rapiatur ad vasa. Hippocrates autem procurat coctionem nondum præsentem cruditate.

Sed cum magis circuitus consulit longa deambulatione. Dic: quia timet cruditatem exercitio magis aucto, magis autem exercet deambulatio non omnino plena qualis est



est longæ deambulationis, quam in breui spatio Cels. lib. 1.  
cap. 2.

Sed cum duo remedia perscribantur ab Hippocrate promouentia coctionem, somnus, & deambulatio, vtrum magis confert coctioni. Dic: somnus proximè post cibum, exercitatio verò longissimè à cibo, quia ambo, importuna incommodant; somnus enim ante cibum liquat membra, exercitium post canam excitat cruditates. Quare experimentum Federici Imperatoris, qui ambo hæc statim adhibebat à saturitate, inartificiosum est, sed si ambo hæc oportune adhibeantur, vtrum magis confert coctioni. Dic: duo hæc omnium maximè concoquunt, & ob ea ambo, exercentes vitam laboriosam raro agrotant. Intercedit tamen hoc discrimen, quod somnus magis facit ad coctionem viscerum, labor verò ad coctionem externorum membrorum 6. epid. sect. 5. text. 10. Quare experimento otiosi, & somnolenti vitiosi sunt, exercitati verò musculosi, & porosi, non ventre obesi.

Addit Hippocrates, sequentem cibationem debere esse parcam, potum verò paucissimum, & meraciorem, potus enim coctionem prohibet, & per se, quia potestate sua humida laxans ventriculum, facit ad cruditatem, & per accidens, quia causa est, vt innatet alimentum. Sed quomodo præcipit in cana paucum potum; cum Salernitani præcipiant, vt à potu cana incipiat, & ipse Galenus prohibeat potum ad ientaculum, tam in senibus 6. de sanitate 8. quam in pueris 1. de sanitat. 14.

Dic: si prandium integre confectum est, ad canam liberalius potandum, vt promoueatur distributio alimenti, quæ per somnum retinetur. Hippocrates verò agit de prandio non confecto.

Secundum præceptum: si causa interna est, obuietur illi contrarijs, si materialis, vacuetur, non tamen trahant à longinquo vacuantia, ne repleant ventriculum, respiciantque

Bb ij vacu-



vacuantia tam ventriculū, quam membrum mittens ad ventriculū. Vomitoria verò rara, & mitiora sint.

Tertium: roborantia ventriculū sunt odorantia, somnus prolixus, profundus, continuus, ita vt etiam meridianus, frigidus autem ventriculus tegatur pelle anserina, vel vulturina, minus verò calet panus coccinus. Vestimenta verò non angustent ventriculū, multo minus sint laxa.

Quartum: vbi lapsus est per intensum calorem, dura alimenta conueniunt, vacina cum aceto, pedes, intestina, testacea, & crustacea. Quantitate verò quantum possint conficere. In contrario verò statu præstat partiri alimentum, & eligere opposita,

Quintum: educto cibo corrupto, siue sursum, siue deorsum per viam naturalem, nihil edat, & profunde dormiat ad coctionem residui, indeumat pauca coctioni renitentia, quia agitati sumi corrupti facile vitiant accedens alimentū.

#### *Remedia.*

**P**rimum: in causa calida. Citonea conferua rosarum, diarodon, mina simplex. Validior, est syrupus acidus, ex citoneo Ras. hic & puluis ejusdem ante cibum sumendus, cum succo punici dulco acidi, extra verò vnctio ex rosaceo, & mellino super asperso puluere coralorum, rosarum masticis. Validius est, si in ℥. ij. rosacei ferueat ℥. j. succi citoneorum addito, vtriusque sandali, coriandi preparati, seminis acetosæ cum cera.

Secundum: in frigida causa, sumatur frequenter hora vna ante cenam pilulla vna masticina pendens ℥. j. validiores autem sunt alephanginae, validiores stomacichæ, item ante cibumumat ℥. j. syrupi de mentha, vel de corticibus citri cum moscho. Vel post cibum cochlear paruum pulueris dulcis videlicet cinamomi ℥. iij. zinziberis ℥. j. anisi ℥. j. galangæ, piperis longi ana gran. x. sacchari ℥. v. Validius, zinziberis  
con-



conditum. Extra verò imponatur cotus imbutus nardino calido, & valde expresso. Vel fricetur ventriculus, cum aqua vitæ calida. Vel panis calidus per medium scissus aspergatur vino optimo, cum puluere mastice, absynthei, menthæ, aut emplastrum ex solo mastice cum guttis rosacei, & terebentinæ. Validius, est stomachicon.

Tertium: vomitoria conueniunt ex cap. de vertigine. Vel succi corticis medij sambuci ʒ. j. mellis ʒ. ʒ. potetur calidum.

*De Proportionē prandij ad canam.*

**P**ropositio prima: exercitandi, minus ad diem prandeant ad noctem magis canent 6. aliment. 11. & Haly 1. pract. 13. Nam labor sequens rapit ad vasa, non solum semicoctum, sed omnino crudum 1. aliment. 2. Quare melior est victus, vel cibatio agricolarum, quam fossorum. Urbani enim, & fossores fere magis prandent, quia post quantulamcunque exercitationem appetentes volunt delitiri plurimo cibo, quare accedentes ad canam pleni minus sumunt; agricolæ verò, & plurimi muliorum melius canant, quia necessitas illis præscribit legem. Athletæ verò sequebantur agricolas 7. therap. 6. & 1. acut. 18. Consiliator verò doctrina 121. intorquet has sententias quasi agat de his, qui repente aggressuri sunt insolitum aliquod exercitium, non de his quibus vita laboriosa est.

Secunda propositio: nemo mutet repente consuetudinem. Siue non canandi, siue plurimum canandi, instat enim non leue periculum 2. acut. late.

Tertia propositio: qui modice prandent, & ante noctem canant, præstat vt magis canent Haly citat. & Celsus lib. 1. cap. 3. ostenditur in robustissimis, & Athletis 7. therap. 6. & in mediocri habitudine, vt in Galeno de sanit. 3. similiter in valde debilibus lib. 7. therap. citat. Idem scribitur 2. de sanit. ad initium in explicatione verborum Hippocratis, vigilia ex

Bb iij      fatia-



fatiatas noxia est. Item ratione probatur, sit prima: quies post canam indicat copiam cibi in cæna exhibendum, sicut exercitatio diei indicat minorandum esse prandium.

Secunda ratio: somnus nocturnus augens naturales functiones, operatur enim anima interdiu, natura verò noctu i. problem. ult.

Tertia ratio: frigiditas noctis augens innatum calorem, tamquam contrarium repellens.

Quarta ratio: tenebræ quæ & ipsæ repellunt; siquidem spiritus lucidi sunt lib. 1. de medicinis cordis. Quinta ratio: mora major longi temporis à cæna ad prandium.

Quarta propositio: qui immodice prandent, vel post cænam statim se tradunt somno, eo magis viuent, quo magis, cibo in cæna temperauerint. Nam cum vniuersale præceptum sit 3. 1. doctrina 2. cap. 7. si vna vice superauerit, famelicus maneat, cum tales in prandio excedant, quod oportuit esse tantum, vt hora cænæ, nihil illius reperiatur in ventriculo, sequitur vt vnica cautio sit minimum cænare. Item qui statim ab ampla cæna tradunt se somno committunt se maximo labori; nam sicut præmaceratæ carnes, & legumina facilius conficiuntur in ventriculo, ita liquata per vigiliam facile à calore somni vincuntur. Quo fit vt cænantes assa, aut costu difficilia, aut dura, noctu torqueantur, quia talia vruntur à conferto calore irruente.

Tertia ratio: plenitudo magna ventriculi per noctem nascitur, ex defectu tractionis membrorum. Monstrat enim experimentum, diutius sentiri in ventriculo cænam, quam prandium, id quod monstrat experimentum Federici, ideo & per noctem non fameſcimus, scilicet quia vigilia, & exercitium ambo trahunt à ventriculo, partim etiam augetur plenitudo ventriculi per noctem, eo quod ex natura somni, & noctis regrediuntur humores ad viscera semicocti.

Argumentum est, quod si fluxus pender ab hepate, vel  
cere-



cerebro, membris secunda, & tertia coctionis, augetur per diem, id enim est quod ad canam sumere solemus raphanum augmentem coctionem, & alimenta cocta facilis coctionis, & magis pisces, & potum ampliorem. Ideo aries assus damnatur in cana, quia ventriculus nondum inanitus est, in initio autem prandij aurantia, & melones, quia ob inanitionem creditur recipisse aliquid liquoris biliosi temperandum, idem etiam est quod mane post plurimas horas cana parca non esurimus, propter plenitudinem ventriculi in nocte dictam.

Accedit etiam pro causa, quod membra per noctem sufficienter reparata, non trahunt à ventriculo, eo quod per noctem defluxit aliquid pituita à capite ad ventriculum laxans illum, & tollens appetentiam.

Quinta propositio: multo magis abstinendum est à cana magna ijs quorum caput, aut oculi imbecilles sunt. Nam Mesues cap. de debilitate visus in talibus ait. Prohibeantur omnino à cana, & Auicena cap. de apoplexia; sit contentus cibo in matutinis, & Haly de debilibus oculis, si non potest excusare canam, & Galenus 4. acut. 67. à cibo ad somnum conuersis caput repletur, & Constantinus de regimine sanitatis; cana magna grauat caput, & oculos. Licet Matheus, Cursus, & Odediodis secus sentiant. Quod si Galenus in epileptico precipit duas tertias ad canam, sumit indicationem à consuetudine sui temporis in quo ferè vniuersum canabant, quæ consuetudo non erat ex toto permutanda agris, nostro autem tempore, cum plurimum esus sit contrarius, in capite quidem debili multo minus canandum est. In robusto autem capite, vel obseruatur consuetudo, non enim est plurimum noxia ijs quibus per diem, non incumbit valida exercitatio, & longus vsus minuit noxam: vel quod satis est mutetur, cum conditionibus, quod scilicet paulatim fiat, quod leuissime prandeant quantum horæ cana sit ex toto confectum, & quod antea nocuerant, & quod non sint senes, in quibus prauæ consuetudines

mu.



mutanda non sunt 5. de sanitat. 10. quibus verò ad diem imminet momentanea exercitatio, necesse habent mutare, ita ut plus cœnent.

Sexta propositio: tandem satisfaciendum est rationibus aduersantium. Ad primum, Thelephus 5. de sanitat. 6. periit decrepitus, qui parcius cœnabat. Dic: Antiochus Medicus ibidem fere paratate copiosius cœnabat, Thelephus autem graminatus, aut in eo deliquit, aut sumebat postremam cibationem jam cubaturus.

Ad secundum: calor imbecillium, quales plurimi sunt, si cut hyberno tempore, remittitur, non roboratur, ita ex frigiditate nocturna. Dic: ab eo prescripto aphor. 15. non excipere Galenum faminas omnes, & graciles viros, quod Consiliator putat cito, sed tantum animalia in latibulis jacentia. Item comparatio frigoris noctis ad diem, nunquam est quanta hyemis ad æstatem, per noctem enim nemo friget nisi mendicus. Quare non est periculum, ne ex immodico frigore calor debilitetur, & eodem modo ad id quod subdit, quod tales imbecilles iuuantur calore ad coctionem, instar fructuum, magis enim iuuat frigiditas, & tenebræ, & somnus nocturnus, siquidem augent innatum.

Præterea si per imbecillitatem innati caloris aliquis homo iuaretur calore solari, ad coctionem, maxime esset hecticus, sed tales melius concoquunt in nocte 7. therap. cit. igitur. Quare nullibi habet locum ea major coctio per diem, nisi forte in senes valde debili. Quod videtur insinuasse Auicena 3. 1. doctrina 2. cap. 2. Dicens senes, si fuerint fortes, augmentum in cœna sua paruum faciant; quasi si debiles magis ad prandium.

Ad tertium: ex Auer. 6. coll. 2. hora matutina est dicata exercitio, sed exercitium tres coctiones peractas, ergo oportet cœnam esse leuem. Dic: dupliciter male colligit primum, quia multis imminet exercitatio post prandium, quæ magis offendit post magnum prandium, quam exercitatio matutina



tutina post magnam canam. Secundò, assumit falsum, colligitur enim 2. de sanit. 3. & 1. cris. 12. & 3. nat. 13. quod diuiso in-teruallo inter duas cibationes in partes tres, in postrema ter-tia exercendum est corpus, in qua portio alimenti immediatè præcedentis assimilatur ventriculo; altera verò portio vni-tur hepati, & intestinis, alia apponitur membris. Quare horâ incipiendi exercitium non sunt peractæ omnes coctiones, sed 1. & 2. & 3. incipit, quam occasionem colligit Galenus ex vrina pallente, & cocta cum Oribasio 1. compend. 2.

Ad quartum: in die plus dissoluitur, ergo plus cibi exhi-bendum est, plus expurgantur excrementa, ergo plus cibi. Dic prima consequentia non valet; oportet ex 1. aphor. 15. cibum non respondere resolutò, sed innato calori. Non valet etiam 2. consequentia, quia tempus concedendi cibi est post purgata excrementa 2. aphor. 10.

C A P V T XXXXV.

*De Doloze ventriculi.*

**A** Duerte primò: de curatione doloris ventriculi præcepta. Primum: si dolor ita est ingens, vt valde vrgeat, à sedan-tibus ordiendum est. Si verò mittior in dolore materiali, à va-cuatione incipiendum.

Secundum: vacuatio promptior est per leue vomitorium. In materia verò multa, vel in difficulter vomente addatur so-lutorium, & si quidem affectus ventriculi per proprietatem fuerit, leuis sit solutio, si verò è longinquo mandatur materia, aliquanto validior, sed semper admixto adstringente Rhab. vel mirabolano, ne trahatur ad ventriculum.

Tertium: concoquentia non sunt adstringentia, etiam si materia aliunde deferatur, sed post vacationem succedant adstringentia.

Quartum: flarus saepe oritur in ventriculo à debili calore

Cc innato



innato agitante, & non dissipante, curetur impositione pellis ex capite superiori, & sumptione eorum, quæ augment quantitatem calidi, ita tamen quod præ calore eorum non minuatur exiguus calor illorum, quod sæpe accidit. Quandoque verò causa status est calor immodicus, vel alimenti, vel ventriculi, agens in prauas humiditates 14. therap. cap. de priapismo, cuius curatio est euacuatio excrementi flatulenti, & emendatio remanentis intemperiei, & dissolutio flatuum.

Quintum: si dolor ingruit in fame propter influxum humorum, vacuentur, & cibatio anticipet famem, & præsumat roborans ventriculum, panem in sucço punici, vel in defluxu melancholico in vino austero.

*Remedia.*

**P**rimum: sedantia dolorem in frigido. Aquæ naphæ calentis ʒ. iij. sed mouet vomitum; vel aquæ vitæ. Vel zinziberis ʒ. ʒ. cum ʒ. j. vini maluatici. Crebro autem fumatur diacyminum, & clyster expediens meatus, & dissipans flatus.

Aliud, in pituita alephanginarum ʒ. j. In biliosa aloes loti tantundem, in melancholica Indarum. Aliud autem in quauis harum. Phylonij ʒ. ʒ. vel castorij opij ana gr. ij. extra verò parentur sacculi in flatulento ex resoluentibus fursure, sale, milio torrefactis superasperfis vino potenti. Vel ex camomilla, melliloto, rosis, absintheo in reliquis. Vel vas plenum cinere calenti superasperso origano, opertum linteo similiter irrorato. Vel imponatur ex melle lana minutim incisa, & pulueribus masticeis, galangæ, zinziberis cataplasma.

Secundum: in calido, epithema ex capite de cholera, & plurima frigida epota, & frequens sumptio succi punicorum.

Tertium: concoquentia bilem ventriculi, acetosus cum oxisachara commixta; acetosus, & de absintheo.

In pituitosa mel collatum, Validum, oximel schylinum.



num. In melancholica verò syrupus de fumaris, & de epythemo.

Quartum: in pure bilioso Rhab. 3. ij. cum cassia immixta. Aut 3. ij. de hyera simp. sicut in pituitoso alephanginarum 3. ij. stomaticharum 3. j. In melancholico autem Indarum 3. j. & 6. si verò materia aliunde fluat ad ventriculum, validiora conueniunt. Præseruat autem commodè, si quarto quoque die sumatur terebentinæ 3. j. vel decimo quoque die Rhab. 3. 6.

*De Conditura alimentorum, ex Isac 62.*

**P**ropositio prima: quædam alimenta externa conditura, ad emendationem non egent, vt lac, fructus. Alia egent, vt oua, pisces, carnes. Nec obstat, quod lac minus coctum est a natura quam caro, & proportionem respondet ouo volatili, & aquatili. Quia stat aliquid esse minus coctum ad vnâ formam; imò & omnino putrefactum ad vnâ, & magis coctum ad sequentem, vt stercus ad formam scarabei coquitur, ad formam stercoreis putrescit, quare lac ad formam chyli coctum est, licet ad formam membrorum parentis sit minus coctum, quam caro.

Nec obstat item, quod fructus nimium distant à forma hominis, quia satius est, quod parum distent ab humore aliquo in vasis contento, in quem mutantur.

Cur autem cum reliqua animalia ad esum, solis tribus alimentis vtatur, solus homo adiungat etiam ignem. De quo dubitauit Placentinus in lib. de medicina. Causa est debilitas coctionis, ob glabriciem, & tenuitatem cutis 4. problemat. 6. Auicena autem 5. naturalium videtur potissima causa. Quia solus homo diuertitur ad meditationes, indicium quod contemplantes, siue diuina, siue humana pessime coquunt, est & tertia causa gulositatis humana, partim ob illecebram ciborum, partim ob necessitatem plurimorum spirituum.

Secunda propositio: ex 2. aliment. 52. mediocris con-

Cc ij di-



ditura ob suauitatem, & coctionem optima est, multa autem cruditatem coquorum parit. Commendatur autem ad coctionem leguminum, carniū, piscium album jus 3. aliment. 9. Scilicet affundatur copiosa aqua, ne cogamur superaddere frigidam in æneum vas, quia in eo feruor ignis maior est, quare coquendum non dissoluitur, adjiciaturque oleum cum anetho, & porro, facit enim oleum ad emolliendum, quare coctum redditur mollius, & friabilius. Postquam autem ad dimidium præcessit coctio, tantum salis adjiciatur, quantum suauitatem conciliet, quia si in initio inditur, indurefcit coctum. Vel ergo ita coquantur alimenta, vel simpliciter assentur.

Tertia propositio: ex condituris quædam est coctio, alia assatio, alia frixura; quædam maceratio in aqua, quædam in lixiuio, alia in muria, quædam verò salitura. Ergo coctio eget majori igne, & vndique æquali, quia agit in coctum medietate, immediatè autem in aquam contrariam, & quia coctum non circum voluitur, quare vndique oportet applicari ignem.

Assatio verò minori etiam si inæquali. Nam præter dicta, externa superficies nimium densata prohibet aditum ignis ad interna, ideo ignis carbonum præstanter concoquit, male assat; lignorum verò contra. Esse autem vehementiorem ignem carbonum monstratur, quia emollit ferrum, frangit ollas, citius concoquit, & caput magis tentat. Et ratio, quia lignum viride non ita facile, & vniuersum vincitur ab igne. Inter prunas autem validior est vulgaris (*de ferreiros*) quam illicinus (*de soubro*) quia vulgaris citius inflammatur, ideo consumitur, ideo capiti nocentior est, ideo ad robusta opera molliendi ferri eligitur.

Nec obstat, quod ignis foci magis calefacit domum, quia id facit amplior quantitas lignorum, & flamma, quæ magis aëri communicatur. Inter assaturas autem optima est in clybano, quia paulatim citra vstionem æqualiter assat. Quod ergo Ras.  
git.



cit. reprobatur assaturam in clybano, ceu parum alentem. Significat magis exsiccari ea quæ in clybano assantur. Quo fit, ut talis assatio non conveniat in siccis carnibus, ut vacinæ, nec facile exsiccabilibus, ut pullinæ, & hædinæ, ideo in veru assata magis alunt, & magis alunt, quia magis conseruant internam humiditatem, & adhuc magis super prunas, quo fit ut eligatur talis caro phlebotomatis 4. 1. 20. Distant autem assa ab elixis non parum, quod multi putant, sed plurimum in difficultate coctionis. Indicium, quod tolleramus ad canam vacinam elixam, non tamen sine noxa arietinam assam. Et quod 3. aliment. cap. 12. scribitur, non coqui assata ad prunas, nisi in valido ventriculo, & cap. 30. etiam pisces assos solis robustis ventriculis concedit, præcipitque non supra potari, ne incocta perirent. Præterea assa ventrem adstringunt lib. de affect.

Num autem sint assata sicciora elixis controuersum est. Hispanus enim in dietis opinatur assa sicciora esse, tam substantifica humiditate, quam accidentaria, quia calidum elixans minus siccatur accidentariam, minus etiam siccabit naturalem humiditatem, quia cum opponatur utrique, non potest dissipare vnam, & conseruare aliam.

Nec item admittit quod assa extra sint sicciora coctis, initio autem humidiora, quia ad sensum partes internæ coctorum molliores sunt, & facilius concoquuntur, quam assatorum. Ad Aristotelem autem 4. meteor. 3. oppositum asserentem, vel nega illum, vel interpretare, quod assa sunt humidiora non elixis, sed interne, quam externe; elixa verò contra.

Verum refellendus est, pugnat enim Aristoteles aperte, & medicis omnibus, & experientia monstranti, assa magis alere 2. canonis de carnibus, unde magis impinguant 7. 4. tractu 4. cap. 2. & licet soliditas aliquanto maior in asso possit afferri pro causa maioris permanentiæ alimenti; non tamen est tanta varietas in soliditate, quæ sufficiat ad maiorem im-

Cc iij pin.



pinguationem carnis assæ. Item argumento est assa esse substantissime humidiora, quia ab assis si seindantur, plus succi effluit, & quod assum premitur, vel distillatur non elixum, & quod iura coctorum valde alunt. Celsus autem lib. 2. cap. 18. asserens jurulenta magis assis nutrire, assa frixis; intelligatur per jurulentum quid dicitur.

Quare asserendum est assa succosa humiditate, & alente magis abundare, licet qualitativa, & accidentaria magis abundant cocta, unde febrientibus magis commoda sunt, & alium magis mouent. Causa autem est quia in assis ignis penetrans occlusis poris præ crustis exire non potest, quare trahit ad se, humiditatem non expellit, & concoquit internas partes. In cocto autem validus calor aquæ externæ ebullientis trahit ad se minorem calorem in humiditate carnis interna, & ita coctum redditur substantissime siccus.

De frixis autem Aristoteles cito recenset illa inter assas; quia in frixo calor ignis agit, sine medio olei, secus quam in aqua. Quæ verba controuersa exppositoribus hunc sensum habent, liquida igni apposita si lentore carent, ignis actionem suscipiunt, & feruent, exhalant, & absumentur; & eo citius quo fuerint tenuiora. Itaque aqua, & vinum ad ignem citissime bulliunt, proinde cito concoquunt coquenda, lenti autem vapores non sunt præuij vapor excitato ab igne in humido, quare vapor exiens detinetur, siquidem flatus fuerit multus, & substantia non valde lenta permanet, & inflatur, paulo verò post lentore concrecente exurit liquor, ob moram flatus in transeundo. Sed accidit melli, & musto dum fit defructum, ideo olla carnis cum pauco jure diffunditur, quia pinguescit jus, ideo vulgo indicium est sapa esse percoctam, quando turget, & effunditur, quod si post id sapa, aut mel immoretur igni, exuruntur. Si autem substantia magis lenta est ut olei, vapor retinetur in fundo. Quare exurit, & denigrat, & incrassat oleum. Hinc est, quod quando in aqua quidquam coquendum est, finitur prius aqua libere feruere, quando autem

in



in sacharo, vel melle parum finitur turgere, quando in oleo tantum calefieri, quia cum vapor per oleum meare non possit ad ebullitionem, frixum intro feruet ob innatum liquorem, cum autem calor ebulliens major sit non ebulliente, sit ut internus frixi calor alliciat intro olei humiditatem, non è conuerfo, quod in coctis. Hinc etiam fit quod perfusio mēbri ex calido vino, innoxia est, ex melle calido, noxia, ex oleo verò, vel lardo calidis, exulcerat, quia vapor intrò retentus, & prohibitus à lentore exire, durescit. Hinc etiam est quod ebullitio: aquæ tollitur refrigeratione superfusa frigida, vel fractura ampullæ, exsufflatio verò ob vtramque causam tollit ebullitionem. Hinc etiam est quod frixura non fit commodè in oleo parum calido, quia in tali actio est similis coctioni, penetrat enim mollem frixuram, quare frictum remollescit, & intrò suscipiens oleum illud recipit.

In feruente autem oleo superficies extima aduritur à valde calenti oleo, quia intrò penetrat non humiditas olei, sed calor ignis, ideo similatur frixura assatura, non coctura. Vnde etiam est quod frixum in oleo non feruente hæreat sartagini, quia cum non ebulliat oleum, non eleuat frixuram, quare hærens vasi aduritur. In feruente autem oleo accedens liquor frixi à vehemēti calore ebullit, eleuans frixuram, quare non hæret sartagini. Hinc est quod oleum ad ignem non aduritur præfente frixura, quia ebullit oleum ex liquore frixo ebulliente, ideo sintillat, & sonat, quia committitur pugna ebullientis liquoris, & olei resistentis ebullitioni.

Quod si vincat feruor ebullientis liquoris, rumpitur oleum, & præ impetu saliens vrit, absente autem frixura, vel iam sufficienter exsiccata, vritur oleum, ut quod perpetuò hæreat sartagini. Hinc est quod ad frixuram requiritur maior flamma quàm ad cocturam, sicut ad cocturam maior quàm ad assaturam, scilicet quia paruus liquor frixuræ, nisi oleum valde caleat, non ebullit, quare non eleuatur frixura.

Hinc etiam est quod frixa in butyro, vel oleo reprobantur



tur vertitur 5. collat. solis autem piscibus ob innatum frigiditatem, & humiditatem, tanquam emendans toleratur.

Num autem quæ assantur expediat vngi pingui aliquo. Dic: Isac vniuersalium 34. ex antiquorum obseruatione prohibet assa vngi pingui, eo quod obstructio pororum prohibet efflatum prauorum vaporum, si tamen caro sit gracilis præeligit conseruationem innatæ humiditatis per vntionem.

Num autem vntio pinguis reddat assa humidiora, an minus sicca, videtur Galenus sibi contrarius 2. simp. 5. affirmans vnta reddi sicciora, sicut placentas ex oleo, deinde subdens coquos vngere assa, ne adurantur, & siccentur, ad quem vsum quandoque circundant assaturam omento.

Dic: oleum per se humidat infusum; si autem accedit multus ignis desiccet, quia pingue inflammatum depascitur natiuam humiditatem; si autem accedit paruus ignis, modico lentore suo, vt in asso, & mouimento tuetur partes externas, & internas, quia obturans prohibet exsiccationem.

Num autem quæ coquuntur sint operienda? Dic: ex Isac vniuersalium 65. & Oribas. lib. 4. cap. 2. si grauis odoris sunt non esse operienda, vt piscis, hircus, capra, & per ætatem etiam aries. Si verò grauioris odoris sunt, auferenda sunt ossa, eo quod putredo è medulla incipit. Reliqua verò dum coquuntur redduntur molliora, & suauiora, si frigido non tangerentur aëre 2. aliment. & Aët. lib. 2. cap. 263.

Num autem alimenta, siue assa, siue cocta præster edi adhuc calida, an refrigerata. Dic: ex 4. acut. 102. Acres carnes, vt caprinæ commodius sumi frigidas, à quo non valde dissentit Auicena 3. 1. citat. nunquam tamen operienda est assatura, post depositionem ab igne, propter inæqualitatem de qua supra, sicut coctum præstat operiri post depositionem ab igne iuxta adagium. (*Nora rogada, olha repouçada.*) Causa: quia quamdiu ad ignem bullit coctum, feruet pingue separatum à reliquo jure, per paruam autem quietem fit permixtio suauissima.

Quarta



Quarta propositio: vsus condientium quintuplex est. Primus excitatio facultatis gustatoriae in lingua, vt suauius percipiantur in ventriculo. Secundus, intentio & velut actua- tio saporis in gustabili. Tertius, famis in ventriculi excitatio. Quartus, emendatio malae impressionis alimenti. Quintus, perductio linguae ad extremas intemperantias, vt praestetur oc- casio deliciae per reductionem, licet enim sola dulcia, vt po- te similia alant 4. simp. 10. Verum cum cito fatient, ex condi- mento preparatur lingua ad suauitatem reductionis.

Colligitur primo: cur condimenta plurima caleant. Non sufficit causa Hispani, quod calor noster influens calidus in 2. diet. vniuersalium 17. aliter 11. Quare oportet alimenta, si non ex se, saltem ex admixtione condimenti reddi calida. Verum si ea esset ratio, oporteret etiam condimenta esse hu- mida, quod non apparet. Item oporteret eligere alimenta, quae essent in secundo calida. Item talia alimenta collocantur in gradu in ordine ad temperatum hominem, quare ab hu- mana temperatura non magis recedit opium, quam piper, sed causa est quia frigidum sensum tollit prima, de comple- xionibus.

Condimenti autem vsus est exercere sensum gustus, & sa- pore in alimento, quare par est plurima esse calida. Nec obstat, quod piper vt pote in quarto calidum interficit, nam alimentum iunctum condimento minimo, vix excedit tem- peramentum.

Colligitur secundo: cur ad omnia fere alimenta admitta- tur sal, ad multa acetum, ad non pauca aromata, & odoratae herbae, nam cum omnia fere alimenta pingua, & dulcia sint aut insipida, vt caro, pisces, olera, qua facile inducunt nau- seam, nisi salis adstrictione emendantur, in lentis autem qua- lia sunt pedes costi, pisces potissimum fricti, vel assi; in tali- bus enim magis conseruatur lentor, opportune admiscetur ad dissectionem acetum. Vtrumque enim & sal & acetum morfu suo excuscat vim gustandi, & saporem & famem, vtimur

Dd autem



autem aromatis, ubi cum suauitate odoris, & præter morsum  
pingentem, id ipsum consequi cupimus, verum apio, men-  
tha, coriandro excitatur sopita apperentia.

Quinta propositio: ex 3. aliment. 32. Proprium est cocto-  
rum omnium, ut si aliquam habeant facultatem eximiam, re-  
maneat, si non, ipsa maneat insipida. Unde apparet non recte  
ad dyacitoneum præcoqui cotonea; nec ad conseruas rosa-  
rum præmacerari feruenti aqua rosas; nec legumina in aqua  
abicienda per noctem infundenda esse.

#### CAP. VI. XXXXIV.

##### De Ictericis.

##### Cum Ictericis, &c.

**A**duerte primo: curandi icterici præcepta. Primum: quã-  
do sequitur ad auctam bilem, si causa est venenatus mor-  
sus intro, & extra alexiteria conueniunt, vulneri autem appli-  
cetur anus viuientis galli, vel pulmo hirci calens scissus, & re-  
petitus, parte autem superiori reprimens ex bollo armeno, cū  
strictura modica imponatur. Si verò causa est progressus bi-  
liosa febris curetur extinguentibus, & promoueatut crasis per  
aphor. quò natura vergit, eò ducere. Ictericis conspectu pal-  
lidorum sudorificis, balneo, frictione. Sicut si causa est calor  
cuiuspiam membri, refrigerandum est, vndeunque autem  
aucta sit bilis, vacuanda est, lenius aut validius, pro varietate re-  
nuitatis, aut impactiois ejus.

Secundum: si causa ictericæ est non copia bilis, sed ob-  
structio in hepate, aut vesica fellea, crebrius procedendum est  
cum deobstruentibus, interpositis colagogis crassæ bilis, &  
vomitibus à cibo, & sectione saluatellæ, secus si causa est debi-  
litas hepatis, in expurgando, hepar roborari oportet.

Tertium: in icteritia nigra, si sequatur copia melancho-  
liæ



lia in corpore similiter procedendum est melagolis, & ablatione causae multiplicantis melancholiam, & tandem emendatione relictis intemperamenti. Sicuti si causa icteritia sequitur ab obstructione hepatis, aut lienis, ultra dicta frequentanda sunt deobstruentia validiora, quam in icteritia citrina. Quod si causa est debilitas tractricis in liene, roboranda est per siccas cucurbitulas, & emplastrum de fermento impositum.

Remedia.

**P**rimum: lenissimum bilem euacuans cum deobstructione. ℞. cast. ʒ. iij. succi rosarum ʒ. ij. aqua endiuia ʒ. iij. Validius continuis diebus sumat jejunus aqua cichoria ʒ. iij. vini albi ʒ. j. Rhab. infusi & expressi ʒ. ʒ. Vel tertio quoque die ante canam deuoret ʒ. j. aloes nutriti in aqua endiuia. Vel in bile crassiori in aqua apij.

Secundum: valida purgatio in bile crassa. ℞. aloes, rubia, agarici ana ʒ. ʒ. salis gemmae gran. x. diagridi gran. iij. Vel electuarij de psyllio diaphynici ana ʒ. ij. Vel aurcarum ʒ. ij. Vel electuarij de succo rosarum, euacuat enim bilem, & maxime commendatur ad passiones hepatis.

Tertium: deobstruentia sunt feri ʒ. viij. sumatur diebus 20. vel bysantini ʒ. ij. feri ʒ. iij. Validius: vini albi, aqua cichoria ana ʒ. j. foliorum marrubij, cuscute ana manip. j. ad consumptionem tertia collatum, sumatur quotidie ad ʒ. iij. cum ʒ. j. oximellit. Validius: aqua raphani stilaritia, cum dialaca, & deobstruentia hydropis.

Quartum: pallori oculi manenti, benefacit odor acetissimi, in multo autem calore rosacea infusa sicut in frigore succus raphani, vel faniculi.



Dd ij

De



**A** Duerte, de pane inter alimenta. Propositio prima: ex 2. acut. 34. Quibusdam est in usu polenta græce alphyron; alijs maza; vocat Plinius pultem lib. 18. cap. 18. Alijs plurimis panis. Ex quibus polenta erat farina hordei non integre maturi, sed tosti, omyllis autem idest cruda farina, significat antonomice farinam hordei non tosti, ejusdem ergo omnino farinae, sicut & alia cum dulci aliquo subacta veniebant in usum panis, qui mos adhuc inter aliquos Æthiopes seruatur sub nomine agum, antiquis massa, vnde videtur deducta nostra massa. Panis autem nomen vel à pania, vel à saturitate deducitur, vel à pan id est totum quasi vniuersum hominis alimentum.

Secunda propositio: differentia panis ex farinae varietate sunt, optimus siligneus, proximus similaceus, vel semidatiles, eo quod habet permixtum non nihil similaginis. Est autem similago semen, græcis symnon, pars tritici crassior nigriorque, quæ propter duritiem effugit molituram in cuspide grani sita, vbi residet vis seminalis, sicut in cuspide oui.

Tertia differentia syneomixtos, nobis confusaneus (*de tota à farina*) cum permiscetur tenuis, & crassa farina cum fursu.

Quarta: fordidus vel secundarius, siue quia fiunt ex rolao, siue quia per ratum cribrum peniti sunt.

Quinta: fursuracei, canu eibus non hominum. Ex quibus prior differentia robustior, posterior mellioris succi, sed melioris concoctionis, & tardioris descendus per aluum, quare obstructis præfertur secundarius.

Tertia propositio: similiter etiam panis differentia à tempore. Quidam enim adhuc calens, alius recens est, nonnullus antiquus. Actu calens odore confert, sed in cibo reprobus est. Nam ob flatuum crassorum copiam multam moratur in ventri.



Ventriculo cephalalgiam inducens, & sitim, & totius corporis distensionem 2. acut. 34. Cur autem in benignissimo alimento calor externus tantæ noxæ causa est, quia nonnulla alimenta constant ea mixtione, ut levis alteratio in prima qualitate mutet omnino substantiam in contrariam. Nam ouum calefcens parum alit, tenuem succum gignit, facile coquitur, & aluum emollit; magis autem calefcens, usque ad duritiem multum alit, crassi succi est, difficulter coquitur, & aluum retinet. Quod si frigatur, transit in cacochymicum. Sic lac & sanguis cum sint saluberrimi humores, ubi semel refrigeruerunt in venena abeunt. Sic in aqua, in pisce, & pane, & carne plurimum interest, sumantur ne gelida, an in frigiditate fontanæ, an tepida, an calida, an recalefacta: in pane enim lentissimus vapor expirans: reddit alimentum optimum post refrigerationem. Quandiu autem calet noxium. Altera causa apud Zoar in proœmio est, quia panis actu calidus communicat calorem ignis ventriculo resoluentem naturalem.

Nec obstat, quod multa alia ab igne calefacta ingeruntur, ut jura, & carnes, quia ab illis citissime evanescit calor ignis, secus in panibus, cum propter multum lentorem diu duret, indicium quod extra tardissime refrigeratur.

Nec etiam dictis obstat, quod quæ ingeruntur quamvis frigida, ab innato calore intus calefcant, partim quia talia ingesta antequam intus calefcant imprimunt externam qualitatem, partim quia jam expiravit calor noxius, partim quia perducuntur ad moderantiam innati calidi in noxiam. Recens autem non calidus optimus est, is intelligitur unius diei, apud Zoar. apud Ras. vero, & Isaac etiam duorum dierum. Licet alij moderatius etiam laudent triduanum; antiquus vero amittit innatam temperiem, minus alit, & tardius descendit, ob resolutionem innati humidi, qua de causa etiam albior evadit, sicut & oleum antiquum, causa enim nigroris humiditas est 21. problem.;

Quarta propositio: est & alia panis differentia ex tritici va-

Dd iij rieta.



rietate. Nam ex tritico quoddam est tenuius, rarius, candidius infimæ notæ (*gallego*) ita appellatum, à conditione terræ sabulosa, & frigidioris. Is panis impuriori succo alit, sed quia minus lentus est, facilius coquitur, & distribuitur.

Alterum est aliquanto melius, paruum, durum, subflauum, friabile, non glutinosum (*tremes*) dictum trimestre, vel cetaneum, estque leuioris alimenti sequente, & facilis distributionis, apud Diosc. lib. 2. Causæ leuitatis, apud Teophrastum lib. 4. de causis plant. 10. Quia parum traxit terræ, ob paruum moram sub terra.

Præciosum autem triticum est densum, flauum, durum, (*mourisco*) & in eo genere præfertur o (*anafil*) est enim calidius ex indicio coloris 4. simp. ultimo, optimè & multum alens, & licet succo sit glutinoso, verum eget multo fermento, & multa subactione 1. aliment. Recte enim dixit Auicenna 2. can. de fermento, farinam tritici esse lentam naturam, non tamen arte, & in lib. de cuchia 6. Panis exactissime confectus gignit succum medium, tenuem, & crasse, non exacte autem confectus crassum, & glutinosum. Quare vniuersaliter ex 2. ad Glauc. 7. præferendus est panis ex hoc generoso tritico, otiose verò viuentibus præfertur cum mixtione vilioris illius rari. Non ergo consentiendum est Isaac in vniuersalibus asserenti ad sanitatis conseruationem, præferendum esse (*gallego*) licet ad robur præstet (*mourisco*.) Multo minus consentiendum est Hispano in communem asserenti, quod generosum triticum, quia habet parum surfuris, habet medullam immundiorum, sicut pisces non scamati. Nec Auicennæ standum est 2. canonis eligenti granum medium rari, & densi.

Quinta propositio: est etiam alia panis differentia, ex assatura. Quidam enim in clybano coquitur amplo, daturque testaceus panis, prælatus reliquis, quia paulatim, & æqualiter ex omni parte coquitur. Sequuntur panes igniti, vel furnacei (*de fornalha*) eo quod in angusto spatio ante extrema vruntur, quam medulla integre coquatur. Reprobi sunt costi in testa



ita, quia à siccitate ejus immodice siccantur. Peiores subcinericei, nam & mal assodas ex eadem causa inter oua reprobantur.

Panis itaque electio est ex hoc, aut illo grano pro scopis dictis. Hyeme quidē magis ex solido: astate ex raro 3. 1. doctrina 5. cap. 10. Item ex farina recenti, putrescunt enim omnia tempore lib. de affect. Indiciū est quod farina tempore augetur, quia furfur putredine comminutum transit in farinam. *Ætas* autem grani media. Nam quod citant. Diosc. elegisse recentius. Nouū apud Auic. velociter impinguat; apud Isac gignit flatu, & lumbricos, quare vsque ad mensem non est admittendum, post annum item absumitur innata humiditas. Quare damnantur recentia, & peruetusta lib. de ptyzana 2. Ex quo loco explicandum est, quod scribitur 1. aliment. de panis hordeacis, nullo femine vtendum esse, nisi diutissime seruato, fermento, & sale moderatē.

Nec contrarium est, quod 1. alimentorum scribitur appositissimos esse panes, qui plurimum habent fermenti, nam ibi separat azymos ab ijs, qui habent parum fermenti, & ab ijs qui plurimum, id est moderatum; Priores omnibus negat. Secundos concedit Athletis. Tercios ciuibus. Immodice enim fermentatum, ob calorem extraneum preparat ad putridas febres, ergo fermentum tenuat; sal siccatur; subactio scindit massam. Quare redditur facile costilis. Exsiccare autem fermentum, & sal scribitur lib. de affectionibus; ideo panes antiqui leuiore sunt, sal enim tempore siccatur 25. problem. 5. Vnde etiam venales panes inopes sunt vtriusque, vt graniores euadant. Subactio eo maior fit oportet quo subigendum est lentius. Quare in tritico prolixior, quam in hordeo 21. prob. 7. & in generoso tritico magis, quam in laxo; magis autem alit panis, qui subactior est 21. prob. 2. quia lentus panis in minutiora diuiditur plurima subactione, quare fit vndique igni penetrabilis. Cognoscitur fermenti modus si panis non euadit densus, non niger, non ampulosus, non ac-

idus;



dus; salis autem modus, si non grauis est; subactionis, si in  
 laminas soleaceas diuiditur; melior panis pars, medulla panis  
 modici. Crustra enim omnes qua parte ambusta sunt rejici-  
 enda sunt, & in carne, & in pane 4. acut. 102. & vniuersaliter  
 crustra omnis minus alit, & melancholica est, in regime-  
 ne scilicet. ( Non commendat crustam, choleram quia gignit  
 adustam. ) Magnitudo modica laudatur Isaac; quia cocta est  
 non exusta, de qua intelligendum est quod scribitur 2. diet.  
 & apud Tacuinum, maiores panes magis nutrire. Non pro-  
 batur etiam portio qua in fornace magis intumuit papilla in-  
 star (tuffo) nam creditur spuma, & incoctum massa, indicium  
 est quod est insuauior, & minus igne cocta; indicat tamen bo-  
 nitatem subactionis in pane, ob multum aerem contentum,  
 qui ebullitione ascendit. Melior est purior, & siligineus ma-  
 gis alit, apud Hippocratem lib. de affect. Galenum, & Aui-  
 cenam, & Isaac. Quare non standum Auer. 3. coll. 31. praferenti  
 confusaneum in tuenda valitudine, nam ratione solius des-  
 census praferendus erat hordeaceus. Et quod 2. ad Glauc. 7.  
 praefertur ratione medicamenti ad resolutionem, praefertur  
 enim quatenus alimentum, melior est item panis qui inter  
 subigendum multa aqua perluitur, & vndique cauatur, vocant  
*amassar*, & panem ( *moiete* ) quem Plinius lib. 18. cap. 11. ad ini-  
 tium videtur appellare aquaticum. Magis lentus est, & ad ob-  
 struções aptior, qui parum aquae recipit, & solum superfi-  
 cie tenus praeuitur, vocant ( *sonar* ) panem ipsum ( *Lombardo* ) à  
 regione, vel de *callo*, quia obcaluit. Minus alit, & magis sic-  
 cat nauticus vocatus, *biscotto*. Verum licet commendetur  
 mollities in pane, ob exactam subactionem, reprobatur ta-  
 men mollities comparata, ex plurima aqua, quo nomine com-  
 mendatur vulgo ( *pão duro daquelle dia.* )

Sed cur si panis est probissimi succi vulgo detur, omnis  
 saturatio mala, pessima vero panis. Dic est sententia, sine Au-  
 ctore, sed 3. 1. doctrina 2. cap. 7. in fin. panis si non conco-  
 quitur multo plus laedit, quam caro si non coquitur. Et vide-

tur



tur causa, quia inclinat per cruditatem ad obstructions validas, & frigidas, caro verò è conuerso, quia minus solet sumi de carne, ob pinguedinem innatantem.

Septima propositio: panis lotus redditur facilis coctu, & cum saccharo sitim extinguens 1. aliment. imbecillimi aliment. apud Celsum lib. 1. cap. 20. inducit appetentiam, & nullo modo obstruit 13. 3. tract. 2. cap. 7. Quare in internis inflammationibus repetendus est, ob ablatam vim fermenti, ex quo timetur ruptura crudorum tumorum, redditurque temperatum, apud Galenum citat. imò 2. can. infrigidat.

Cur autem frigida quæ febricitantes lædit, & res omnes reddit grauiore, panem reddat leuiorem febrienti. Vna causa est refrigeratio, & humectatio extinguens calorem siccum salis, & fermenti, quæ duo, sicut conferunt ad lentæ massæ extenuationem, ita post operationem sufficientem commodè extinguuntur.

Secunda causa, quia illis perfusionibus succus lentus panis diluitur, & abit in loturam, remanetque panis minus alens, & nihil obstruens, & quemadmodum triticum in parando amylo crebris profusionibus redditur subfrigidum, & leue edulium, ita panis per loturam, ideo etiam ad loturam eligitur panis non recens, scilicet vt exsiccata aquea humiditate per remanentes inanitates facile desuat dilutus succus. Est autem artificiosa lotio si primum abluitur in calida, inde speratur maior absterfio salis, & fermenti. Secundò, cum fontana perfrigida; tandem si placet cum rosacea additis granis punici dulço, acidi.

## CAPVT XXXV.

## De Hydrope.

**A**duerte primò: methodi curatoriæ præcepta. Primùm: victum oportet esse, aut calidum, aut frigidum, propter

Ee vari-



variā morbi causam. Verum propter causam conjunctam hydropis, quæ perpetuo frigida est, magis inclinet in frigida ad calidum, quam in calida ad frigidum. Potissimum oportet esse parcissimum, & exsiccantem, potum multo pauciores. In frigida causa vini aquosi meri, in calida autem cichoreæ, aut chalybeatæ. Indiget enim hic morbus victu durissimo, ita ut si fieri potest in totum non potetur. Habes præclaras historias de ea re, apud Celsum lib. 3. cap. 21. & Beniuenum in lib. de abditis curationibus cap. 13.

Secundum præceptum. Vacuantia frequentia, sed benedicta, ne vis defecta exhauriatur, purgent autem varios humores, in quos degenerat vitiosus sanguis, permisceanturque illis, & sequantur quæ roborant membra naturalia, & virtutem naturalem. Phlebotomia autem in hypposarca succedente ad inflammationem visceris, vel ad retentionem consuetæ hæmorrhagiæ conuenit, sed paucior, ratione calidi innati pauci. Quare si non adest hydrope, & ob crassitiem, pituita paretur foramen amplum, præstatque ut præcedat æquatio humorum leni purgatorio.

Tertium præceptum. Coquentia, purgantia roborantia sibi mutuo succedant, ita tandem cesset natura aliquando ex medicamentis ex capite de melancholia, varientque medicamenta, ne consuetudo infirmet vires medicamenti.

Quartum præceptum. Exhauriatur materia, particulatim omni ingenio, & sudoriferis, & impositione cucurbitæ siccæ ad umbilicum, & ventrem, & emplastrum trahentium, ita cum multis frictionibus luminis in balneo, prouocetur aqua aschyrtis ad scrotum. Item imponantur varia vesicatoria in ventre, & scroto. Præterea varie purgetur vtrumque membrum, vel quod præstat setoneo perforetur.

Postremo: proposita prædictione cauteria infigantur ventri. In hyposarca verò paretur resolutio per cutim, etiam per stationem ad solem recto capite, & per sepulturam in calida arena.

*Remedia*



## Remedia.

**P**rimum: vacuatio frequentanda in hyppofarcha, ℥. pillularum de hyera ʒ. j. agarici ʒ. j. In aschyte verò pillularum de rhab. ʒ. j. & β. reformatur cum succo ireos. Validius: succi ireos defacata ʒ. β. mulsæ vel seri ʒ. j. & in valido calore infundatur in succo trium sandalorum ʒ. j. & collatum detur. Item in clystere aschyti addatur succi dicti ʒ. β. in clystere autem hypofarchyci, hyera, logodij ʒ. β.

Secundum: coquentia, & deobstruentia in frigida causa sunt absynthinus, & validius de cupatorio; aquæ autem sunt cuscuta, & apij. Item quotidie dialacca ʒ. j. vel trochiscorum de cupatorio, vel de Rhab. tantundem, vel aromatici rosarum ʒ. β. In causa autem calida syrup. de endiuia Gent. & oxifach, & aquæ sint lupulorum & cichorea, electuarij trium sandalorum. Validius, trochisci camphorati.

Tertium: imponenda sunt ventri limaciæ contrita cum punice, vel sterçus caprarum cum vrina infantis, vel vacinum cum sale, & sulphure, ita vt huiusmodi non tangerent hepar.

Quartum: edemati extremorum subuenitur lotione lixiuij, & vino albo, vel in aqua salsa bulliant germina ebullorū, cū quo lauentur extrema, & linteo imbuta supra ponantur. Et nota duas esse hydropis species; alia quando à debilitate hepatis sanguis pituitosus genitus in totum corpus mandatur per venas, & hæc est huius affectus sedes.

Alia species est proueniens ab aqua hepatis genita à defectu caloris hepatis tanquam à causa immediata, tanquam verò à causa mediata, vel à frigiditate aquæ sumptæ jejuno, vel à calore feruentis, seu ardentis febris, vtroque destruyente calorem hepatis.

Ee ij De



## De Carnibus.

**A** Duerte secundò: de carne propositiones. Prima, de collatione carnis ad panem optimum scilicet eduliorum. Dic: quod attinet ad nutritionem plus alimenti est in carne, quam in vlllo alio edulio. Cels. lib. 2. cap. 18. Eo quod caro est multo similior naturæ nostræ; ob suauitatem, pinguedinem, & dulcedinem magis trahitur à membris, quare plus pane reponit.

Dic secundò: quod attinet ad difficultatem coctionis cum caro magis alat, magis renititur coctioni, ex traditis 7. therap. 6. Argumentum est, quod infantes panem concoquunt, carnem coquere non possunt dixit Azarab. 26. præf. cap. 2. & morbosissimi sunt voraces carniū, vel vinum immodicè potantes, quare vtrumque difficulter coquitur, alterum ob crassitiem, alterum ob copiam: præterea sanissimi degunt homines in intemperata regione, Indi, Æthiopes, solis fructibus, & paucis piscibus vescentes. Ideo & Tralianus lib. 12. de syncope ex crudis succis, cognoscit copiam crudorum ex præcedente saturitate fructuum, vel carnis.

Dic tertio: quod attinet ad succi bonitatem, optimi succi afferuntur panes exacte confecti, & aues 3. aliment, crassi sunt enim non exacte confecti, & terrestria, quare in bonitate succi paria videntur. Distant quod succus panis vergit ad crassum, & pituitam, carnes autem & ad tenuem, & ad bilem. Cur ergo magis conceditur in morbis panis quam caro? Dic, in calidis morbis plus panis conceditur, quam carnis, in vtrisque aliquanto magis panis, ob consuetudinem.

Secunda propositio: de collatione carniū secundum genera summa volatiliū, aquatiliū, terrestriū. Itac vniuersaliū 29. opinatur stirpes cum quiescant intra terram grauiſſima omnium alimentorum, plus obtinere grauium elementorum mixtione, quare gignere terrestres succos. Volatilia



lia autem cum plurimum moueantur in aëre abundare elementis leuibus; post quæ pedestria sequuntur, ut pote in aëre per terram gradientia. Aquatilia autem cum moueantur in graui elemento superant in elementis grauib; non tamen sine permixtione multa leuium. Quare opinatur testudinem, ut quam minima sui parte gradiatur, modo in aqua, modo in aëre esse æquale ad pondus. Sed huiusmodi rationes ad indagandam temperaturam petitas ex longinquis, & dubijs principijs detestatur Galenus 1. & 2. simp.

De varietate autem assumpti. Dic: dominium vnus elementi supra reliqua in mixto, aliud consideratur, quoad temperamentum; aliud quoad quantitatem, aliud quoad modum motus. Nam in mixto aliud est qualitas singulorum elementorum, aliud quantitas, aliud compositio organica; ad victoriam ergo elementi per qualitatem, sequitur temperamentum, in pipere calidum, in marina siccum, licet quantitas contrariorum elementorum utrobique vincat, & de talibus dixit 3. simp. 14. quod copia fallit gustum, & tactum. Nam marina iudicatur humida, cum siccat vehementer, & piper terreum cum adurat; id quod accidit, quia plus potest moles intensi, quam multa remissi. Tactus autem, & gustus iudicant per simplicem molem. Modus autem motus in mixto, alius est qui debetur mixto, ut mixtum est, & is sequitur molem elementi dominantis, quomodo quæcumque apud nos mixta sunt, graui habentur, cum plurimum habeant terræ 4. meteor. 1. & animalia omnia plus homine, unde & bruta dicuntur, quia apud priscos terra *bruta*, appellabatur 12. de partibus animalium 10. Alius motus conuenit mixto, ut animatum, & certo modo organicum est, quomodo gressilia, cum consent binis cunibus supra terram gradientur, volatilia propter expansas alas in aëre, aquatilia propter branchiarum ductum in aqua.

Quare ex hoc modo motus non licet colligere temperamentum, sicut nec ex compositione qualis alia colligi po-

E c iij      test



test 2. de temp. in fine. Sed cur si animal est similius animali, quam planta, non nutritur melius homo ex serpentibus, quam ex furmento. Nam 1. aliment. & 6. de sanitate 2. causa alendi similitudo est. Dic: actualis similitudo major reperitur inter animalia, cum quæ tamen jungitur quandoque maxima dissimilitudo potentialis. De collatione ergo dictorum generum. Dic: leuissimum alimentum præstant pisces, 2. aues, graue autem terrestria. Vna causa est, quia natura vnicuique animali præstitit multum ejus elementi in quo debebat moueri, vt ex parte mixtionis, & non solum gratia compositionis essent apta suo modo motus. Quare volatilibus indicium est plurimum aëris; piscibus aquæ; gressilibus terra.

Altera causa superans priorem petitur ex exercitio eorum, agilime enim & multum inter animalia mouentur pisces, propterea quod medium aqueum facile secatur ob tenuitatem, & potest eos sustinere, ob aliquantam grauitatem, paulo tardius mouentur aues, quia licet aër facile cedat, tamen non potest dici eas sustinere. Tardissime omnium mouentur pedestria, ideo facilina coctionis piscium carnes sunt, deinde auium; pedestria autem fere omnia rejiciuntur in lib. de cuchia, & de attenuante victus ratione.

Tertia propositio: de differentia carniū penes ætates, licet sint recentissimæ, nam sicca fugienda sunt tanquam excrementitia, lib. de cuchia. & 8. therap. 2. Ras. particularius 3. cont. de carne, intra vnum mensem edendam non esse; si verò animal humidum est, quandiu lactat edendum non esse; si siccum, tunc est optimum, & suauissimum, transacto tamen mense. Quod ergo scribitur, apud Hippocratem 2. dietarum vigentia animalia meliora esse iuueniculis, sensum dictum habent. Rursus caro decrepita edenda non est vniuersalium 14. habet enim multa excrementa, fibrosa, & crassa, difficulter coquitur, & parum nutrit, est etiam melancholica; demum materia est morborum, apud Zoar. in proœmio; ita vt etiam in piscibus quantumuis natura humidis reprobetur

tur



tur vetustas. Ex duabus autem aetatibus residuis adolescentia, & iuuenta, nisi qui sumit validus sit, & exercitetur, praestat adolescentia 3. aliment. ad initium peculiariter autem in aui- bus requiritur recentior aetas, propter siccitatem tempera- menti ad nos collati 6. epid. 2. 15. sicut in piscibus aliquanto prouectior, propter temperamenti humiditatem praefertur.

Quarta propositio: de differentia carniū penes sexum. Apud omnes minus recrementitij, robustiores, & melioris succi sunt mares, etiam si ex natura sicci sint. Excipitur capra quae ob hyrci acrimoniam magis laudatur, & gallina propter galli salsuginem.

Nec obstat, quod in siccis speciebus praefertur aetas ju- nior 2. idem iudicium videtur de aetate, quod de sexu, quia sexus addit robur innati calidi, aetas non addit, quare licet ra- tione temperamenti commodior esset vacca, ratione probi- tatis succi, & innati caloris praefertur bos. Causa differentia inter hyrcos, & boues est; quia licet bos sit sicciior hyrcio, bos tamen in suo genere plurimum asseruat excrementi 4. Al- manfi. Cujus iudicium est natura lactis ejus, quod tamen in capra laudatur. Et videtur causa excrementorum ejus moles magna corporis cum summo otio, unde vniuersalium 24. praefertur bos vaccae; a quo tamen excipienda sunt vaccae His- panae, etiam teste Hispano: Est apud nos vacca melior boue, eo quod non ita atteruntur immodico labore aratri cum ser- uentur ad generationem.

Pulli vero in febribus eliguntur supra pullas ob causas dictas, & ob timorem putrefactionis, & quia magis solvunt, secus esset, ubi timeretur magis magnitudo caloris.

De castratis autem. Dic: licet apud Isaac vniuersalium 30. & 31. & in particularibus habeant indicium medium inter mares, & feminas, quare in animalibus humidis praefertur non castrata, videtur tamen quod vniuersaliter exsiccatio red- dat animalia meliora. Nam in auiibus etiam Isaac concedit, in quadrupedibus omnibus dixit Galenus 3. aliment. 1. & cap. de testi-



testibus, idem apud Auic. 2. can. de carnibus, & Aët. Ratio est continentia reddens carnem suauiorē, meliorem, coctibiliorem; quæ indicatio fortior est, quam indicatio temperaturæ considerata ab Isaac; damnantur enim perpetuo cocuntia. Quare in æstate multæ carnes fatent, eo quod libido animi, & multo magis excretio seminis agitat humores infectos, qui semper in vasis reperiuntur, & multo magis vapor ipse seminis communicatis carni. Adde quod excernitur etiam humidum vtile, quare multo deterior, & sicciore caro est. Non est tamen omnis ætas appositæ ad castraturam, in valde prouecta propter frigiditatem inepta, similiter recens propter humiditatem, testatur Hispanus vniuersalium 33. arietem intra triennium castrandum non esse.

Num autem animalia etiam varient penes innatas intemperaturas intra vnam speciem sicut homo. Dic: minus homine multo. Nam compositio humana, & similitudo ad parentes multo plus variat in homine, quam in reliquis, siue ob varietatem phantasmatum, siue ob carnis molliorem, & humorum tenuitatem, quæ multum varietatem suscipiunt 10. problem. 10.

Quinta propositio: de differentia syluestrium à domesticis aperte 3. aliment. & de attenuante præfert vnam speciem, syluestria ceu succi melioris, & minus excrementitia, licet duriora. Quare aper præfertur sui, maxime cum hoc animal sit natura humidum. Sic inter columbas præferuntur nutritæ in turribus, & inter gallinas, cortales. Prima ratio, quia syluestres magis exercitæ sunt. Secunda, quia minus edunt, apud Hippocratem 2. diet. & de affect. ad fin. Tertia, eligunt alimentum sibi familiarissimum. Quarta, degunt in aëre puriori. Cæterum fere omnes tanquam prauis succi repudiantur. Ras. 4. Alman. Auicena 2. can. Isaac vniuersalium 29. præstant domestica syluestribus nisi intelligantur de feris, reprobandi videntur.

Sexta propositio: de differentia quoad habitum carnis.

Vtraque



Vtraque extrema praua sunt. Pinguissima pituitosa est, & excrementitia; gracillima verò melancholica, emendanda autem sunt per condituram, vt macra elixentur, pingua asserantur, permisceantur contrarijs, pinguis arietina cum brasiça, arietina cum naps, vel cucurbita, licet ex parte aëtiuarum magis conueniat vacina cum brasiça, arietina cum cucurbita.

Item pingua aëtuosa sunt 2. dietarum, quare febrientibus numquam concedenda, ideo cutis ab auibus, & magis à piscibus auferenda est, quia substat pinguedo; & ex iure tantisper refrigerato prius pinguedo exsuflanda est; sua enim natura caro omnis etiam citra pinguedinem facile inflammatur, ideo febrientibus noxia 4. Almanf. Sed videtur sus non obferuare dicta, quia cum sit humidissimus, & frigidus, perpetuo castratur, eligiturque valde obesus. Dic: ob libidinem immodicam damnatur non castratus, fatet enim, eligendus est enim pinguis, sed admodum modice, quia id inest illi secundum naturam 4. acut. 102. Vulgus autem eligens pinguisimum, quarit commoditatem sumptuum.

Septima propositio: de differentia ex colore. Legitur 2. dietarum: hirta nudis meliora sunt, & nigra albis, quoniam nigredo, & hispiditas germina sunt caloris. Idem Aët. lib. 2. 88. & 2. can. de carnibus, & experimentum potissimum damnat albas gallinas tanquam insuaues, & tarde coctiles. Videtur autem ideo plus reprobari albedo in gallinis, quia durities carnis earum requirit calorem attenuantem. Quare non est standum Aristoteli 5. de generat. 6. ostendenti alba animalia calidiora esse, & suauiora.

Nec valent rationes illius, quia calor innatus imbecillus est, non exurens vaporem, efficit pilum albū, exurens autem nigrum, ideo nigra, & crispa magis cocta sunt. Partes autem ventrales albescent, propter pinguedinem omenti substratam. Albertus autem 19. animalium cap. 8. interpretatur apud Aristotelem nigra suauiora esse, quod litera non patitur. Quod

F f item



item apud Diosc. lib. 2. cap. de felle commendatur fel gallinæ candidæ ad suffusiones tanquam potentius. Dic: Galenus recitat 10. simp. totam illam sententiam, retinet tamen de albedine, siue quia illud verbum irrepsit, siue quia rejicitur à Galeno.

Octaua propositio: de differentia ex situ partium. Dic primò: externa internis meliora esse, quia in externis recumbunt, & quia illa exercentur, & quia ad solem coquantur non in umbra, & quia per poros magis purgantur, & quia motu ossium colliduntur.

Nec obstat, quod excrementa mandantur ab internis, ad externa, quia mandantur vt dissoluantur, non vt ibi maneant, & mandatur ad cutim cuius alimentum non probatur, nam fere extrema pauco succo abundant, vnde prauorum animalium cauda, capita, dentes, oculi, deleteria sunt, in alijs vitiosa. Quare columbarum capita, & cauda damnantur, & cucumerum, & peponum extrema pessima sunt, imò in lactucis foliorum cuspides insuauis, & glans superposita ano gallinarum; videtur enim natura semper prauos succos ad ea extrema delegare. Verum licet cutis inter reproba numeretur, subtracta tamen caro, & ossibus vicina merito praefertur propter causas dictas, & quia origo alimenti nondum integre confecti est in visceribus. Partes verò externæ defecato alimento viuunt. Vnde sunt & robustissimæ, id est plurimum alentes, contra animalium extrema leuissima, id est nimium alentia 2. dicit. non tamen oportet semper externam carnem molliorem esse. Nam pulpæ pectoris internæ longe tenuiores, & suauiores sunt pulpis externis, & carnes sub vertebris lumborum, magis quam supra vertebrae: causa est in his internis propinquitas ad ossa, & ad calorem cordis, & renum, sed illa est validior positio fibrarum transuersarum duobus internis citatis; ob breuitatem enim tales magis exercentur, & tenerescunt.

Cur autem lumbi in quadrupedibus; in auiibus pectora

fin t



sint meliora. Dic: quia illa in suis motibus exercentur. Dic  
secundò: caro iuxta ossa suauior, & pinguior est quia ob mo-  
tum tendonum ad ossa colliduntur, & ob medullosum alimen-  
tum ad ossa tractum pinguescunt, & ab osse vicino contempe-  
rantur. Afferitur etiam quoddam pro causa repurgatim ob  
melancholiam ab ossibus tractam in ossis alimentum. Nam  
4. de part. animalium 2. caro iuxta ossa suauior est, sicut pars  
jecoris iuxta vesicam felleam dulcissima. Sed constat ex 3.  
naturalium ad finem, & lib. de locis in homine, ossis genera-  
tionem, & alimentum esse partem sanguinis pinguis-  
simam, in-  
telligenda est autem melior caro iuxta ossa in animali, vel sic-  
co, vel temperato, nam in humido, vt in ariete deterior est ob  
muco-rem.

Dic tertio: anteriora praferuntur posteris. Cor ob exerci-  
tia respirationis, & vocis, & ob sanguinem depuratum, exci-  
pit Isaac, in particularibus suem, cuius anteriora illaudabiliora  
sunt, ob nimiam pinguedinem pectoris, & ob nimiam ampli-  
tudinem cerebri humectantis, & quia posteriora habet ex na-  
tura sua robustiora. Excipiendus est, & cuniculus, eleuat enim  
in cursu magis posteriora, quare exercitiora sunt, & melio-  
ra. Item hyrcus, quoniam cum pascatur in locis accliuibus inni-  
tatur posterioribus cruribus. Item in aestate reprobantur an-  
teriora arietis, cum enim prout incedant, puluere per os infla-  
mantur.

Dic quartò: dextra meliora sunt sinistris 2. can. & vniuer-  
salium 15. ob calorem hepatis coquentem. Infert Sauanarol. in  
practica, sinistra meliora esse in feminis; dextera verò in viris.  
Verum praestat asserere vtrique sexui eligendū esse alimentū  
purissimum quale est masculinum, & dextri lateris, cum hoc  
tamen taliter temperatum, vt conseruetur innata sexuum tem-  
peratura in lib. de victu priuat. 23.

Nona propositio: de ordine terrestrium. Excrementi-  
tia sunt, si conferantur ad volatilia, calida verò si ad aquatilia.  
De temperie verò carniū nonnihil dissident Auctores. Nam

F f ij 5. coll.



5. coll. 24. afferuntur pullæ adolescentes temperatæ homini, quo fit ut carnes ea frigidiores, ad hominem frigida dicantur, ut pullus, sus, hædus, perdix, & 24. continent. hædus naturis calidis commendatur tanquam refrigerans.

Præterea multæ parturientes, & senes abstinere ab his propter dolorem ventris qui ad illas sequitur. Verum apud Haly 5. theor. 21. omnis caro calida humida est, item ratio, sanguinis abundantia. Præterea experimur à quavis carne comesta reddi nos calidiore, quam à pane, & tamen panis asseritur à medicis calidus. Quod autem carnes dictæ aliquos refrigerent, non est certum sui frigoris argumentum, nam quæ alimenta proxima temperamento sunt pro varietate sumentis, quosdam refrigerant, quosdam autem calefaciunt. 1. alimentorum.

Primus ergo locus inter pedestria tribuitur hædo, & paruo cuniculo (*laparos*) sunt enim facile coctiles, ideo cibi conualescentium in particularibus vocantur. Dixit autem Tacuinus hædum vocari usque ad mensem sextum, & hyeme quidem primum esse, æstate bonum, medio tempore mediocrem.

De sanguine autem quem gignit controuersia est, vulgo enim creditur hædum gignere tenuem sanguinem, & videtur, quia lib. de ten. solum hædum concedit inter quadrupedes, & quia citissime refrigeratur. Verum Haly 5. theor. 21. illum medium & humidum, & sicci, ita tenuis & crassi. Galenus verò 6. epid. sect. 3. 22. inter incrassantia numerat, quæ controuersia, ut multæ huiusmodi diluenda est, propter mediocritatem succi quem gignit.

Secundo loco numeratur vitulina maxime lactens, coquitur enim aliquantulum difficilius hædo, sed magis alit, & suauis odore reficit, qui in hædo displicet.

Tertius locus est arietis annalis, aut si adultus est castrati nigri, & magis in vere: caro est excrementaria, labens propter calidum humidum vniuersalium 12. & 13. contrin. ideo à proprietate melancholicis conferens, additur & calidis naturis, quod



quod corruptum videtur, magis recipiendum est, ex Tacui-  
no, quod in talibus cum aceto paretur; peculiariter autem  
ut cuniculus in pituitosis, ita aries in melancholicis quadrat.  
In probatione tamen succi, aries praestat, commendatur tamen  
Haly 5. theor. 21. & magis Auer. 5. coll. asserenti esse carnem  
homini simillimam, unde per antonomasiam putant appella-  
tam (*carneiro*) & Auic. 2. 1. doctrina 2. cap. 18. exemplum bo-  
ni succi proponit arietinam, mali verò vaccinam. Idem tamen  
Auicena citat. putat esse crassi succi, & Haly cap. de lapide  
prohibet nephreticis tanquam alimentum succi crassi, qui-  
bus magis standum in nostris arietibus, quam Graecis locanti-  
bus illam infra vacinam, & annumerantibus illam cum hyrcis,  
& asserentibus vniuersim senibus esse noxiam, & quod parum  
nutrit. Quales sunt Galenus 3. de alim. facult. 2. & in lib. de  
attenuante 8. & 5. de sanitat. 6. item 6. epid. sect. 3. 2. & apud  
Aët. lib. 2. cap. 257.

Quartus locus suilla propter inopiam exercitiorum, li-  
cet apud Galenum 3. aliment. 1. obtineat primum locum inter  
pedestria, ob succi bonitatem. Immodicum etiam est, quod  
Celsus scribit lib. 2. cap. 18. leuissimā pedestriū esse suillā, gra-  
uissimam bubulam, licet enim multo facilius nutriat, quam  
bubula, non potest tamen nisi difficulter concoqui ex tra-  
ditis.

De temperamento autem variant. Nam vniuersalium  
31. ex consensu antiquorum, est frigidissima, & humidissima  
pedestrium, indicium est copia pinguedinis, & lib. de atra bile  
6. numeratur inter animalia frigida humida. Contra: indicium  
caloris est, quod optima in Flandria, & frigidis regionibus, &  
apud Theophrastum lib. 1. de causis plant. 27. sola ex calido  
genere carnis, & sus partu numeroso notantur, & 5. coll. 30.  
animalia fecundiora sunt. Præterea volutantur in aqua, & ca-  
no, robusti sunt, & sanguine pleni, temperati verò asseruntur  
4. acut. 101. Videtur quod in vniuersa substantia, & inter ani-  
malia sus calidus sit. Verum in ratione alendi hominem, fri-

Ff iij      gidus



gidus est non valde, ita vt magis mereatur diei temperatus. Cum enim omnis caro, vt alimentum est recedat per calorem, sus collatus ad cetera animalia est frigidus, quare erit temperatus homini. Vnde etiam experimentum, quod in sanguine humano faciendum erat licet exequi in suillo. Adde quod sus instar hominis quantitate calidi innati valde calet, qualitate verò remissus est 10. probl. 21. Quoad aetatem autem ijs qui modice exercentur, eligitur adolescens; valde autem exercitatis vicens 4. acut. citat. sicut in totum fugiendi sunt in nō exercitatis Isaac, in particularibus, quare nō recte idem Isaac, iuuenes suos vniuersaliter praeferat adolescentibus, nec minus errat vulgus simpliciter eligens maximum, & pinguisimum, oportet enim vt non accedat ad aetatem victimae 4. acut. Ea est explicante Langio epist. 61. supra bimatum, sicut è conuerso porcelli reprobantur. Nec admittendi sunt nisi raro asini, & ablato corio 4. acut. cit. praestat autem omnis suilla non expers salis, apud Oribas. lib. de confectione ciborum; si verò valde diu macerata est, aut sale, aut fumo, dixit Arnaldus in regimine, deterior redditur valde calefaciens, & siccans.

Quintus locus: leporina, damina, vaccina, caprina. Leporina verò 2. can. calida est, & lib. de attenuante gignit vehementer crassum succum, nec bonum, melior tamen est, quam bubula 3. aliment. de init. adstringit ventrem, apud Aët. lib. 2. cap. 233. Sequitur dama (*corso*) vel (*gamo*) quae licet melancholica praefertur vaccae 23. continent. 1. vnde etiam vaccina nutrit minus quam suilla, & difficilius multo 3. aliment. citat. coquitur; cohibetque aluum, quam suilla lenit, apud Hippocratem 2. dietarum. Demum inter omnia quae eduntur, non bonam praestat alimoniam, estque earum natura inseparabilis, & praestat vti ea cocta, & peruetusta 4. acut. 99. id est longe ab occisione (quod ibi interpretes non assequuntur) sicut & reliquae carnes durae. Cuniculus autem aliquanto facilius lepore coquitur, sicut lepus paulo facilius, quam vacina. Verum fuligines melancholicas magis communicant corpori, quam



quam vaccina. Ius verò vaccinæ suauissimum est maxime, si non sit præcocta, & prohibet efluxum bilis ad ventrem 2. can. Causa autem suauitatis est medullosum alimentum relictum in poris. Præterea, quod transit melancholicum in alimentum carnis, sicut pari lac asinæ euadit tenuissimum. Sequitur caprinæ calidior, & deterior, quam vaccina, & adhuc magis hircina 4. acut. 10. & sequentibus. Ex quibus, & Plinio lib. 8. 50. asserente capras perpetuo febrile, non est standum Isaac, & Haly statuentibus eas frigidas, ergo nec præstat arietina, ob copiam herbæ teneræ, prima æstate vacina, pascuntur etiam adulta herba, postrema æstate castrati hyrci, ob germinum abundantiam commode admittuntur. Sunt tamen dempto ariete prauī succi omnia.

Sextus locus: est ferarum, ceruorum, leonis, vulpis, catulorum, licet in lib. de affectionibus, & morbis frequenter admittatur catullina, & ouilla etiam ad agrotantes.

Decima propositio: de ordine volatiliū. Aues omnes exceptis aquaticis fere boni succi sunt, minus alunt pedestribus, vniuersalium 26. minus excrementitiæ sunt, cum nec mingant, nec expuant, in quibus obseruanda sunt quatuor, primum sint aliquanto non valde profaginata. Secundo sint in hyeme hesterno occisa, per æstatem verò ex aurora mactatæ feruentur ad canam. Tertiò, adolēcentes sint. Quartò, adstringunt ventrem quomodocumque parentur.

Prima classis continet perdicem, attaginem, fasianum, pullum, gallinam. Ex quibus perdix optimi succi est, mediū inter tenuem, & crassum, lentum, & friabile, conueniens etiam nō exercitatis, temperamentum ejus 23. continet. calidum humidum est, augens sanguinem, & libidinem, qui locus corruptus videtur, est enim caro subfrigida, & ob odorem cordialis, & ita sicca tamen, vt etiam cocta sufficienter adstringat, apud Auer. 5. coll. de carnibus, & Isaac 1. 3. tract. 2. cap. 4. ob eam siccitatem timetur febrientibus, & ob eandem eligitur tempore macerata juxta illud (*o coelho, & a perdiz.*) Nam sicca  
omnia



omnia tempore humescunt, sicut in alimentis humidis, nihil aduersum magis est, tales sunt pisces, hadus, aries, pullus; factor autem carnis semper reprobatur, sed maceratio sicci animalis significat optimam teneritudinē, ideo etiam apud Ras. in 4. aphor. 30. præferuntur perdices cum aue captæ, eo quod per aucipium atteruntur, ideo etiam parvæ multo meliores sunt (*perdigotos*) viuunt etiam perdices annos 21. columbæ 8. palumbi 40. 6. de hist. animalium 4. & lib. 9. 7. Quod autem 2. can. scribitur nutrimentum gallinarum non esse cum nutrimento perdiciū, non videtur recipiendum, quasi perdix magis alat, est etiam succus perdicis tenuior, & minus lentus, & facilius coctilis, sed quasi perdix velocius alat, & plurimum repararet spiritus.

Attaginem Castellæ (*francolim*, vel *framenga*) maior gallina, par bonitate. Fasianus verò Italis frequens suauior est gallina. Gallinas adolescentes Arabes omnibus auibus præferunt, asserentes esse similimas naturæ nostræ, & in cibum quotidianum recipiendam gallinam antequam coeat, gallum antequam cantet, indicium est quod jus gallinum præclarum medicamentum est elephantiacis. Oribas. tamen in lib. de confect. cibi, & Galenus de attenuante dieta, dixerunt non esse tutum vsum illarum non exercitatis, & Aët. lib. 2. cap. 231. & 251. & Tralianus de diaria ex obstructione ait difficulter coqui, & conuenire ventriculo valde calido, inter aues etiam inclinant ad calidum. Quare in hyeme aptiores iuxta illud (*se soubesse o villão, &c.*) Est autem apud Ras. 4. aphor. pullus gallinaceus succi melioris, coctionis facilioris, & habet peculiarem vim temperandi humores, apud Diosc. & Auic. Præuus est, & demittendus antiquus gallinaceus Ras. 4. aphor. sicut capus præstantissimus, quia habet puritatem à sexu, teneritudinem autem à castratura. Ius autem gallinæ adstringere dixerunt Diosc. Isaac, Paulus. Galenus verò, & Psellus fatentur se expertos. Quin etiam carnem galli adstringere 3. simp. 15. Quare jus gallinæ pro lauatorio pharmaci suspectum est, & quod



quod Cornar. ii. simp. conatur emendare locum Galeni, vt pro verbo (adstringit) legatur temperat; non conuenit, partim quia ea sententia reperitur apud omnes citatos Auctores; partim quia ex opposito ait soluere gallos, adstringere verò gallinas. Commendatur apud Arabes gallina, tanquam augēs cerebrum, & intellectum, forte ea causa, vt nobiles prudentia antecellant. Quidam autem interdunt noctilopis gallinas, quia gallinæ hoc morbo laborare videntur, cum ad vespere cubant; quidam etiam timent illas in podagricis, argumento quod saepe laborent podagra. Tacuinus verò deridet asserens illas colorem bonum gignere. Quidam etiam timent eas ob prauum esum. Dic: quod licet corpora reddantur similia ex parte alimenti, non tamen ideo noxa alimenti perpetuo viciat carnem. Nam sturnus nutritur cicuta, cerui viperis, ciconia serpentibus, apud Theophrastum, de causis lib. 4. cap. 10. Trochta phalangijs, vt pupa stercore, gallina vermibus, mulus cadaueribus. Sic animalia caesa jaculis venenatis, venenata non sunt, de theriaca ad Pisonem 13. scilicet circumscisa parte icta, licet vniuersa caro tenerescat vi venenis aliquando tamen accidit vt lædat, quod veneno nutritum est, quod legitur de coturnice 6. epid. sect. 3. text. 35. & de puella nutrita napello 6. 4. cap. 2.

Secunda classis, continet turdos suauissimos vbi pinguescunt, sed superioribus paulo duriores, & in eo genere magnitudine excedentes tordouas. Merula autem (*merloas*) licet odore ingratorum plus tamen turdis cōmendantur. Sunt & alaudæ duplices, vna non cristata melior (*vulgo lauerca.*) Alia cristata (*cotonia.*) Apud Aristotelem de hist. animalium 9. cap. 2. & Galenum 10. simp. corrupte dicitur vulgo landula. Vocatur & galarita, & turrta ea quæ cristata est. Sunt & turtures in hoc ordine quas Galenus 3. aliment. cap. de aliment. ex volatilibus relegat ad terriam classē, seu duriores superioribus; in lib. verò de attenuante præfert turtures gallinis, ob succi probitatem, & tenuitatem. Et gallinago (*galinhola*)

G g apud



apud Aristotelem 9. de hist. 26. 5. autem coll. æquatur perdi-  
ci, adhuc autem suavior est gallina Indica. De turdo autem  
illo magno meminit Plinius lib. 10. cap. 9. Columbas verò  
recenset Galenus inter leuissimas aues, ob carnis mollitiem,  
& probitatem, ita ut etiam ad pleureticos commendauerit 1.  
acut. 23. & Tralianus in erisipelate hepatis, & vomitu bilioso  
commendat pipiones (*pombinhos.*) Verum Arabibus omni-  
bus timentur, tanquam crassi succi, & abunde humidi, & ca-  
lidi. Nam quod legitur 1. dietarum. Ordo siccitatis anium, su-  
premi palūbi, inde colūbæ, tertio perdices, in hoc sensu solum  
videndum est, si per siccitatem difficultatem coctionis in-  
telligit, vel siccitatem carnis, quæ non excludit copiam excre-  
mentorum. Adeo autem calent columbæ, ut 3. aliment. 10.  
quandoque febrem inducant si frequentantur 23. continent.  
vehementer incendentes libidinem, & senum sanguinem ca-  
lescentes, iuuenibus, & biliosis fugiendi, nec sumendi, nisi  
cum multo omphacio, & in pastillio 2. can. cap. de colum-  
bis. Sunt ex illis autem paruissimi humidissimi, & grauissi-  
mi; indicio quod tardissime inter aues volant, iuuenes cali-  
dissimi, optimi sunt pipiones jam volare incipientes, nutriti  
in agrestibus columbarijs. Et miliares, vulgo *milheiras*, quia  
milio victitant, vel *passarinho de esparrella*, quos jungit perdici-  
bus 8. therap. 2. Quare Isaac in particularibus vituperanti eos  
tanquam sanguinem incendentes standū non est. Continetur  
etiam, & lusciniæ Græcis (*filomela, roxinol*) Continetur etiam  
carduelis, quia cardis pascitur (*pintaxilgo*) apud Plin. lib. 10. 42.  
Et ficedula Plin. lib. 10. 29. Græcis *psycalis* 4. acut. 10. (*papasi-  
go*) & melanchorifus (*papasi go negra*) quem putat Plinius fieri  
ex superioris mutatione; sed experti negant. Item motala, seu  
moricandula, Græcis *chyfa* 1. de art. 67. (*arneloa*) & coturnix,  
vulgo qualia, vel quiscula à sono quem humi volans edit, vitu-  
peratur, apud Isaac vniuersalium, ob referentem se ex esu illa-  
rum sensisse conuulsionem, sicut & apud Auic. 2. can. & Ga-  
lenum 6. epid. sect. 6. 31. Addit Plin. lib. 10. 23. frequenter cor-  
gipi



ripi epilepsia, ideo talibus cauendam esse. Quæ verò coturnix valde laudatur 5. coll. & 3. aliment. alia avis creditur. Sunt & melleagrides, vel gallinæ Numidicæ (*galinbas de Africa*) Plinius lib. 26. cap. 52.

Tertia classis: palumbi (*pombos troquazes*) duriores & excrementitij, anseres, & adhuc magis anates ultra multum calorem plurimam etiam humiditatem habent. Quare 2. can. cap. de carnibus proximæ sunt ouillis, &c. De anate, temperamentum calefaciunt, & calefactum febrile faciunt. Ex quibus solum commendantur alæ, & venter anserum, anatum verò hepar, apud Ras. 4. aphor. Pauo incoctilis 3. aliment. & nō boni succi 23. continent. Verum propter amplitudinem, & pulchritudinem est in pretio, commendantur et aromatis, & vino potenti eorum coctio procuretur. Grus ex Haly 5. theor. 23. nisi per dies maceretur lapillis ad crura suspensis, quod idem in reliquis duris obseruandum est, Tardæ Græcæ vocantur ocisdas, ob aurium magnitudinem. Galeno statuantur mediæ gruum, & anserum 3. aliment. vulgo (*abatar-da*) nomine Hispano latino, damnantur in cibis ob prauum odorem, apud Plin. lib. 20. cap. 22. Struatio, vel strueto camelus (*abestrus*) nomine Hispano latino (*hema*) longe durior, & grauior, deferebatur autem principatus tempore Plin. inter aues grui, antiquorum autem ciconiæ, apud Plin. citat. Est & in hoc ordine ypupa, apud Aristotelem lib. 9. cap. 15. Chariander gratia viatorum, ob cantus suauitatem (*calbandro*) nomine à Græcis deducto, & Regulus *Rei dos passiros*, & coruca Aristoteli, Aët. verò tragloditea lib. 1. cap. 11. Carricea Aët Græcis, otis, æquinoce cum iurdis, vulgo (*moch*) vel (*mofarda*) solus ex nocturnis esibilis, apud Aristotelem lib. 9. cap. 28. & Plinius lib. 10. cap. 23. Vulgo (*moch em lanciro, val hum carneiro.*) Apodes (*pedreiros*, vel *aiuoins de Arago*) Plin. lib. 10. cap. 39. & Aristotel. lib. 9. cap. 30. cuius species est (*gayo*) Numeratur etiam species cuculi in hoc ordine vulgo (*cucupega*) fœmina verò vocatur Arraca de quibus 9. de hist. 29. Item Anas a gressis, vulgo Gg ij (*lauanco*)



(*lauanco*) & fœminâ agrestis, vulgo (*Adebrana*) diuersa species est (*marreca*) licet multi concedant esse pullos, anatum agrestium. Item Corion, apud Plin. lib. 10. cap. 29. (*Aiuão*) item monedula (*frouua*) & merops (*abelheiro*) apud Plin. lib. 10. 33. meminit, & Virgilius 4. Georg. Sunt & passæres nomine generis æquiuoci, apud Plin. lib. 10. cap. 36. Arimpsitæ adurentes sanguinem, & prauis succi ob immodicam libidinem (*pardais*) & sturni reprobati 5. coll. ceu calidi, & agre coctiles. Quod ergo commendatur 6. de sanitat. 11. vel irrepsit id verbum, vel concedit tamquam alens citra excrementa, quod solum ibi intendebat. Item Alcedo aquatica (*massarico*) piscibus victitans, & in genere miluorum vocatus, *bilhafre em lanceiro*, *estaza capão de polleiro*. Gaiua (*gainota*) apud Plin. lib. 10. 31. & milgrus ibidem (*coruo marinho*) miluus, *minhoto*, Rysus, *gainão*. Picus martius, *peto*, apud Plin. lib. 10. cap. 18. & Aristotel. cap. 9. lib. 9. & sertia, *picanço aluar*, apud Aristotelem lib. 17.

Quarta classis: hyrundo, *andorinha*, accipiter, *fulcão*, in quo genere est triorches, vulgo, *hacra*, & *vlula*, *cornea*, & noctuus, *noutibo*, vel *âne dona*, quia habet amictum in vultu, apud Plin. lib. 10. cap. 8. Cuculus, *cuco*, apud Aristotelem lib. 9. cap. 49. Psittacus, *papagaio*, apud Plin. lib. 10. cap. 43. Coruus, *coruo*, ibidem ardeola candida, vulgo *meão*, cornix, *cornão*, graculus, *gralha*, bubo, *bufa*, osifraga, vulgo, *osifranço*, vel *frança*, *ossos*, apud Aristotelem lib. 9. cap. 34. Halyatos nobis aquila marina, vulgo, *guincho*, vel *aguia ribeirinha*. Tinunculus, *francelho*, apud Plin. lib. 10. cap. 37. Porphyrius, *camão*, pica, *pega*, *Ricticorax*, *morcego*.

## CAP. V. T. XXXXVI.

## De Affectibus lienis.

**A**duerte primò: meth. præcepta. Primum, si infestat lienem inflammatio, conuenit in initio oxirrhodinum, & phlebo-



phlebotomia, & lienis purgatio. Secundum, si infestat tensio, curat impressio valida cucurbitæ siccæ, fomenta & vñctiones resoluentia. Tertium, si adest obstructio deobstruentia conueniunt, quod si jungitur crassities humorum, adijcienda sunt emollientia.

Quartum, in dolore miti prius abigatur causa. Si verò validior est, prius sedetur per anodina, & si oportet per opiata.

*Remedia.*

**P**rimum: resoluens phyltrum infusum in aceto decoctæ ruta, cupressi, seminis agni, sulphuris, scolopendria, thamaristi.

Secundum: syrup. Radicum, oximellitis, de cichoria Niculi numero nouem. Purgatio fiat per agarici preparati ʒ. j. cum confectiōe hamec ʒ. iij.

Tertium: deobstruentia sunt; electuarium ex radice camepithicos, & cichoria contritis, melle exceptis, supra potato decocto cupatorii. Vel sumatur per multos dies decoctum, scilicet cupatorium, flores camomelli, radix filicis, eringij, folia anagalidis, & scordij & salicis, decoquantur autem in sero cum paucissimo aceto. Vel sumatur quotidie seminum agni casti tenui parte cribatorum ʒ. iij. Vel dialacea, vel pillularum de cupatorio majorum ʒ. j. Extra autem deobstruunt, & emolliunt oleum caparorum cum nardino. Validius est, diachylon majus, cum linino & amoniaci ʒ. β. dissoluti in aceto, & addito adipe anseris, oleo amigdalorum amatarum, ana ʒ. j. fiat lenimentum, vel solum amoniacum in corio extendatur solutum. Vel sterus gallinæ siccum tritum, cum oximellite coctum. Item lapis pyretes, aut molaris magnitudine tensa manus ignitus, aceto extinguatur, & inuolutus linteo sit impositus, vsque quo tepescat. In calido verò affectu coquantur in poscha farina hordei, lupinorum, fabarum.

Gg ii) De



## De Piscibus.

**A** Duerte secundò. Propositio prima : de bonitate succi illorum lib. de affect. leue edulium sunt, & lib. de euchym. fere omnes sunt boni succi, sicut aues. Pelagij verò id est qui non accedunt ad aquas dulces, nihil habent quod incuset, potissimum saxatiles lib. de attenuante 11. & 3. alimentorum, facile coquantur, succum gignentes medium, tenuis & crassi. Peculiariter 3. aliment. commendantur, & conceduntur in phrenitide, apud Tralianum, & Aureol. in hæmoptoisi, apud Tralianum in tertianarijs, & quartanarijs 1. ad Glau. cap. proprio in pleuriticis 1. acut. 27. & in hæctica ventriculi 6. therap. 6. & in lassitudine phlegmonosa 4. sanitatis in fine, & in diarijs 3. therap. 2. Quare in usu sanorum solum admittit Galenus panem, aues, pisces, lib. de euchym. ad init. Arabes verò, & vulgaris sententia, valde reprobant pisces. Nam apud Zoar. in proœmio, inter alimenta pisces senibus nocent, & 6. coll. ultimo, pisces sicut fructus fugiendi sunt. Cito enim corrumpuntur ex 3. aliment. 16. pisces omnes difficulter coquantur, morantur in ventriculo, & sitim inducunt ex 23. continent. sunt frigidi humidi, indicium, quod parum sanguinis habent, emolliunt nervos, & non conueniunt, nisi ventriculo valde calido 3. canon. cap. de piscibus.

Dic: de hac varietate ex proœmio alimentorum. Difficile est citra errorem, vniuersaliter pronunciare de bonitate & malitia alimenti, pro varietate enim sumentium variant. Lac enim, pisces recentes, oua mollia, & moram Galenus laudat, tanquam boni succi, quadam etiam pro optimis considerans, scilicet substantiam eorum ex se, scilicet quando ex parte sumentis non corrumpuntur. Verum si sumantur ab immundo ventriculo, vel corpore, vertuntur in prauas qualitates, vnde plurimi morbi oriuntur. Quare sententia Galeni de dictis



dictis alimentis. in illis solum exequenda est, in quibus habetur certitudo de vtraque immunditie dicta, non secus. Quod ergo particulatim incusantur, ceu prauis succi, ostenditur in vlcerosis, quandiu enim edunt pisces non sanantur, & vlcera madescunt, & dilatantur, ex carniū vērō esu sanantur. Præterea extra citissime corrumpuntur, & iura eorum non sunt esibilia, nec bene odorata, cum iura carniū valeant odore, & nutritione.

Dic: cum pisces sufficienter alant, & bonum sanguinem gignant, non sunt affirmandi simpliciter pituitosi, sed à moderato admodum parum recedunt, per frigidum humidum, sicut carnes per calidum; apud Auic. verò 2. can. marini sunt frigidi humidi in 1. fluuiatiles in 2. minimum autem frigidi sunt pisces mustelini, & rubri, sicut falsi omnes calidi sicci. Quare immoderantia piscium leui conditura emendari potest. In vlceratis verò tanquam in parte cacoehymica alimentum piscium accedens corrumpitur, sicut in sana parte cito mutatur ad bonum sanguinem. Velocitas autem corruptionis à calore extraneo, sicut in aqua pluuiæ, & in leguminibus ab igne magis indicat facilitatem coctionis intra corpus; sed id ostendit tantum oportere, vt recentissimi sumantur non à ventriculo valde calido. Nam in tali sicut lac, ita & pisces propter oleosam pinguedinem multo minus coctam, & crassam, quam carnibus inflammantur, vnde & pisces oleum remittunt simul, & propter multam mollitiem substantiæ corrumpuntur, nec etiam conueniunt ventriculo supino, aut valde frigido, fluctuant enim & in pituita vtuntur. Iura autem piscium, cum sint pars piscium humidissima, pessimum alimentum sunt, sicut in terrestribus, vt pote melancholicis iura, portio scilicet humidissima, optima sunt.

Quod item Aët. lib. 2. cap. 23. reponit eos inter attenuantia intelligendus est, ex lib. de attenuante, quasi concedat illos in eo victu, non quia gignat sanguinem valde aquosum, quod Isaac dixit; gignunt medium tenuis, & crassi, potissimum  
saxati-



saxatiles in lib. de euchymia, & 3. aliment. Et quod majus est lib. de prænoscendo curat esu piscium fluxum muliebrem ex intemperie frigida humida, & Tralianus in diaria ex obstructione laudat pisces. Quod item Rasis dixit difficulter concoqui, & morari in ventriculo, pugnat & experimento, & rationi, sunt enim siticulosi saliti magis, recentes minus quidem, quia in ventriculo calido parte sua oleosa inflammantur, & quia recentes, lentore suo harent ori ventriculi, ubi calefacti sitim inducunt. Quare subuenit Tacuinus siti piscium, cum paucis vino puro. Quod item apud Isaac, & Auer. citissime corrumpuntur, unde interdiciuntur in putridis febribus, & usus eorum frequens maximè permixtorum lacti inducit elephantiasim propter varietatem ciborum corruptibilium. Dic, in corpore mundo, ob facilitatem coctionis anticipat verti in bonum sanguinem. Quod postremo 1. cant. 126. saxatiles conueniunt fatigatis ex labore, videtur locus corruptus, Nam 3. 1. doctrina 2. cap. 7. post laboriosum exercitium edendi non sunt, si quidem nimius calor adurit leuia alimenta.

Secunda propositio: de varietate piscium ex situ in reliquis alimentis, fere tota differentia ex genere sumitur in piscibus. Plurima ex loco. Causa quia plurimum distant dulces aquæ, à salis, agitata, à quietis; plurimæ, à paucis; sordidæ, à purissimis. Inter pisces minimum discrimen recipiunt saxatiles, deinde pelagij, eo quod nunquam accedant ad aquas dulces, nec valde mutantur loca 3. aliment. cap. de generatione. Fluuiatiles autem deteriores sunt marinis 2. diet. & apud Isaac. Nam sal facit ad munditiem, & attenuationem eorum. Quare Rasi 3. Almanf. præferenti in agris fluuiatiles propter coquendi debilitatem, consentiendum non est, licet constet antiquos de paucis fluuiatilibus meminisse, inter quos quidam præstantes sunt.

Tertia propositio: de varietate piscium ex magnitudine, vniuersaliter aquatilia majora sunt terrestribus, ob copiam, & humi-



humiditatem aquæ, quæ causa est augmenti lib. de bona habitudine, & apud Plin. lib. 9. cap. 2. Num autem maiores natu pisces meliores sint. Dixit 3. aliment. de mulis, prægrandes non esse æque suaves, nec coctu faciles. Celsus lib. 2. cap. 18. extollit mediocres Auicena 2. can. & Isaac, in vniuersalibus præferunt in piscibus duræ carnis iuniores, in mollibus autem prouectiores, modo non sint annosi.

Quod ergo vulgo dicitur carnem annalem eligendam esse, piscem autem decem annorum, non est semper recipiendum, sed tantum significant, quod in piscibus propter copiam humidi, commodior sit ætas aliquanto prouectior, quam in aui- bus propter siccum auium temperamentum. Quod Auer. 5. coll. cap. 30. præfert minores, ea ratione, quod in terrestribus magnitudo significat augmentum siccitatis, in aquatilibus autem humiditatis, agit de magnitudine specifica. Nam de magnitudine atatiua, simul cum superioribus præfert cap. 33. mediam magnitudinem.

Quarta propositio: de varietate piscium penes genera. Numerantur septem genera, videlicet scamata; testacea, crustata, cartilaginea, mollia, cetacea, fassamenta.

Scamati præferuntur omnibus, maxime spinis, & scamis magnis & multis 8. coll. 30. & in vniuersalibus, quare significant rem contrariam temperamento suo, idest siccitatem. Ideo fluuiialium scamæ minores sunt, & in ventre minores; quare venter humidior est dorso. Cur autem in aui- bus multitudo penarum non sit par indicium bonitatis, dixit Hispanus. Quia multum penata plurimum volant, quare immodice siccantur. Non tamen videtur admittendum, quia siluestres aues ob multum volatum præfert Galenus, sed ideo valde penata, non laudantur, quia significatur immodica siccitas illarum. Inter scamata autem præferuntur saxatiles, qui sunt marini inter saxa degentes, habent enim duas dotes optimas, mollitiem, & friabilitatem, quæ vtræque si pisces carent, solis valde exercitatis admitti possunt, si altera tantum, etiam reliquis homi-

H h nibus



nibus, sed raro lib. de attenuante 8. Cui sententia magis standum est, quam Celso lib. 2. cap. 18. reprobanti saxatiles propter molliem; testacea vero, vel ostrocodermata operiuntur crasso, & durissimo tegumento, quorum succus soluitur, caro verò adstringit; quare utrumque simul edendum est, sed vel jus cum sale sorbendum; vel caro sola ter elixa, ut saluginem deponat; conveniunt calori acri, corrumpente levia edulia. In reliquis autem gignunt crudum humorem, quare senibus, & magnatibus otiosis pravi sunt 3. aliment. & 5. de sanit. 6. & apud Tralianum de dysenteria hepatica.

Crustata verò quæ tenui testa teguntur simile iudicium habent, nisi quod succus est aliquanto minus salsus; ambo autem ista genera juxta plenilunium meliora sunt. Cartilaginea dicuntur quorum cutis aspera est, noctu lucens, carnem duram habent, & visum hebetant ex Diaphylo, apud Athenaeum. Molliia verò sunt quorum cutis instar humanae mollis est, ut polipus, & sepia; quorum caro dura est, difficulter conficitur, multum tamen nutrit, & succum crudum gignit 3. aliment. 31. Quod ergo legitur de attenuante 8. multa mollium piscium habere carnem mollem, corruptum est, & legendum cartilagineorum. Cetacea vocat Aristoteles sola animalia parientia, 1. de hist. animalium 5. Galenus verò, & Paulus omnia grandia aquatilia, ob duritiem carnis, & copiam excrementorum raro bene coquantur. Salsamenta vehementer extenuant, siccant, & inscindunt crassitiem humorum, apud Aët. lib. 2. cap. 238. quare pituitosis optima sunt, melancholicis pessima, raro licet sumpta via medicamenti commendentur spleneticis 9. local. & apud Tralian. de quartana. Verum quando ab Aëge. & 3. aliment. reprobantur salsamenta tanquam pauci, nec boni alimenti, difficilis coctionis, & nunquam sumenda, nisi cum vomendum est, de antiquis & valde salitis intelligendum est. Nam recentes, & parcae soliturae in carne, & pisce accommodemendunt intemperaturas; qualis autem sit raro accommodata, explicatur 5. aliment. 41.

Quinta



Quinta propositio: de varietate penes capturam, & condituram. Capti in massis, ubi excepti statim mandatur nauicula, meliores sunt, vt *saucis de lanceiro*; retibus verò extracti, quia cōmorantur intra aquam putrescentes, deteriores sunt, vt *saucis de rede*. Ex conditura autem qui pisces ad aerem siccantur meliores sunt, proximi, qui statim à captura modice siccantur. Qui verò jam semiputridi, immodice prauī sunt. Sic ex artificis, apud Galenum, & Isac, coctura optima est, nisi venter humidus sit. Sequitur assatura; & postremo frictio, non solum quia fricturæ omnes reprobantur, sed etiam quia lentor olei in frictura, valde conseruat piscium lentorem; minus cōseruatur is lentor ab assatura, & multo minus à coctura, eo quod transit in jus.

Sexta propositio: de varietate ex partibus. Partes piscium leuiiores sunt infra ventrem 2. diet. apud Isac autem medium nutrit ob carnem, cauda salubris ab exercitio. Caput suauius ob humiditatem in qua gustus consistit, & lib. de theriaca ad Pis. 9. Partes caudæ proximæ plus alunt, quia ob motum magis trahunt, licet vulgo prauæ legatur. Tralianus verò cap. de epilepsia, & hamoptoisi reprobatur capita piscium, ceu pituitosa, & humectantia valde. Optima sunt apud Isac cauda, & branchia ob motum. Dorsum ob status pessima, vmbilicus, & caput ob otium, latera verò media sunt? Miratur tamen Plin. lib. 9. cap. 15. de tunnis, quorum latera, & vmbilicus longè præferuntur. Causa est durities cum siccitate carnis eorum, quæ humiditate ejus partis emendantur. Oua piscium sere reprobata sunt, soluunt omnia quandoque etiam per vomitum, & habent aliquid deleterium, eo quod sumunt humiditatem nondum coctam in piscem. Potissimum oua barborum inflantur, ceu deleteria, maximè mense Maio, apud Galium. Cur autem natantia magis pedestribus ouata sint. Causa est copia humidi, vnde sequitur tanta facunditas, vt nonnunquã rumpatur venter, quod de acu scribitur 3. de generatione 4. Est & causa finalis, vt ita subueniatur breuitati vitæ eorum.

H h ij Quod



Quod autem in piscibus sint discrimina sexuum, & non pariant omnes indifferenter ostenditur 3. de generatione 5. Quoad habitudinem verò carnis præfert Isaac moderatos, non immodice pingues, non graciles.

Septima propositio : de varietate piscium per nomina, summa est difficultas. Sunt enim marina animalia nomine cognita, ex antiquorum obseruantissimis traditionibus 176. apud Plinium lib. 32. cap. 11. Nec tamen est valde necessaria ea inquisitio. Nam 3. aliment. cap. de piscibus duræ carnis, dixit satius esse supersedere à nominibus, & per notas quasdam, vel experientiam agnoscere naturas illorum. Notæ sunt molli- ties cum friabilitate, saporis suauitas, tarda corruptio ab aëre, & licet quidam, quia cano nutriuntur, ut mugil, & boca, statim putrent nisi euiscerentur quamuis boni sint, saltem de euisceratis est certa nota, experientia autem præpollet notæ. Qui enim longa experientia patrios pisces nouerunt, nihil egent dictis notis 3. aliment. cap. de piscibus mollis carnis. Cognitorum autem ordo sequitur.

Classis prima. Primum locum habent saxatiles, & inter eos teste Galeno 3. aliment. cap. proprio. Scarus creditur multis, *pampano*, licet alijs magis videatur stromateus? Sequitur tardius iudicatus, *garopa*, & merulus iudicatus, *mero*. Sequuntur perca, *breca*, & Hiulis paruus ore venenato, sed esu saluberrimus, *donzella*, ou *douradinha*, & phis vel fuca, *faneca*, scorpius, *requeime*, galius rhodius, *peixe prego*, ficedula, *ceiffa*, cinedulus, *peixe canallo*.

Ex non saxatilibus autem accipenser Plin. lib. 9. cap. 17. Aristoteli est onyscus videtur gallacia 3. aliment. *solho*, aurata, *dourada*, aliquanto durior. Solea vel lingula, *azenia*, buglofus, vel lingulaca, *lingoada*, melanurus iudicatur, *sarguete*, farcus, *sargo*, eritinus, *bica*, vel *sargo bicudo*. Pargus, *pargo*, asellus, *peixe asno*, apud Algarabienteses, nostros autem pescada ex eo genere est licet 3. aliment. numerauerit asellum, inter inutilia salitura. Rhombus, *rodoualho*. Salmus præstantissimus fluuiati-



uiatiliū, Plinius lib. 9. cap. 17. *salmao*, ob nimiam tamen pinguedinem damnatur. Trochta reprobatur in aqua stagnante, nec probatur in ostijs fluminum, melior est ex mari, optima ex rapidis fluminibus. Conuenit illis magis coctura, ob carnis duritiem; unde vulgo: *Quem assa a truta, coze a perdiz, não sabe o que faz, ou não sabe o que diz, mustella, doninha, telina, samegoas, lobius, sobião.*

Classis secunda: Acarna, *vezugo* creditur; boca, *boga*, apud Plin. lib. 32. cap. 11. solea oculata, *lingoado sabacho*, cynoglossus, *azenião*, arnoglossus, *linguada*, hyppoglossus, *lingoado sapateiro*, chorax creditur *goraz*, synagris, vel cynedon, *dentelha*.

Ex genere autem mugilum optimus est capilo, vel cephalus, *capitão*, sequitur cestreus, *tainha*, tertius mylton, Latinis mucco, vulgaris, *mugem*, zeus, vel faber, *ferreiro*, vel bucinegro ab atro calore. Orphus, *pargo capitão*, lupus lanatus à candore carnis, *robalo*, lupus varius, *baila*, vterque melior ex alto contra epulones. De quibus canit iuuenalis.

*Vnde datum creditur lupus hic Tyberinus, in alto, Caprus hiet, &c.* Cuculus, *doçaina*, à sono quem edit retibus captus, mulus barbatus creditur capra, nostris autem, *salmonete*, ad hoc genus reducitur mulus imberbis, *ruino*, draco marinus, vel aranius, apud Plinium, *peixe aninha*, rhombus aculeatus, *patruça*, rhombides, *meia patruça*, sphirana, *peixe espada*, acus, *peixe agulha*, ziphia, *peixe agulha do alto*, squilla gibba, *camação*, ostrea, *ostra*, gallus marinus, *peixe gillo*, dicitur etiam piscis Sancti Petri, vel ciculus propter maculam ex utroque latere. De quo non videtur recte Rondeletius opinari fabrum esse. Umbra vel siena creditur, *coruina*, coracinus, *coruão*, vel *peixe coruo*, tusca, vel trupea, vel halosa, *sucl*, mena, *pardelha*.

Classis tertia: Mirus, *morcão*, murena, *morea*, Galeno laudata, nobis nisi prauerberata non probatur, tunnus, *atum*, delamis, *peixe serra*, pastinachia, *uia*, infumus, nec boni succi, licet Galeno commendetur, *raia lanis*, *raia lauada*, *raia cinerea*.

H h iij

zibreiro,



*zibrciro, raia oxirinelas, raia biuda, raia oculata, raia celula, raia  
astria, raia picada, raia aspera, raia raxada, raia piscatrix, tamboril,  
scatina lixa. Scatiraia, vrega, quia urinam olcet, passer, solha, opi-  
phidion, origa.*

Claslis quarta: Afelli species, *bacalhao*, molua apud Rond.  
*chancarona*, *aphia phalerica*, *peixe Rei*, *balerus*, *bordalinho*, *lamea*,  
*dentudo*, *conger*, vel *congrus*, *congro*, *lampetra* à *lambendis*  
*petris*, Plinius *mustella fluuiatilis*, Ausonio munera fluuiatilis  
*glutinosa*, nec boni succi, *lampreia*, *amia*, *bonito*, 3. aliment.  
numeratur modo inter duras, modo inter molles carnes, ad  
neutrum autem insigniter inclinat. *Salpa*, *salema*, *scomber*,  
*trasola* vel *cauala*, *colias*, *sarda*, *trachulus*, *chicharro* vel *alsaiate*,  
*caprisus*, *escorio* vel *porco*, *canicula* taxatilis creditur, *melga*,  
*canthorus* creditur, *preguicosa*, *galeus asterus*, vel *stelaris*, *pei-  
xe corça*, *gallus leuis*, *cação*, *gallus achanteus*, vel *spinarum*, *ga-  
lhudo*, *uranoscopus*, vel *calionimus*, *peixe sapo*, *hyrundo mari-  
na*, *peixe andorinha*, ou *voador*, *pompilus*, *dourado*, *arengus*, *aren-  
ques*, *cucumer marinus*, apud Plin. lib. 2. cap. 2. *peixe melão*,  
*mormirus* creditur, *vezugo*, *labeo* vel *chelon* ex genere *mu-  
gillum* deterrimus, *negraio* vel *mugis da cista*, *barbiui* quidem  
dicuntur, *machos*, maiores, *barbos*, aliquanto meliores sunt mē-  
se Maio. Iuxta illud, *quando o trigo he louro, he o barbo touro*, &  
Ausonius his carminibus.

*Tu melior priore aeo tibi contigit omni,*

*Spirantum e numero non illandata senectus.*

*Trichia* vel *sardinia*, *sardinha*, *polipus*, *poluo*, mire augent ve-  
nerem, Athenæus narrat multos obisse ex ingestis plurimo, *se-  
pia*, *ciba*, *lolius*, *lula*, *loligo*, *cochos*, *tropedo*, *tremelga*, ignobi-  
lis, & praua, licet commendetur 3. aliment. Portica *alforrecas*,  
à pruritu quem testæ inferunt, nonnulla in eo genere suavi-  
ter esculenta sunt, nonnulla insibiles. *Coclea marina*, vel  
*turbo*, *caramujo*, *vngues*, *perceues* vel *pê de cabra*, *astacha*, *loba-  
game*, *schila*, *santala*, *canchri*, *carangucios*, *lacusta*, *lag. sta*, *dacti-  
li* creduntur, *lingirão*, *patela*, *lapa*, *vertibula*, *pê de burro*, mu-  
rex



rex & purpura, *buzios*, tingunt pro miscide pectines, *conchas*,  
pedunculi, *berbigones*, mytuli, *mexilhoens*, ericeus vel echy-  
nus, *ouri*, echynometra maximus, in eo genere limaces, vel  
cochlea terrestres, *caracois*, testudines nemorales, *tartaruga*,  
frequentes insularis. Cancris fluuiatiles, *caranguejos de rio*, fre-  
quentes Gallis, testudines fluuiatiles, *cagados*, nobis vtiliter sub-  
stituuntur pro dictis.

Classis quinta: Orbis scutatus, Alfonsis, pistrix, *spadarte*,  
vulpis ex galeis magnis, *peixe rato*, aper, *peixe porco*, balena, *ba-*  
*lea*, zygena, *peixe cornudo*, centrona, *ratudo*, galeus glaucus,  
*tintureira*, vitulus marinus, *lobo marinho*, tursio apud Plin. *to-*  
*minha*, delphus, *golfinho*, silurus creditur, *roaz*, tubero, *tuberao*,  
hypoecampus, *caualinho do mar*.

# C A P V T XXXXVII.

## De Cholica.

**A** Duerte primò: curanda cholica vniuersalia praecepta.  
Primum: fomenta & balnea carminantia saepe laedunt an-  
te materia sufficientem minorationem, nam flatus augent, &  
materiam fundunt, quare quibusdam induxerunt paralysim,  
epilepsiam, maniam, antritidem, nam cum in intestinis repe-  
riatur humoris copia, tum propter loci amplitudinem, tum  
propter loci ignobilitatem, fit vt impedito exitu deorsum cõ-  
municetur humor, modo quidem cerebro per nervos, modo  
vertebris ob vicinitatem, sicut in alijs intestinum rumpitur, &  
fiunt hydropici defluente materia ad omentum. Alij fluente  
jam aluo periclitantur propter pessimam impressionem intestinis  
communicatam.

Secundum praeceptum: clysteres lenes, vsque ad aliquam  
coctionem materiae, & magis praesente febre securissimi sunt,  
nec tamen valde multum frequentandi; nam cum materiam  
agitant, caput grauant, quandoque etiam febrem & fluxum in-  
ducunt.

Ter.



Tertium praeceptum: soluentia purgantia sint etiam leuia, quia trahunt aliunde materias ad intestina. Secundò, agitant humores intestinorum, quare sequitur febris. Tertio: debilitant vim, quare sequitur aliquandò vomitus factum, aliquando excoriatio intestini propter humores tractos ad intestina, & ibi retentos, quare vtrumque symptoma lethale est in collicis. Verum leuia purgantia conueniunt primum, quia materia continetur in superioribus intestinis, quæ tamen vomitu educi non potest, nam tunc leniens, vel deorsum extrahit, vel saltem trudit ad inferiora intestina, vt cum clistere educatur.

Alter casus est: vel collica sequitur ad dysenteriam, nam materia supra locum vlcis continetur. Valida verò purgantia in casibus conueniunt. Primò cum materia destituit à vasis ad intestina. Secundus: cum lentissimi humores intestinorum leuibus non cedunt. Tertius: cum valida obstruentia intestinorum reliqua remedia contemnit. Verum securissimum, & potens est sumptio ʒ. vj. olei calidi, à quibus per horas quinque nihil sumatur, sed statim à potu aspergatur facies frigida, & confestim sumatur aliquid citonei, aut pyri ad nauseam sedandam, educit enim post horas 12.

Quartum: vomitus in plenitudine ventriculi nauseante agro confert, sed perseverans, cum aliquo adstringente detineatur irrorata facie & extremis, adstringentia soli ventriculo imponantur.

Aduerte secundò: de collica frigida praecepta. Primum: cum semper ordiendum sit à clysteribus lenientibus, & abstergentibus, si obstructio leuis est, statim addatur clysteri phlegmagogum, si autem valida addatur (scilicet phlegmagogum) paulo post.

Secundum: doloris sedatio continuanda est fomentis, balneis, vntionibus, anodinis, leuiter etiam carminantibus, & in extrema necessitate narcoticis.

Tertium: tandem intemperies materialis, vel immaterialis



trialis manens, emendanda est iuxta præceptum in lib. de præ-  
notione 8.

Quartum: in copia flatus venter totus valide cingatur 191  
therap. ultimo, & inclinetur pronus pendentibus capite, &  
pedibus, & exercitetur quàm maxime potest, & famescat quo-  
usque cesset.

Quintum: si clyster non retinetur injiciatur leuius, & mi-  
nus, si immodice retinetur, injiciatur mel, vsque ad ℥. j.

Aduerte tertio: in collica calida conuenit infra deco-  
ctum frigidorum emollientium, cum violaceo, & pauco sale  
supra pulpam cass. cum decocto fructuum. In bile verò crassa  
aloes loti ℥. j. sicut in valde calida aqua frigida epota, vel  
clysterifata sanat. In collica tamen ex siccitate facum sanat  
clyster ex ℥. s. olei, butyri ℥. ij. & magis addito decocto ca-  
pitum, & intestinorum castrati, item sumptio olei, vt supra,  
vel communis, vel amigdalini. Postremo si retinetur, clysteri  
addatur copiosum mel.

## Remedia.

**P**rimum: in frigida clyster leniens, & abstergens. ℥. bor-  
dij pinguis ℥. x. olei ℥. v. melis ℥. ij. salis ℥. ij.

Secundum: minorans pituitam, addatur superiori clyste-  
ri diaphanici, vel hyeræ pieræ ℥. j. per os sumatur elephangi-  
narum ℥. j. & s. vel terebentinæ vsque ad ℥. j. operantur tar-  
de, sed potenter.

Tertium: dolorem flatulentum leniens clyster, anethini  
℥. viij. vini albi potentis ℥. iiij. sacchari rubri ij. retineatur diu  
calidum. Item foueatur venter cum decocto camomillæ, me-  
liloti, anethi, rutæ in pari vino, & aqua. Item cucurbitæ am-  
plæ, cum multo igne repetendæ. Præterea opij castorij, ana  
j. granū, & si oportet duo, quod si necessaria est validior solu-  
tio, adde diagridij gr. iiij.



## De Leguminibus.

**P**ropositio prima: legumina omnia melancholica sunt, propter plurimam terram subsidentem, & vapores terreos attenuatos, præterea flatulenta sunt, ob defectum caloris coquantis, & copiam humiditatis coquendi, initium autem coctionis est multiplicatio flatuum; magis autem flatulenta sunt recentia, quam sicca, magis cum cortice, quam decorticata; redduntur item minus flatulenta, & suauiora, si permacerentur in aqua, aut lixiuio si duriora sunt, minus item flatulenta euadunt si magis coquantur, & adhuc magis sibi coquantur, priori aqua effusa, & eo magis si addatur origanum, capa, piper, & magis si fricta sunt, superpotato vino mero lib. de affect. in fin. Causa: quia durus cortex prohibet efflatum vaporis, quare minus tument non decorticata, sicut & castaneæ, quanto autem magis tument inter coquendum, eo minus in ventre. acut. 28. Habent autem multo plus flatu, quam animalia, quia immediate ex elementis prodierunt, & densitas substantiæ facit ad crassum vaporem.

Secunda propositio: oriza in succi probitate præferenda est leguminibus. Nam Celsus numerat eam inter euechymia, cum nullum leguminum sit plane boni succi. Item 2. aliment. constituit eam similem tritico. Quoad temperaturam autem apud Isaac, & Raf. 3. aliment. calida est in 1. quod confirmat experientia, cum inflammet biliosos, quod magis recipiendum est quam quod Auic. iudicat temperatam, Haly verò frigidam, in nutritione item Auicena plurimum nutrit, Serapioni parum; certius est ex 1. aliment. eam parum alere, multo minus tritico. Vbi verò scopus est impinguare citra adstrictionem, præmaceranda est in lacte fursuris, vel magis pecorino, postea coquenda cum iure gallinæ, vel lacte. Vbi autem scopus est adstringere, paretur sicca cum lacte torrefactarum amigdalorum.

Tertia



Tertia propositio: fabas reliquis leguminibus præfert Galenus, asserens eas non procreare prauum succum, & conferens ptyfanæ. De cicere verò pronuntians esse prauisucci lib. de attenuante 7. verum non placet Arabibus & vulgo. Nam recentes, sicut reliqua immatura legumina, valde reumaticæ sunt. Galenus cum experientia lib. aliment. 19. sed & siccæ deteriores sunt ciceribus. Primò, quia agrius coquantur. Secundò, quia tumultuosa faciunt somnia, etiam apud Diosc. & apud Psellum diutius morari inter fabeta tentat mentem. Sauanarola narrat Patauos, ob frequentem earum usum timidos, & cogitabundos; & apud Auicenam inducunt cephalalgiam. Tertiò, quia statim occupantur teredinibus putredinem significantibus, quare à pythagoricis damnabantur. In ratione verò medicamenti attenuantis, & abstergentis etiam, apud Galenum præfertur cicer.

Num autem in electione magis standum sit Auicenæ præferenti non perforatas, an matronis præferentibus perforatas. Dic: in ratione cibi videntur cum experimento præferendæ perforatæ, quia licet omne putridum prauum sit, verum putredo alicujus partis in duris indicat teneritudinem, mollitiem in reliquo, ut in cassio vermes, in cuniculo, & perdice paucus fator, in fabis neritas.

Quarta propositio: Lupini edulcerati non sunt mali succi lib. de attenuante 7. & 4. acut. 99. inter legumina minimum habent malitiæ; fere enim flatulenti non sunt, sed ob succi crassitiem renittuntur coctioni, quod si exacte non coquantur, crudum succum gignunt 2. aliment. 23. quare sunt cibis rusticorum, & exercitatorum. Quare immoderatus scribitur ab Auicena lupinum ex toto malum esse, gignentem crudum humorem. Sicut & quod scribitur de fabis; decoctio iterata tollit ab eis inflationem, cum 2. aliment. testetur Galenus quantumvis longa decoctione non deponere eam flatulentiam. Temperies lupini apud Auicenam, & Haly-caldæ est in 1. verum Isaac statuit in 2. apud Auer, in 3. ut intelligi-

liij

ga-



gatur attingere tertium gradum dulcem non excedere primum.

Quinta propositio: cicer plus fabis abstergit, ita ut nigrum frangat lapides, vehementer incitet libidinem, ob flatum, in quo non vincitur à fabis, & ob calorem quem fabæ non habent, & ob nutritionem, in quo superat fabas ait Isaac. Ob eandem item flatulentiam laxantem, & tumefacientem carnem, pulchram efficit faciem. Hippocrates autem 2. diet. dixit, cicer alere carnem, diureticum esse dulci, subducere aluum, falsuginoso. Vbi ergo queritur de obstructio, non macerentur in aqua abjicienda; sed instar hordei in aqua vigecupla ad dimidias coquantur. Vbi verò queritur alitio, pramacerentur, & multo amplius coquantur. Quod autem Auic. inquit oportere, ut sumantur in medio tantum mensæ, videtur multis literæ vitium. Nam jus tanquam subductorium initio conuenit, cicera ipsa in medio tanquam mediæ substantiæ, & flatulenta.

Sexta propositio: sesama semina sunt pinguisima, ita ut citissime euadant rancida, emendantur apud Auic. cum melle cocto, ita enim legendum est pro crudo 2. aliment. formati sesaminibus, videlicet quia ita trahitur ab hepate, ob dulcedinem, quare prohibetur innatare, inducit fatorem halitus apud Diosc. vel quia lentor inter dentes manens facile putret; vel quia ob pinguedinem vertitur in putrem bilem instar olei, potissimum Isaac in particularibus dixit meliorem esse cum cortice, ideo quia magis descendit, nec sequitur alios fructus cum nucleo esse ingerendos. Nam etiam cortices uarum Galenus commendat expui 2. aliment. quia à cortice, & nucleis ventriculus læditur, quod damnum præponderat utilitati descensus, nisi in pinguisimo, & natante, quale est sesamum.

Septima propositio: lentes in passinis sicæ in 2. afferuntur, in actiuis tantum discrepant. Nam 8. simp. temperatæ asseruntur, & 6. epid. 5. 35.

Contra



Contra Hippocrates, & Isac statuunt eas frigidas in 1. Hal-  
ly in 2. cum Raf. 3. ad Almanf. 20. & Auer. 5. coll. 5. Contra  
tamen videntur ad calidum inclinare, quia participant vini  
coctricem, apud Auctores quia calido perficitur, & 2. can. jus-  
earū subtiliatū est; & de victu priuatorū 2. numerat inter ca-  
lida legumina. Cardanus soluit calidas esse cum cortice; est  
tamē sine Auctore, nec probabile, quia 8. simp. Gal. sola medi-  
camenta in gradu collocat, asserens temperatas in actiuis.  
Vel 3. legendum lib. de victu priuat. calida seorsum, deinde sic-  
ca, vt lentes, vel in paruo intervallo, sine errore effertur utrū-  
que contrarium 5. simp. 9. vehementer adstringit, mali, & me-  
lancholici succi 1. aliment.

Sed de utroque aduertendum est adstringere magis cor-  
tice, incrassare carne, soluere succo. Quare vbi solutio qua-  
ritur leuiter coquitur, & adjecto oleo bibitur solum deco-  
ctum. Vbi autem incrassatio humorum, aut exsiccatio corpo-  
ris quaeritur, decorticata sumatur, vt in humidis naturis, &  
hypofarcicis 1. aliment. Vbi autem quaeritur adstrictio, vt in  
fluxibus cum cortice coquantur, sed bis effusa priori aqua, &  
adjecto aceto.

Quod ergo Isac dixit, decorticatam magis adstringere, re-  
cipiendum non est; succi melancholici vsque adeo est, vt as-  
feratur in proemio aliment. & cap. de lente omnino opposi-  
ta ordeo, & frequentata inducit elephantiasim, minuit men-  
ses, cohibet sanguinis distributionem. Quare commode exhi-  
betur in feruore, & fusione sanguinis. Conuenit ceu medica-  
mentum in ventris profluio 1. acut. 18. & de euchym. 7. vt  
alimentum verò asseritur praua, & melancholica. Quare im-  
probandi sunt, qui permiscue ea tanquam alimento vtuntur,  
potissimum autem biliosis, & sanis cauenda est propter siccita-  
tem 1. aliment. Nec tamen male conceditur in synocho,  
& exantematis ob sanguinis feruorem, imò etiam in victu te-  
nuī non damnatur raro vsu lib. de attenuante 7. lupinis enim  
similem constituit in bonitate. Causa autem cur concedatur

Li iij

in



in tenui victu est, quia eorum qui egent tenui victu, quidam abundant pituita, alij melancholia, ad priores autem cōuenit 1. aliment. posterioribus noxia est.

De cortice autem aduertendum est, quorundam corticem magis adstringere, medulla; vt in punicis, vuis, lente, fabis; aliorum magis abstergere, vt in tritico, hordeo & cicere. Quare quod Isaac cum Tacuino, & alijs pronuntiant corticem lentis soluere acrimonia sua, medullam autem adstringere, recipiendum non est. Aufertur verò cortex varie, ex quibusdam sola frictione decutitur, vt in strobilis (*pinboens*) in alijs assatione, vt in nuce & auellana: in alijs maceratione calida sequente frictione, vt in fabis, & lentibus; in alijs etiam mollis pinsatio exigitur, vt in hordeo. Est autem lenis turbatiua 2. diet. & 4. acut. 49. quia constat facultatibus contrarijs, & partibus diuersa coctionis, nam cortex multo difficilius coquitur quam caro ibi. Quod ergo Hippocrates 2. diet. scribit, nec soluere, nec adstringere, intelligatur vtrumque efficere pro artificis varietate.

Octaua propositio: ochri & faseoli, deteriora fabis asseruntur lib. de attenuante 7. meliora tamen dolychis, & latinis, de euchymia citat. fuit autem etiam Galeno difficilis horum nominum dignotio, eo quod varij Auctores varie illis vtuntur, lib. aliment. 25. interpres pro ochris vertit, *eruilhas*, sunt autem ochri, & faseoli legumina cōgenera, dua scilicet species (*de feijoens*) nam apud nos quidam ex illis alben, alij rubent, nonnulli versicolores sunt; at hi postremi Dioscoridi appellantur smilax hortensis. Licet Aët. aliter sentiat cap. de dolychis; temperamento autem sunt magis calidiore rubri, & magis prouocante. Quod autem 2. aliment. Galenus locat ea in medio bene, & mole alentium, flatulentorum, & flatus expertium, videtur intelligendum, vt inter legumina. Nam si legumina omnia flatulenta sunt, & hac iudicantur inferiora fabis, cū non inter flatulenta, & prauī succi numerantur.

Nonā



Nona propositio: dolichos, vocant Aët. Paul. Galenus, quos vulgo lobos, vel seliquas, quia ex leguminibus frequentissime cum siliquis simul eduntur, & faseolos, vel fasiolos quatuor syllabis. Ex quibus simul cum theophrasto 8. de hist. allèrente, quod nisi confurgat affixo palo, redditur rubiginosus, ostenditur esse nosias (*eruilhas*.)

De facultate verò ejus in lib. de euehym. citat. æquat eas faseolis, licet non tantum faciant ad dejectionem, & suauitatem. Nobis judicantur suauiores, in flatulentia verò ait eos carere flatu, cum apud Diosc. vehementer moueat flatus. Vulgus verò judicat esse alimentum innoxium.

Decima propositio: cathyris nobis cicercula (*chicheros*) deterior prioribus, sed plus illis alit, & succo crassiori lib. de euehymia citat.

## CAPVT XXXXVIII.

## De fluxu ventris.

Incipit, cum eibus, &c.

**A**duerte primò: curandi fluxus in vniuersum præcepta. Primum: si causa est progressus soluentis, frangenda est acrimonia ejus cum abstergente, morsum leniente v.g. 3. viij. ptyfanæ cum sacharo, vel musilago ptylij extracta cum rosacea. Vel plutes ex amylo cum rosacea, & præstat si ad hujusmodi lenientia sequatur sumptio comprimentis fluxus 2. aliment. de prunis.

Secundum: si causa fluxus interna est humor, scilicet aut quantitate, aut qualitate peccans, distinguendum est. Nam si vacuatio respondet humori, & virtuti, nihil innouandum est. aphor. 20. si verò superfuit ad virtutem, vel ad humorem retineatur. Si verò id quod frequenter accidit in primis diebus deficit, arte iuuetur 9. meth. 5. vel ut cōiuncta à medico copia humo-



humoris excedentis simul, & conjectato impetu fluentis humoris dijudicet, num satisfaciat spontaneus impetus humorum fluentium copiam; quod si minor est, arte iuuuetur, quod non exacte transcripsit Aët. lib. 15. 71. afferens in vacuatione spontanea totum negotium naturæ permittendum esse usquequo cesset. Quod Aëtij consilium frequenter Medici cū vitæ dispendio saepe sequuntur. Vbi autem constitutum est supplere spontaneam vacuationem arte, præstat ut per aliam regionem, non per fluxum alui, scilicet si natura inclinaret ad sudorem, vomitum, aut urinam, aut si creditur defluere humor à vasis ad intestina, cōmodissime vena secatur, quia præstat quando opus est vacuare, non simpliciter vacuare, sed cū auersione 5. aphor. 32. & 48. Quia tamen raro intentat natura simul cum fluxu ventris aliam vacuationem, perficienda est vacuatio arte exhibitio medicamento, quod parum moueat fluxum; non concitet, adstrictione participet. Et juxta hanc interpretationem explicandum est, quod scribitur indeterminatus 1. ad Glau. 14. nunquam in fluxu ventris cum febre purgandum esse, sicut & quod subdit ibidem omnes interire, quotquot sub canicularibus vacuantur, regulariter enim non conueniunt tales vacuationes, saepe tamen iuuant, & necessariæ sunt.

Tertium præceptum: ultra prouidentiam adhibendam mandanti, siue fuerit totum, siue particulare membrum, statim intestinis prouidendū est, per abstergentia dolorē lenientia, & vlcus prohibentia, ea enim in medijs intestinis affectis danda sunt, & sursum & deorsum, in inferioribus autem deorsum. Causa est quia 13. meth. 17. clysteres non attingunt ad jejunum; imò etiam si nitaris ad solum tenue perueniunt, multo minus ad ventriculum 5. meth. 11. Quomodo ergo experimento fastidia inducunt, & 2. ad Glau. 6. in fine clysteres ascendunt ad gracilia, sed viribus imminutis, sicut bibira ad crassa intestina. Item quomodo in illiaca repente submissum forbetur, ita ut euomatur, Item quomodo Aët. nutrit cardiacos

per



per clysteres alentes. Zoar. verò hecticos defectus, si vsque ad ventriculum non ascendunt vt chylicentur. Dic ad primum: clysteres offendunt ventriculum, & caput vaporibus, licet eò non perueniant substantia sua.

Ad aliud in illiaca propter validam contractionem musculorum sedis, ad expulsionem noxij, cogitur submissum sursum ascendere, sicut in fluxu clysteres propter contrariam dispositionem, non permeant omnia crassa intestina. Sententia autem allata solum de naturali dispositione tradunt.

Ad tertium: dic submissa paucis diebus alunt, licet Nunda neget, non enim requiritur ad chylicationem submissum ascendere ad ventriculum, sed chylicatur licet imperfecte in intestinis 4. de vsu 17. sicut & sanguis gignitur ante hepar, inelaboratus tamen in meseraicis 2. de placitis 7.

Nec obstat, quod officina sanguificandi est hepar, chylicandi ventriculus, quia natura comparatum est, vt ad similes modos substantia sequantur similes facultates 7. de placitis 5. est autem vna substantia in tunica oris ventriculi, & intestinorum, sicut in venis & hepate, sicut in arterijs & cordis auribus. Sed in eo distant, quia vbi quaritur integra oppositio, & in ortis requiritur communicatio facultatis à fonte, quia orta non habent eandem substantiam, sed similem, id quod accidit in arterijs & venis, vbi verò non quaritur integra actio, sufficit ad imperfectam actionem similitudo illa substantia citra facultatis demandationem. Quare venae tarde sanguificant deficiente calore carnis ventriculi, & circumstantium robur autem à communicatione sanguinis, per omnia vasa fluentis conciliatur. Nec obstat, item quod vasa coctione propria gignunt album semen, quia & ventriculus aliam coctionem habet in còcauitate terminatam in chylum; aliam in poris, qua substantiam ventriculi conficit, de differentiis symptom. 4.

Quartum praeceptum: diuersio, incrassatio, constrictio, stupefactio sistunt fluxus, sed non habent omnia eandem oc-

K k casio-



calionem. Nam diuersio semper habet locum per sudoriferam, deuretica, vomitoria, iuxta illud vulgare, vomitus sedat fluxum, fluxus vomitum; sed utrumque sudor. Incrassatio verò & constrictio, cum creditur vacuatus humor noxius, vel liquet non ex toto vacuatus sit, vis tamen non tolerat diuturniorem fluxum. Stupefacientia verò solum (cum alia non sufficiunt) & interpolatim vi constanti, sunt autem incolumiora supposita, quam potata, sed suppositio requirit quantitatem opij, alias stimulant, non retinent, itaque in collirio sit opij gr. viij. in potato verò gr. ij.

## Remedia.

**P**rimum: in fluxu diminuto, si biliosus est, tamarindorum ꝑ. ij. feri ꝑ. iij. syrupi rosati ꝑ. j. Vel rhab. ꝑ. j. ꝑ. formetur pillula cum aqua plantaginis. In diminuto pituitoso, Carumi crassi tussii, mirab. chebul. ana ꝑ. iij. bulliant in aqua methæ ꝑ. iij. mel rosati collati ꝑ. ij. collatum potetur, vel elephanginarum ꝑ. j. In diminuto autem melancholico similiter infundatur epithemi, polipodij ana ꝑ. iij. Vel sene, polipodij, mirabolanorum indorum ana ꝑ. j. ꝑ. formetur pillula.

Secundum: mundificantia intestinalia, & vlcus prohibentia. Clyster ptysanæ ꝑ. xv. rosacei ꝑ. iij. luteum vnum, adipis renum capræ ꝑ. j. & si calor vrget, adde mucilaginis psyllij ꝑ. ij. si verò magis frigus, mellis rosati tantundem, & permutetur rosaceum in camomillinum. Sursum autem sumat ptysanæ ꝑ. iij. julepi rosati ꝑ. ij.

Tertium: adstringentia interna in causa calida. Miua citratorum, & magis fructuum diacitoneum succorum, rob de acido citri, syrupus papauerinus, & de rosis siccis, item miscela & electuarium de sorbis quotidie ꝑ. j. ꝑ. vel trochiscorum de spodio cum semine acetosæ ꝑ. j. Item mirabolanorum, & rhab. torrefacti ana ꝑ. j. & ꝑ. cum syrupis dictis, & aqua plantaginis. Postremo interpolatim sumat trochiscorum de chara-  
be



be 3. j. vel phylonij perfici 9. ij.

Quartum: constringentia externa in causa calida. Vnguatur venter rosaceo, quam calido tollerare potest, superasperso pulvere rosarum, masticis, galliæ. Vel citoneum ablato meditullio coquatur in aceto, tussum autem cum pulueribus dictis, & trochiscis de charabe imponatur. Item clyster decocti hordei torrefacti gallarum sumach ʒ. j. succi plantaginis ʒ. iiij. luteum oui in aceto adipis renum capræ ʒ. j. misceræ ʒ. ʒ.

Quintum: constringentia interna in causa frigida. Miua aromatica, syrupus myrthinus, caseus antiquus bullitus, post exsiccatus, & pulueratus. Item ex nuce muscata assa cum pari sacharo quotidie sumatur pulvis jejuno. Item rhab. & cheb. torrefactorum ana 3. j. ʒ. miuæ ʒ. j. aquæ menthæ, vel absinthij ʒ. iiij.

Sextum: constringentia externa in causa frigida. Vnctio cum mastichino, quam calido tollerare possit, superasperso puluere mastichis, gariophilorum, galliæ, item citoneum in vino nigro coctum addito pane asso, & succo menthæ, cum pulueribus dictis. Item clyster recipiens in decocto nucis cupressi orizam cum vini nigri ʒ. iiij.

#### De Oleribus.

**A**duerte secundó. Propositio prima: olerum in cibum receptorum, alia sunt radices, alia herbae, alia turiones, vel gramina, vel asparagi, vel lupulli (*grellos.*) Sunt autem mali & pauci succi omnia, excepta lactuca, quæ in medio est boni, & mali succi 2. aliment. & de euchym. Syluestria verò omnia deteriora sunt Auic. 3. 1. doctrina 2. cap. 7. frigida, inquit, pituita replent corpus, calida verò adurunt sanguinem. Quare vtraque reprobata sunt sanis, peiora ægris. Itaque promiscuus vsus illorum illaudabilis est, scilicet quia cum paticam habeant elementorum proportionem, seu mixtionem, longè

Kk ij di-



distant à probo sanguine. Verum in via medicamenti conueniunt in multis morbis. Quod autem 5. coll. 41. scribitur omnia esse melancholica, videtur litera vitium. Nam 3. de locis de melancholia, inter olera sola brassica melancholica est.

Secunda propositio: olera frigida illota meliora sunt vetriculo, apud Diosc. & Auicenam cap. de lactuca. Nam lotio separat inter partes plurimorum olerum aperientem superficiem, ab aquea interna 2. can. 1. Altera causa, quia per lotionem additur inflatio sicut puniceo. Num autem facilius coquantur olera, quam carnes, & pisces, videtur pugnantia. Nam Oribas. lib. de confect. ciborum cap. de difficulter coctilibus, & Aët. lib. 1. cap. 225. inter difficulter coctibilia numerat & 1. naturalium 10. ad hoc quod caro sanguis fiat, pauca sufficit transmutatio, vt autem olus plures; quod autem magis transmutandum est, longius tempus requirit, quare difficilius coquitur. Dic: olera experientia celeriter concoquuntur, & apponuntur, quare & resoluuntur 2. aphor. 14. Quod autem scribitur 2. naturalium, non monstrat tarditatem coctionis, sed paucitatem alimenti, quia cum olera nimium distent à sanguine, paucissima partes possunt in illis transire, & ita parum nutriunt, quod idem videtur significare Oribas. cum Aëtio.

Tertia propositio: olera coquenda sunt non superfusa frigida, indurantur enim, & redduntur minus suauia lib. aduersus Erasistratum cap. 4. Quod si semel coquenda sint, sufficiens aqua mittatur in vas, in quam calentem injiciantur olera: si vero bis coquenda sunt, adsit alia calida quæ effusa priore in olus mittatur. Quod in reliquis coctilibus obseruandum est, indurantur enim si vel frigido aëre tegantur.

Quarta propositio: olera domestica sunt ita collocanda. Lactuca, blitum, malua, spinachia, portulaca, attiplex. Lactuca 2. aliment. succum gignit inter attenuantem, & incrassantem, soluentem, & adstringentem. Quod ergo Diosc. inquit ventrem mollire, & Martialis. Vtere lactucis, vel mollibus  
ytere



utere maluis, cum Plinio lib. 20. cap. 7. potest solui quod pauca sistunt aluum, propter aliquantam adstrictionem, ob quam etiam fastidia abigunt, & stomatichæ sunt; copiosiores autem soluunt, propter frigiditatem offendentem ventriculum. Vel juxta Galenum in procemio aliment. Demum talia alimenta ancipitis naturæ pro varietate alui sumentium contraria operari, unde etiam promiscue sumi possunt, vel in prima, vel in secunda mensa, quod Martialis quarebat. Claudereque carnas lactuca solebat auorum, Dic mihi cur nostras inchoat illa dapes? Nutrimentum illius est modicum simpliciter, sed potius paucum, plus tamen reliquis oleribus nutrit maxime cocta. Quod ergo Plinius, & Diosc. scribunt plurimum sanguinem gignere, & lac augere, negat Galenus, nisi collatione ad olera. Quod item 2. diet. scribit Hippocrates debilitatem inducere, vel referatur ad paucum ejus alimentum, vel quia inducit debilitatem feminis, & spiritus visorij. Quod item 8. therap. 2. scribitur lactucæ exiguum esse quod alit, plurimum inutile, verum est si conferatur ad carnes non ad olera.

Nec obstat, quod aliqua olera minus distant à temperamento sanguinis, quare oportebat illa magis nutrire, quia non solum temperamentum sequitur nutritio, sed multo magis similitudinem in substantia.

Num autem præstat cocta? Dic præstat, quia facilioris est coctionis. Secundo, quia inflatio minuitur. Tertiò, quia frigiditas ex qua timetur obstructio, & incrassatio humoris remittitur. Quartò, quia magis alit apud Ras. citat. Verum ubi calor est ingens in morbis Tralianus concedit etiam crudas.

Maluæ priscis erant in frequenti usu, nobis raro admittuntur, cum Galenistis, tantum, ubi placet mollire ventrem, vel acrimoniam urinae cum utilitate multa. Numerat autem eas Galenus in 2. loco prohibitatis. Quod ergo Auic. 2. can. inquit esse illaudabilis alimenti, ita interpretandum est.

Portulacam numerat Galenus 3. loco, commodè sumitur in acetaria cocta, ad sanguinis calidi incrassationem, qua au-

K k iij      tem



rem vi soluat manducata stuporem dentium, visum est insolubile, & referendum ad multam proprietatem. Aphrodiseus 2. suorum prob. Nec valde differt Aristoteles 1. prob. 37. Dicēs portu acam attrahere succum acidum dentium, ob similitudinem. Galenus verò 10. simp. dixit stuporem qui nascitur à siccitate exuperante sanari à mansa portulaca, quia humiditate sua tollit siccitatem, & lentorem aquat exasperata.

De blitro autem dixit lib. de attenuante 9. olus esse minime pituitosum, & tamen vehementer obtundit acrimoniam bilis. Quare intelligenda est Galeni sententia si conferatur ad frigidiora, quales sunt pepones, & cucurbitæ, moderatiora sunt & non expertia aliquantæ adstrictionis.

Incognita spinachia priscis, frigida humida in 1. apud Isaac, Auic. Ras. licet Haly asserat eam temperatam in actiuis. Auer. verò frigida humida in 2. Putant dicta spinachia, ob spinosum semen. Alij vocant attiplex Hispanum, quia inde sumpsit originem. Postremum locum obtinet attiplex, vel crisolocana, vel olus aureum (*armoles.*)

Quinta propositio: sylvestria omnia ceu prauis succi reprobantur, admittuntur in vsum, ambubeia, lupus salictarius, oxalis, corruda, euthimum. Ambubaia dicitur, & scariola quasi feriola, aseri id est chicorio vulgo (*escardas*) vel (*almeirão frances.*) Commendatur eximie 7. local. & apud Tral. & Auic. ad hepar deobstruendum cap. de obstructione hepatis, magis quidem ad calidum, sed etiam ad frigidum non solum temperamento, sed proprietate scilicet medicamenti. Ut autem alimentum frequentius potest sumi à nobis, quam à priscis, quibus ratio repastinandi nostri temporis, incognita erat.

Lupus verò salictarius, apud Plinium lib. 21. cap. 15. est depurans excrementa cordis melancholica, vulgo (*luparos.*) Oxalis (*azedas*) vulgo acetosa nimium alit, facit ad extinguendum sanguinis feruorem, & ad calidas obstructions. Corru-da vel asparagus regius (*espargo*) asseruntur temperati 6. simp. apud Aët. tamen & Isaac sunt calidi in 1. Isaac asserit eos plurimum



rimum alere, quod explicandum est ex aliment. plus alere  
culiculis aliorum olerum, ventriculo commodos esse scribitur  
2. aliment. 59. & apud Isaac. Verum apud Avic. & 3. alim.  
& Dioscor. videtur soluendum, ut de capparibus, utiles enim sunt  
in impuro stomacho, laedunt purum. Cur autem trahant urinam  
fatidam. Ioachinus ait in quaestione. Quia cum valde diure-  
tici sint, maxime prouocant per urinam sicut raphanus cru-  
etationes fatidas.

Cretinum vocant, faniculum marinum *vnha dagoa*, vel  
greda marina *saluado mar* vulgo cretamus marinus, simile fa-  
cultate capparibus, sed magis abstergit, & siccat, magisque mo-  
uet urinam, & menses.

Sexta propositio: calida olera satiuia sunt, borrago, beta,  
brassica, pastinaca, radix cinerea, rapum, allium, cape, porrum.

Borrago quasi corago dicta est; extollitur vehementer ad  
roborandum, & purgandum cor lib. de medicinis cord. & 2. 3.  
In dicta facultate tamen & forma, species est buglosi, non quod  
multi putant esse ipsum buglosum.

Beta duplex est, vulgo cicla (*celga*) altera nigra, & subob-  
scura adstringentior, altera alba id est pallida, tenuat modico  
calore, & salugine deobstruit naturalia 2. aliment. Quare vsus  
illius in acutis morbis commodior est, turbat autem ventri-  
culum, ob contrariam facultatem juris, & corporis, nisi sumat-  
ur bis cocta, vel saltem valde sufficienter 3. aliment. 15.

Dubitat Galenus de sylvestri beta, num reperiatur 2. ali-  
ment. cum reperiatur beta frequens sylvestris non distans spe-  
cie a satiuia, & rursus duae aliae species distantes, rhumex, &  
limonium.

Brassica alia capitata, ut hyemalis, vel Hispana (*murtiana*)  
Alia aestiuia tronchuda; melior & minus acris est capitata, apud  
Isaac & alios, licet vtraque sit acris, mali succi, stomacho infe-  
sta, & valde siccans 2. aliment. quare in aestate non conuenit  
iuxta adagium (*Se queres ver teu marido morto, dalhe coues em*  
*Agosto*) emendatur tamen valde pingui carne 2. canonis; assi-  
duatio



duatio autem ejus 7. 4. tract. 2. cap. 7. efficit pulchram faciem quia defert sanguinem ad cutem. Diosc. commendat eam in sicutientibus, cum tamen scribatur 2. aliment. eam visui officere. Ruellius de natura stirpium cap. proprio putat ambos Auctores pugnare. Verum lens & brasicā in natura temperata hebetant visum immodice siccando. Vbi autem visus offenditur, ex immodica caliditate conferunt, quomodo conciliandi sunt. Cur autem præassumpta prohibeat crapulam dixit 1. prob. 17. eo quod habet succum laxantem, qui vini vapores partim per ventrem, partim per vesicam trahit, corpus autem brasicæ in ventriculo manens, sua adstrictione prohibet evaporationem.

Pastinaca annumeratur raphanis, & rapis, sed à raphanis distat, quia succo non constat ita reprobo lib. de euchymia 8. A rapis verò, quod pastinaca succum gignit medium tenuis, & crassi, Rapa verò crassissimum.

Radix vel raphanus 8. simp. calidus est in 3. Quare Auicena statuenti calidum esse in 1. semen verò in 3. standum non est, licet semen sit fortissimum, deinde verò radix, tandem folia cum caule, quæ sunt melior plantæ pars, juxta adagium. (*Do rabão as folhas, & do amig as obras.*) Mali succi est, difficile coquitur. Quod ergo quidam sumunt in cana coctionis promouendæ gratiâ. Galenus 2. aliment & Haly non credunt. Auicena tamen 2. can. 10. ait folia promouere coctionem, & radicem parte sua tenui, licet parte lignosa non coquatur. Cum Galeno verò 2. aliment. 31. videtur asserendum, quod si talia sumuntur copiose ad alendum, incoctilia sunt, si verò parum vice medicamenti, iuuant coctionem augendo calorem proportionalem innato ventriculi calori, malum autem succum ejus ostendit putridus ructus, apud Isaac, Alexand. verò 4. problemat. 42. ait non esse factorem illum raphani, sed putrentis pituitæ in ventriculo contentæ, alioqui oportebat in omnibus idem accidere, contra experimentum. Vere tamen in succo proprio etiam causa adest, indicio quod extra. Præterea infusum facit.

Num



Num autem in 1. an in postrema mensa sit sumendus. Variant Auctores, Diosc. Auic. Isac Ras. Oribas. à cibo inquiunt, vt pondere suo deprimat alimentum, non ante, ne flatu eleuet.

Contra Galenus, Paul. Aët. præcipientes vt initio sumatur dejectionis gratiâ; si verò venter flatulentus est, in quo timetur cibi eleuatio, satius est ab eo abstinere. Diosc. ait eam esse ventriculo noxiam. Aët. verò & Oribas. lib. 3. cap. 19. numerant inter stomatica. Videtur quod præsentem humorem multo in ventriculo flatus excitatus lādīt, cum verò abest iuuat.

Cinara, *cardo*, qui ante culturam *scolymus* dicitur, & pluris quam conueniat aestimatur 2. aliment. 50. constat enim succo bilioso, carne verò melancholica, magnifice tamen roborat ventriculum, apud Aët. & Oribas. lib. 3. 19. Nam 2. aliment. 10. aculeata omnia roborant ventriculum, & stomatica sunt, quia aculei attestantur adstrictioni terreæ roboranti ventericulum. Quam sententiam Paulus durius interpretatur lib. 3. 74. asserens aculeata omnia stomatica esse præter cinaram quæ vitiosi succi est. Nec enim obstat alimentum esse vitiosi succi, simul & stomaticum. Nec dissimilem facultatem habet cardus, pinca (*alcasus*.)

Rapa capite rotundo sunt, napus oblongo, crassi succi vsque adeo, vt videri attenuanti aduersissima censuerit, lib. de attenuante 9. maxime si non bis cocta fuerint, & crebro sumantur. Quod ergo Haly dixit inesse illis vim tenuantem, & vrinam prouocantem valde obscura credenda est. Nec pugnat quod Gasius miratur Ras. 4. aphor. cōmendans alimentum ejus cū Galeno 3. aliment. scribente acervare humorem crudum, vtrumque enim Galeni est, nam inter radices non est mali succi, maxime prius cocta, post elixa cum vacina pingui.

Citra dictas verò coctiones, vsque adeo acervare pituitam vt lib. de attenuante 40. ad vsum raporum retulerit augmentum pituitæ per hyemem. Valde autem alit inter radices, verbum autem (*vlla*) 2. aliment. in ablativo legi debet, mirum si

Ll

vlla



vlla congenerum plantarum minus nutrit.

Allia, cepa, porrum subsimilia sunt, omnia valde biliosa, & cacochemica, vnde apud Ras. 1. aphor. 32. qui ab illis abstinerit noxam prauorum succorum euadet, solum autem opem ferunt in crudis coquendis raro sumpta in natura non biliosa 2. aliment. vltim. Vbi tamen exacte concoquantur, vel assantur, amittunt succi malitiam, & aliquid alunt cum antea nihil alerent. Quod ergo Ras. 3. aliment. 18. cepas gignere pituitam in ventriculo, vel intelligatur propter vapores ascendentes, & inducentes catharrum, vnde parantur lethargo, licet quia stimulant ventriculum cogunt alimenta exire ante coctionem.

Quod item dixit Isaac costa plurimum alere, intelligatur collatione tantum ad cruda. Num autem sint siticulosi, flatus gignentia, & capitis grauitatem & libidinem. Dic: simpliciter scribitur 4. acut. 99. & Diosc. & Plin. Contra 12. therap. vlt. scribitur allia non omnino inferre sitim, & omnium alimentorum flatus maxime expertia esse: Quidam explicant priores sententias de crudo, posteriores de cocto; sed Galenus vniuersaliter pronuntiat. Videtur satius ex eodem 4. acut. citat. variari effectum propter naturam sumentis. Nam in plethorico, & cacochemico inflat, & sitim inducit, in puro autem corpore dissipat flatus, & aufert sitim & libidinem. Cur autem cruda flere faciant, siue mansa, siue odorata? Dic: lachrima prodeunt quandoque ex concussione molissimi, & humidissimi cerebri, vt in cachynno. Secundo, ex tristitia, conante cerebro expellere noxam, sicut membrum dolens sanguinem 3. meth. initio. Tertiò, ex consecutione optati, siue quia distenditur cerebrum præ gaudio, siue quia condolemus nobis, merito transacti desiderij. Quartò, ex frigidityte contrahente, quomodo flante aquilone distillat cerebrum per oculos, & nares. Quinto, ex fumo vel acri olerum vapore, ludente sua acrimonia.

Cur autem magis ludentur oculi, causa sunt acrimoniae  
sen.



fentiendi in oculo, & quia pars est mollissima, & cute denudata. Cur autem perpeffis fumum, aëris dolor, & lachrima sentitur in oculis dormituri. Causa est, quia frigiditas somni, & tenebrarum exprimit acrem fumum in cerebro retentum ad oculos, qui cum magis valeant sensu, ex acrimonia dolent, cū cerebrum obtuso sensu non doleret.

CAPVT XXXXIX.

*De Fluxu in particulari.*

**A**duerte primò: lenteria curandæ præcepta. Primùm, si causa est vlcus, curandum abstersione ex mulla sumpta, aut deorsum pro varietate loci vlcerati, post cuius dejectionem confestim sumatur rhab. ʒ. ij. syrapi ros. ʒ. ij. aqua plantaginis ʒ. iij. postremo hora prima ante quamuis cibationem sumatur puluis consolidans, vel solus, vel cum sacharo rosato.

Secundum: si causa est copia pituitæ in ventriculo, vomitu, & secessu inaniatur. Si verò quod frequens est, causa fuerit catharrus non sinens morari alimentum in ventriculo, primò catharrus cohibendus est, mox ventriculus purgandus. Tertiò ventriculus adstringendus simul, & caput purgandum suffitu ex thure, & mastiche.

Aduerte secundò: in curanda diarrhea, vltra vniuersalia præcepta memorandum est, commodissime in antiqua trahi humorem ad cutem frictionibus totius, & cucurbitis viscerum, & spatularum, & balneis breuissimis, sed multum sudorem prolicientibus.

Aduerte tertiò: curandæ dissenteria præcepta. Primùm, si sanguis aliunde communicatur citra lationem intestinorum, subueniendum est primogenui affectui, scilicet si causa est abundantia sanguinis, permittatur exire; si verò causa est praua sanguificatio, hepar roboretur, quandocunque verò ex-

Ll ij. ces-



cesserit fluxus ex vniuersali capite prohibeatur.

Secundum: si jungitur vlcus intestini vltra intentionem, ad mandans gratia recipientis, exigitur etiam phlebotomia, & purgationes iteratæ permixtæ adstrictioni, quæ respiciant cacochyniam, & membrum tam mundans, quam suscipiens.

Num autem ante purgationem conueniant adstringentia, & in crassantia, videtur difficile, opponitur Hippocrates 2. aphor. 9. Dic: ex parte meatuum, & humorum purgandorum semper conuenit attenuatio. Verum ex parte materiæ purgantis, quando humor peccat per tenuitatem, aliquanta in crassatio, quia facit ad coctionem humoris, benefacit naturæ purgaturæ, multo magis in morbis defluxionis, quales sunt catharrus, artritidis, fluxus ventris, intendimus enim in talibus non simpliciter purgare, sed simul cum adstrictione; post purgationem autem vlcus abstergendum est, & confestim consolidandum iuxta varietatem loci, & humoris.

Aduerte quartò: tenesmi præcepta. Primum, si causa est vlcus recti intestini abstergatur, iuxta varietatem malitiæ humoris, & confestim sicut in vlcere intestinorum consolidetur.

Secundum: si pendet à flatu, vel humore imbibitis, abstergentia sanant, habita ratione temperaturæ humoris. Sint autem clysteres non vltra 3. xv. clechynia verò septem digitis longa, sed tenuia, & intincta violaceo tepido, ne exasperetur intestinum crassitie, vel siccitate ejus, ita vt incitetur ad dejectionem.

#### Remedia:

**P**rimum: in lyenteria à pituita, oximel, & si oportet schylinum, cum pauca aqua mentæ, purgatio cum elephanginis, vomitus autem roboretur cum diagaloriga; si causa est vlcus, continuetur succus plantaginis cum bollo armeno.

Secundum: in dysenteria intestinali, sufficienter primo abstergendum est; abstergens lene, prysanæ 3. xv. rosæci 3. iij. adipis



adipis seu sepi caprini ꝯ. ij. Si verò jungitur multus calor ad-  
datur succi plantaginis ꝯ. ij. si vlcus profundum est, cum mi-  
nori calore substituatur pro rosaceo, & adipe, mellis rosati ꝯ.  
ij. si saniosum est manans pus fatidum, paretur abstergens ex  
ptyzana ꝯ. x. aquæ oliuarum conditarum, mellis rosati aña ꝯ.  
ij. Validius est ex sola conditura oliuarum cum melle rosa-  
to. In errodente autem vlcere, quod indicat sanguis per in-  
terualla exiens, paretur clyster ex succi plantaginis ꝯ. xij. ce-  
rusiæ, tutiæ, aña ꝯ. ij. Validius est si in succo ebullierit aluminis  
ꝯ. s. ad quartanæ consumptionem. Post abstergentia sequatur  
consolidatio per clysteres restrictiuos recipientes trochisco-  
rum de charabe ꝯ. iij. potetur item bis in die succi plantaginis  
ꝯ. j. cum bolli armeni ꝯ. j. In frigido verò vlcere puluis, reci-  
piat bolli, thuris, mastichis aña ꝯ. j.

Tertium: in teneismo ex vlcere similis paretur curatio,  
tantum sint clysteres minores, & collyria tenuiora. Si verò  
causa est humor imbibitus, abstergentia sanant. Clyster in bi-  
liosa paretur ex ptyzana violaceo, luteis, sacharo, cassi. in pitui-  
rosa verò cum decocto surfuris, sofamino, & melle collato. Va-  
lidior, autem euadat permixta conditura oliuarum. Item col-  
lyria thuris, croci, sanguinis draconis, gumi, aña ꝯ. j. cum adi-  
pe renum caprarum. Validior est, si recipiat opij ꝯ. s. vel ex  
his cum albumine fiat lementum, & cotus intinctus impo-  
natur. Parentur verò ad dolorem sedandum saculi vesicæ, fo-  
menta, sessiones ex rosis, myrto, sanu græco, verbasco.

*De Fructibus.*

**A**duerte quintò: Propositio prima: de natura fructuum.  
Fructus apud Theophrast. 3. de plantis, & 2. alim. in ini-  
tio, est id quod constat ex carne & semine. Editur autem so-  
lum semen, quandoque totus fructus; suntque duplices, quidā  
fugaces, vel præcoces, vel tempestiui, vel horarij, qui in horas,  
id est in canicularibus diebus maturantur, nec fere seruantur.

Ll iij Alij



Alij opaci, id est autumnales, vel conditanei, qui per autumnum sumuntur, & seruari queunt, & sumi, ut vicia, ficus, poma. Ex ijs nullus fere est boni succi omnino, fugaces autem omnino sunt mali. Quod si in ventriculo corrumpantur, parum absunt à veneno. Quare à frugibus homine nunquam recipiendi sunt, nisi parum, in prima mensa fatigato, & æstuantis; verum continens etiam tunc abstinere contentus lactuca, & aphrogalata (*requiã*) de euchymia 14. & 2. aliment. 20. licet exercitio multa eorum noxia prohibeatur 3. 1. doctrina 2. cap. 7. & ultimo. Si ergo conjectatur utilitas temperandi major, quam noxia cacochymia, commodè parcesumuntur, unde apparet in prandio magis tolerari, quam in cæna, ob maiorem æstum, unde videtur traxisse originem, quod vulgo opinatur, ad cænam aurantia, & melones noxia sunt.

Num autem pueros magis lædant, & in tempore omni, in autumno, & num tardent senectam, quod quidam inquirunt. Dic de 1. 6. coll. 6. cauere pueros à fructibus. Unde quidam colligunt plus lædi pueros. Sed oppositum monstrat experientia, & ratio, quia serum fructuum magis dissipatur à valido calore puerorum, & à perpetuo exercitio eorum, & ob similitudinem in humiditate temperamenti minus offenduntur. Quare Auer. prohibuit fructus in pueris edacibus, tanquam frequens peccatum, non tanquam grauius.

De 2. 4. aliment. 46. cauetur in autumno usus fructuum. Unde eliciunt tunc plus lædere, sed non videtur, quia autumnus non est obnoxius putredini, quæ ex fructibus timetur, & humectant temporis ariditatem. Quare ideo prohibuit, quia tunc plurimum abundant, vel prohibuit frigidos humidos, ut melones, & persica, quæ tunc deficiente calore temporis citra utilitatem lædunt.

De 3. dixit Hippocrates senectam retardare. Primò, per calida, & humida opposita temperamento senum. Secundò, per roborantia calorem innatum deficientem. Tertiò, per irrorationem membrorum balneis, & frictionibus. Quartò, per  
exsic-



exsiccantia humiditatem aqueam efficientem rugas, vt triphera. Quintò, per reprimentia dissolutionem humidi à calido refrigerando, vt fructus & aqua 1. cant. 131.

Secunda propositio: de modo sumendi fructus, fugaces non sumendi sunt sine pane, sicut & reliqua praua edulia 4. acut. 93. maturissima enim & simul cum cibis sumpta minus nocent, de euchymia, & de aliment. citat. Præterea non sumantur à jejuno, lib. de affect. ad fin. tunc enim quidquid sumitur magis iuuat, aut offendit, partim quia trahitur à corpore inanito, partim quia communicatur integrum non alteratum ab alimentis.

Præterea requiritur, vt integre maturentur in arbore sua, alioquin gignunt succum tenuissimum, crassissimum, & gelidum, quod de nostratibus pomis dixit 2. aliment. 20. Cur autem palea maturent fructus? Dixit 12. problem. 13. quia in paleis est calor sufficiens præcoquere immatura, citra putrefactionem, & trahere simul vaporem aliquem incipientem putrere, in quo non significat, quod Conciliator dubitat calorem palearum esse eximium, nam calidiora forte putrefacient fructus.

Num autem sicut immaturi reprobantur, ita excedentes maturitatem, quod in carnibus, & piscibus accidit? Dic: quando fructibus per immodicam maturitatem vermes innascuntur, & rumpuntur, ceu venena fugiendi sunt, minimum enim quod ab eis accidit est lethalis febris, apud Ras. 2. aphor. 5. non enim sequitur, nisi ad putredinem; putredo autem in prauo alimento deletheria est, quod apparet in mortis, & melonibus, & pomis excedentibus maturitatem, imò & ex ficibus, licet meliores fructus sint hiante apice; quosdam mortuos memorat Tornamira, & apud nos quosdam ex senibus.

Præterea sumantur fructus actu refrigerati, nam aliter amittunt vtilitatem illam refrigerandi astuantes. Qua de causa lib. de euchymia citat. 13. refrigerandi gratia iubet præsumi ficus refrigeratos, quamuis propria caleant, vel quia viscerum interna



interna tantum superficies actu calet, quæ actuali frigore emendatur, unde obtinuit usus, ut fructus aqua macerati sumantur. & judicentur pessimi meridiani calentes. Nam tales statim ebulliunt non solum intra corpus, sed etiam extra.

Tertia propositio: de tempore sumendi fructus. Quidam eorum lubrici sunt costu faciles, & sic corruptu. Alij verò solidi. Priores oportet precedere cibum, reliquos verò subsequi. Addit Ras. 4. Almanf. 4. & Galenus 2. aliment. de prunis, lenientia melius sumi aliquanto tempore ante cibum, supra potato dulci quopiam, quia ita vis lubrica impermixta cibo magis operatur.

Nec illud obuiat Hippocrati præcipienti, ut sumatur fructus cum cibo, propter paucam moram interpositam, solidos verò fructus volunt sumi paulo post cibum, non statim, ea ratione, quia statim sumpti cogunt exire alimentum à ventriculo ante integram coctionem, & quia cum citius aqua conficiantur sumpta aliquot horis à cibo, simul cum alimento præcoquantur.

Sed est & alius usus horum solidorum fructuum, ut tollant nauseam, ex carnum pinguedine, & detrudant alimentum ad fundum ventriculi. Quare si parce sumuntur, possunt in 2. mensa sumi.

Num autem adstringentes fructus in secunda mensa soluant. Discrepant 3. aliment. 20. & 2. can. cap. de citoneis, & pyris, post cibum soluant ex 2. aliment. 22. Verum ita videtur distinguendum, si præsumptum alimentum est lubricum, si ventriculus debilis, si adstringens fructus, copiosus egregie soluit, in contrarijs verò statibus adstringit.

Quarta propositio: de partibus fructuum. Incoctiles partes præstat omitti, ut semina vniuersa, & cortices vuarum, ficuum, pyrorum, malorum 2. aliment. De vis excipiendum est, quia utilitas descensus esset major, quam noxa ex impedita coctione, quomodo in pinguissimis, ut in sesamis peiora sunt decorticata, ex Isaac in particularibus, & aliquando præcipit



cipit Tralianus, vt mandantur, acini vuarum non integre diglutiantur.

Quinta propositio, num super fructus sit bibendum lis est: Aristoteles lib. 21. problemat. 8. affirmat ea ratione, quod bulliunt in ventriculo, quare prestat extinguere feruorem eorum, ne putreant, vel refrigeratione aqua, quomodo comendatur ad eandem retentionem potus frigida in casu, vel maiore calore vini, sicut flama minor a maiori extinguitur. Preterea lib. de affect. ad fin. cuiusvis alimenti malitiam, ait vino emendari, & Galenus 4. acut. 115. speciatim, item 3. diet. laudat post ficus vinum purum.

Contra scribitur 3. 1. doctrina 2. cap. 8. Dic: concurrat ex aduerso penetratio vini differentis malum alimentum ad corpus; & emendatio cacochymia simul cum sedatione, vel emendatione ebullitionis, videnturque posteriores causas prestare.

Sed quid bibendum est, quantum, & quale. Dic: in calido ventriculo aqua, & super fructus calidos; vinum in frigido, & supra frigidos. Addit Concil. differentia 122. quod peculiariter ficus, & vna exigunt aquam; argumento quod si extra infunduntur, vino indurantur, & quod ex supra potato vino quidam perierunt, alij pessime habuerunt, est autem magis necessarium vinum potens, quando alimenti malitia periculosa, & vt in peponibus, vel coctio difficilis, vt in anguilla, lampetra, caseo, vel cum multa est alimenti humiditas, vel frigiditas, aut status, vt in fungis, persicis, & pyris. Quo circa apud Diosc. & Galenum horum omnium theriaca vinum est; & vulgo supra crudum purum, pessimum &c. Quantum autem & quale? Dic: cum cessatio feruoris, & emendatio cacochymia emendetur ex paucis, citra noxam distributionis dictam, prestat vinum esse paucum. In quo non sunt audiendi Salernitani bibuli sequentes gustum maxime in musto. Quomodo scribunt, adde potum pyro, sine vino sunt pyra viris, & vulgo scribitur (*sobre penas vinho bebas, & o vinho si ja tanto, &c.*) & rufus.

Mm

Ca-



*Cascus, anguilla nimis obsunt si comedantur,*

*Ni tu sepe bibas, & rebibendo bibas.*

*Persica cum musto vobis damus ordine iusto,*

*Est caro porcina, sine vino, peior ouilla.*

*Si tribuas vina tunc est cibus, & medicina,*

*Singula post ona pocula sume noua.*

Sexta propositio: num conueniant febrientibus. Dic: in ratione alimenti, sunt sanis noxij fructus fugaces, ita vt nunquam agrotauerit Galenus, quandiu ab illis abstinuit, quomodo non magis ludent febrientes. In ratione medicamenti, multi ex illis conueniunt, scilicet adstringentes in ver-  
tris affectibus requirentibus robur. Acidi in feruore ebullien-  
tis sanguinis, perfrigidi verò in valido calore, apud Galenum  
1. ad Glauc. de tertiana, & apud Tralianum cap. de tertiana  
exquisita de phrenitide, & causa laudantur pepones, & dura-  
cina. Citra has tamen necessitates rejicit 1. acut. 18. vniuersa-  
liter acida febrientibus, etiam oximel, eo quod exasperat.  
Quod videtur contrarium 4. simp. 7. asserente acidum aqua-  
biliter penetrare, ideo non exasperare, absolute tamen exaspe-  
rant. Adde quod acida sicca, & in corpore puro cohibentur 2.  
aliment. de pomis. Quare medulla aurantij non est frequen-  
tanda in febribus, adstringentes verò demittantur, quoniam  
pugnant duobus scopis generalissimis putridarum, scilicet de-  
obstruendi, & vacuandi excrementa, quare cum punica om-  
nia adstringant, non est tutus eorum vsus in febribus 7. simp.  
cap. de rhab. Vnctuosus autem fructus, ob inflammationem, duri-  
tiem, & calorem, solæ amigdalæ admittuntur in febribus, non  
biliosis, sed prius macerentur in calida, vel inter coquendum  
spuma auferatur.

*De Fructibus primæ mensæ.*

**S**eptima propositio: fructus primæ mensæ sumendi, ob lu-  
bricitatem, vel facilem corruptionem, vel pungentem acri-  
moniam,



moniam ita locantur, ficus, vuæ, cucurbita, mora, pruna, zizipha, cerasa; persica, pepones, vnedo, cappares, oliuæ. Primus locus præstatur ficubus, si non morantur in ventriculo, id quod si fiat, non solum recentes, sed etiam carica scabiem, & pediculos creant, quod argumentum est, apud Galenum alicujus cacochymia. Verum Auicena magis refert ad proprietatem ficuum mandantem sanguinem ad cutim, quo circa etiam Diosc. laudauit ad eos quos longa ægritudo decolorauit, & vulgo decoctum eorum exhibetur prouocandis exanthematibus puerorum. Inter eos autem dixit Hippocrates 2. diet. pessimi sunt præcoces (*lampos.*) Optimi postremi (*renaldios*) videtur causa, quia præcoces minimum caloris experti plus excrementi habent, coctionis autem minimum. Postremi è conuerso. præstantissimæ sunt carica, cum juglandibus, amigdalibus, aniso ad deobstruendum, & vt veneno resistent lib. de euchymia de fructibus (*queijo de figos.*) Quod ergo 2. continent. reprobantur propter lactis venenum, locum habet in immaturis, in reliquis autem residua vis lactis benefacit extergendis renibus, & vesicæ, sunt autem æstuiosi, apud Hippocratem diet. 2. quare biliosis jam induxit hæcticam ingens copia caricarum experimento pueri, apud Sauanarolam. Admonet autem, vt inter digitos modice atterantur ante esum, credentes sic reddi suauiores, & ventri salubriores. Causa est 2. problem. 23. quia sic vndique irrigantur dulci succo, vsque adeo autem attenuant, vt rami ficulnei, cum carne bubula velociorem faciant coctionem. Quod Auic. dure interpretatus est. Tacuinus ait substantia incrassant, qualitate tenuant. Recentes verò ficus in medio sunt incrassantes, & attenuantes lib. de attenuante 10. Auic. ait coricas abscindere sitim ex phlegmate salso, & excitare sitim, vt intelligatur ex Diosc. simpliciter esse siticulosas, auferre tamen sitim ex pituita salsa, sicut anisum. Ventriculo verò minus noxiæ sunt carica, quam recentes. Verum vtræque incommodant ventriculo laxantes ipsum, quod Diosc. dixit noxias defluxionibus in ventriculo. Galenus ergo

Mm ij

2. ali-



2. aliment. de melopeponibus, dicens autumnales fructus esse stomaticos, fugaces verò caco stomachicos, intelligatur facta cōparatione ad fugaces, non simpliciter, & quod Auic. dixit mirabiles esse, cum jejunium adest, explicandum est ex Galeno, non esse sumenda post alia alimenta, ne in ventriculo corrumpantur. Cur verò tam molles fructus dentibus noxij sint, explicauit Aristoteles 21. probl. in fin.

Sequitur vua secundo locò numerata supra, juxta vniuersalem numerationem, & explicationem, si non corrumpuntur, immo si accedit ambobus fructus corrumpi, multo minus noxa ex vuis est propter remedium. Est autem melior, apud Auic. alba. Galenus 2. aliment. probat eas quæ reguntur tenui cortice, & minoribus acinis constant, & multa carne quas vocat generosas, alunt enim magis, & minus subducunt, quam quæ constant pauca carne, & multo succo. Quis verò vocant duracinas, paucum succum gignunt, quales sunt (*ferrais, mourifcas, d' Alicante.*) Constant vuæ, scopo- (*engaco*) & acino (*bag.*) Rursum acini partibus quatuor constant, folliculo, vel cortice, vel membranoso tegumento, vel vinaceis, & seminibus, quæ 6. simp. appellat gaguta, vel semina vuæ. Tertiò, carne calente. Quartò, succo inflante. Aristoteles 20. problem. 24. dixit vuis, pulmulis, myrtis, quandiu acini prauis sunt, aut paruos, aut nullos esse nucleos. Cum verò adoluerint, grandescere, eo quod animata non fundunt semen, nisi postquam adoluerint, quod apparet in filice, scolopendria, & phylitide. Nec hæc sententia Aristotelis obuiat Galeno præferenti acinos minorum, nucleorum, quia nucleis parui ex ætate non præferuntur, sed qui parui sunt ex specie fructus, est autem aliquid discriminis, dum Hippocrates diet. 2. præcipit vt cum nucleis sumantur, & ab eo Plinius lib. 27. cap. 1. Itac verò non solum semina, sed etiam cortices sumi iubet. Contra docente Galeno 2. aliment. & Haly 7. theor. 19. & si generaliter loquuntur, magis recipiendi sunt posteriores, quia alimenta cōmodè emendantur per contraria condimenta, non per condimenta insu-

pera-



perabilia natura, qualia sunt cortices, & grana. Quod item de cacoehymia lib. 8. dixit vuas, nihil habere culpabile, subaudiendum est momentaneo, siquidem carica licet meliores non omnino probi sunt succi. Emendantur autem valde vua pensione, & si per unum tantum diem pendeant, apud Auic. meliores sunt si diutius penderint, modo non aruerint apud Diosc. Dixit autem Galenus 2. alim. 9. appensas nec ventrem cohibere, nec appetentiam, quae intelligenda sunt, non momentanee efficere, quod operantur illae, quia in vinaceis seruantur. Nam apud Diosc. omnis appensio ciēt appetentiam. Sauanarola putat pensiles ante cibum sumendas esse, recentes autem post, ne flatu impediāt coctionem, quod refellendum videtur, nam lubricantia anteponenda sunt, maxime illa, quae per moram valde laedunt, qualis vua est 2. alim. 9. pensilis autem, quia ex Galen. citat. ventrem non mouet, nec facile corrumpitur, potest etiā postponi. Passularum verò temperamentum 2. alim. 10. in acerbis inclinat ad frigidum; in dulcibus ad calidum, leniuntque morsus, 3. verò alim. 20. sunt temperata, & 14. 3. 21. passulae sub acida conceduntur in intemperie calida hepatis. Verum Serapio statuit eas vniuersaliter calidas, siccas in 1. Vulgo autem creduntur adurere sanguinem, unde Hippocrates in febre eò nomine eas prohibet; & Azara in pract. tract. 16. cap. 5. numerat inter biliosa, quod magis recipiendum est, quam quod scribit lib. de affect. in fine esse pituitosas, videtur enim ibi Auctor in multis edulijs vti verbo (*phlegmatica*) pro biliosa, vñ quorundam priscorum, & quod Galenus dixit, sanare eas morsus, intelligatur non frigore, sed abstersione quadam, cum aequalitate temperamenti. In electione autem 2. alim. non est faciendum iudicium ex colore. Verum Isaac in particularibus dixit albam esse frigidiorē, & minus adstringentem. Quare Plinius lib. 23. cap. 1. elegit albam ad thoracis vitia. Quod ergo legitur apud Diosc. lib. 5. cap. 1. albam magis adstringere, videtur accidisse vitio librarij, licet hic asseratur à Serapione, & Auicena.

Mm iij

Cum



Cum autem iudicium ex colore sumatur à dictis Aucto-  
ribus in vuis, & ficubus, intelligendum est Galenum voluisse  
potissimum iudicium alimenti ex gustu faciendum esse, mi-  
nus ex colore, ex modo substantiæ, & cortice. Antiquis præfe-  
rebantur corinthiæ nobis (*assarias*) partim ob plantæ nobili-  
tatem; partim quia sole siccantur. Nam vulgares, plenis ca-  
lathis imittuntur in aquam ebullientem, cum faniculo, frusti-  
bus alliorum, sacharo, oleo & melle, vnde extractæ in filice  
amplo siccantur. Legitur item 2. aliment. austera adstringunt  
ventrem, & adhuc magis acerbæ; dulces verò medium obti-  
nent quodammodo in ipsis locum, emendandum est, mediam  
quodammodo in ipsis dispositionem efficiunt, sentit enim pas-  
sulas dulces, non roborare ventriculum, nec supinum redde-  
re ventrem, non laxare, nec retinere, quod de totis intelligē-  
dum est. Nam dulces exacinata initio mensæ soluunt, maxi-  
me supra potato vino dulci 2. diet. & 5. theor. 19. licet Arun-  
della neget in epistola. Nam Isaac dixit esse incommodam na-  
turalibus nervis obstructis, etiam si sine nucleis sumantur. Ve-  
rum 3. aliment. scribitur obstructiones, ut dactilos non effice-  
re, & vulgo omnia dulcia obstruunt præter sacharum, & pas-  
sulas.

Dic: passulæ cum sint præditæ vi abstergente, leuibus ob-  
structionibus conferunt. In magna verò obstructione, ob im-  
becillitatem abstergendi non proderunt, & ob dulcedinem au-  
gebunt obstructionem, vsque adeo, autem sunt amica hepatis,  
quod Tralian. lib. 3. cap. 15. appellat peculiare hepatis alimen-  
tum, & vehementer extollit Galenus 2. local. 7. ita ut sola sæ-  
pe sanauerit dysenteriam hepaticam experiente Sauanarola,  
& Auic. 16. 3. tract. 2. cap. 1.

Cucurbita laudatur inter fugaces, sed ab Arabibus prohi-  
betur obnoxijis colicæ. Cucurbita verò indica (*abobara de Ca-  
lecut*) multo frigidior, & horridior est vulgari.

Sequuntur mora apud Galenum, scilicet si opportune su-  
mantur, non corrumpuntur, nam si vitiantur multo deterius  
reli-



reliquis fugacibus corrumpuntur. Quare solis horis matutinis in ventriculo mundo conueniunt. Mora autem Celsi, vel sicamina (*de moreira*) citissime per aluum descendunt, cum tamen habeant permixtam vim adstringentem, itaque vel credit Galenus citat. descendere propter solam lubricitatem, vel quod magis videtur propter permixtam vim soluentem. Quod Auic. praeue interpretatur dicens id accidere à mordaci earum acredine.

Batina verò vel rubi mora (*amoras de silua*) magis adstringunt, sed cephalalgiam mouent, quare abluenda esse volunt.

Sequuntur prunæ, in quo genere præferuntur Damascenæ, & creduntur (*caragocanis*) præferuntur autem in bonitate succi. Nam minus reliquis succis laxant, apud Galenum, & Diosc. Quare corruptæ vulgares descriptiones soluentium præcipiunt pruna Damascena. Secundus locus datur Hispanis Auic. verò cum Isaac præferunt nigra, nobis optima sunt nigra dicta (*reinoes*) de natura, alibi (*d' Alanquer*, vel *caracounta*.) Secunda laus (*reinoes de cal*) exactissime maturas laxant enim magis virentia siccis. 7. simp. Nam præter alia sere non siccantur, nisi *reinoes de cal*, quæ cum adstringunt, etiam post exactam maturitatem, & asseruationem retinent aliquid maturitatis, instar aliorum fructuum adstringentium. Tacuinus ait pruna sicca fastidium inducere, sunt autem ad soluendum leniter tantum coquenda, partim quia soluentia leniendo non iuuantur coctione, apud Mes. in vniuersalibus cap. de coctione, partim quia vniuersorum coctorum jus recipit vim quandam, coctum amittit 3. aliment. 3. 2.

Ceresa apud Isaac sequuntur iudicium prunorum, sed satis comparantur moris, nam ceresa omnia participant adstrictione 2. aliment. inter quæ dulcia (*docares*) insensibilem habent adstrictionem, & catharrota sunt. Alia meliora sunt maiora, & duriora (*bicais*) adstrictione, & acore manifeste participantia. Tertia acore multo manifestiore innocentissima (*ginjai*) Quartana adstrictione, & siccitate manifestiore dicta

(de



(*de fūco*) hæc postrema ventrem retinent, & à cibo sumenda sunt, & Diosc. & Galeno 7. simp. de siliquis. Quod ergo scribunt Salernitani. Cerefa si comedas tibi contert grandia bona, & de carne sua, sanguis erit tibi bonus, immodice dictum est. Quod item 7. simp. scribitur acida conferre ventriculo pituitoso, explicandum est ex 2. aliment. 21. Quod si in ventriculo continetur humor crassus, non perfrigidus, acida conferunt, si verò perfrigidus est conferunt acria.

Sequitur zizipha, id est serica, barbaris jujubæ (*maçans de masega*, vel *de paraiço*) licet mala paradyfiana alia sint apud Latinos. Reprobantur autem ziziphæ 2. aliment. tanquam inutilia, verum Arabibus extolluntur merito ad adstringendum sanguinis feruorem, & sanguinem in crassandum, potissimum thoraci conducentes.

Perfica quandoque sunt ad species multas genus, quandoque distinguuntur, cœu species à præcocius, & Armeniacis. Ergo præcocia, vel bericoca (*albicorques*) sunt. Armeniaca verò nostri (*mira olhos*, vel *damaſcos*, vel *fruta noua*) laudantur autem hæc postrema, ob suauitatem, viles habentur (*mollares*) licet 5. theor. 19. & apud Tacuinum de Persicis facilius coquantur, & descendant à ventriculo duracinis, licet reprobi succi sint magis. Duracina autem laudauit Tralian. cap. de diaria ex cruditate, tanquam agre corruptibilia, & calidis ventriculis accommoda. Inter duracina autem proferuntur lutei, pilosi, rotundi, vulgo (*maracotoens*) quasi mala cotonea, quia creduntur orti ex insertione Persici in cotoneum. Næ dissimiles sunt vulgares (*romanos*) lutei, pilosi, oblongi, & de *ferreira*, cætera similes, sed depiles vulgo (*caluos*) vniuersaliter autem succus Persicorum prauus est, inducens febres prolixas, & difficiles 22. eont! & 2. Almanf. 26. indicium est, quod castello seinduntur, paulo post odorata fatent. Frustra autem quidam putant Persicum esse Perseam, lethalem arborem, cum Galenus de veraque agat tanquam sibi notis.

Pepones immaturi numerantur cum melopeponibus, & cu-



cucumeribus. Nec facile est huiusmodi fructus distinguere. Tacuinus opinatur melonem dulcem nostratem calidum esse, & Galeno ignotum. Verum cum de cucumeribus constet esse (*cogombros*) & de citrulis (*pipinos*) quasi citrinis, eo quod per maturitatem flavescant, videntur particulari nomine pepones esse (*pipinos*) melopepones (*meloens*.) Quod autem 2. aliment 5. Galenus ait in peponibus non mandi scem en cū carne, sed in melopeponibus, videtur inuersum errore librarij, vt conueniat secum in principio capitis. Vniuersum hoc genus prauum est, vt etiam melones à quibusdam valde reprobantur, argumento quod radicem habeant paruissimam, quod celerrime crescant, quod in terra jaceant immoti, quod ab aëre citissime mutantur, quod relictī paruissimo spatio putreant, & re vera hæc genera videntur inter fugaces insalubria esse, & si morantur in ventriculo delectherēē corrumpuntur lib. de euehym. 8. licet in lib. de affect. in fin. alimentum eorum malum non sit. Verum inter ea ob suauitatem, & odorem etiam Galeno præferuntur melones, vel tempore tantum calidissimo, & hoc jejuno, supra potato pauco vino albo meraciori, ad emendationem intemperamenti, & augmentum facultatis diureticæ. Præterea Traliano summopere cōmendatur in tertiana pura, & reliquis morbis exquisitè biliosis duabus horis ante accessionem copiosus pepo, aut *melo*.

Cur autem commendentur melones graues, rugosi, quorum pediculi odorati sunt, & lenti, sectionesque latiores. Causa est quia rugæ significant siccitatem emendantem magnam eorum humiditatem, ideo in terra sicca meliores sunt, quam in irriguis. Graues probantur ob plurimas partes terreas, & ob coctionem; odor autem pediculi, & lentor significant coctionis probitatem. Nec secus ex magnis segmentis significatur siccitas, sunt autem meliores pepones, & fabæ minores, videlicet quia pepones increscentes longe facilius corrumpuntur, quod indicat prauus odor eorum. Licet autem melo sit humidior pepone magis tolerat maturitatem, quia cute regitur de flore.

N n      Fabæ



Fabæ verò minores præferuntur, quia facilius coctiles sunt, indurantur enim postquam adoleuerunt. Quod ergo 2. aliment. traditur pro nota bonitatis fructuum summi maturitas, intelligatur, vt plurimum. Nam citruli, fabæ, amigdala, nux, olea omnia, & arborum germina meliora sunt immatura, & quod per maturitatem indurantur, & adhuc immatura habent calorem sufficientem ad sui coctionem.

Vnedo fructus est arbuti (*medronheiro*) vel erundo, apud Plinium lib. 15. 24. Nomen vnedomis habet ab argumento, vnum tantum edendi, noxius est capiti, & ventriculo, vulgo commendatur aduersus pestem, tam fructus melle conditus, quam aqua stillatitia foliorum: 6. simp. appellatur epimolis arbor ejus. Caterum non sunt admittendi Ruel & Math. opinantes arbutum esse, apud Diosc. & Galenum comarum, cujus fructus est memycilon, fructus est acerbus, qui nunquam dulcescit, & est genus glandis deterius quercina 2. aliment. 38. Nec conuenit nostro arbuto descriptio comari, apud Diosc.

Cappares vtilissimæ sunt visceribus induratis, & ventriculo pituitoso sumptæ in initio cum oxaleo, & sacharo, vel magis cum oximellite. Quod ergo Dioscor. inquit nocere ventriculo, explicetur ex 23. continent. de non conditis, vel etiam ventriculo puro, quem lædunt suo morsu. Isaac asserit eas in ratione alendi prauis succi, & biliosi, vt aliquid addantur, oportet vt concoquantur, aut saltem post longam macerationem, exactissime abluantur, apud Diosc. & Galenum.

Oliuarum verò quædam sunt drupæ (*cortidas*, vel *retalbas*.) Aliæ colymbades (*de conserua*) tertianæ lacentinæ mediæ ex maturescence oliua. Vertuntur autem ex Tacuino in humorem sui coloris drupæ melancholicæ subducentes, colymbades biliosæ, & adstringentes. Sunt autem apud Isaac colymbades in medio cibi assumendæ, & sunt frigidæ, apud Galenum tamen præponuntur cibarijs, quia cum garro assumebantur



bantur, esse autem frigidas durum est, cum pisces saliti 2. c. n. reddantur calidi sicci, & colymbades augent bilem. Nec serus durum est, quod scribit Auic. de cap. particularibus salitis conferre asthma; forte legendum est non salitas.

*De Fructibus 2. mensæ.*

**O**ctava propositio: fructus secundæ mensæ sunt punica, poma, pyra, cotonea mirta, sorba, nespilla, castanea, juglans, auelana, nux Indica, citrum, glandes, tubera, fungi, strobili, dactili, melongina, cerebrum palma.

Punica: alia dulcia sunt, alia acida, dulcia verò temperata, ita ut incommodent febribus acutis 2. continent. Quare si conceduntur i. 4. in tertiana notha intelligenda sunt permixta, adstringunt autem omnia, ita ut eo nomine interdican- tur in phlegmone Iecoris 13. therap. 13. & in pleuriti, apud Tralianum.

Verum apud Auic. dulcia solvunt, & cōmendantur pleu- reticis, maxime apud Mesues, syrupus ex succo ejus, mon- stratur autem experientia totum punicum etiam dulce, cum acinis adstringere lib. de affect. in fine, & obesse pleureti- cis, licet solus succus cum sacharo soluat, & pleureticis ju- uet.

Nec sequitur: punica solvunt comprimendo, cum aci- nis magis solvunt, nam sicut mirabolani licet comprimendo solvant, rosti tamen non solvunt, quia vis solutoria consistit in parte calida, ex qua trahunt certum humorem, juuatur autem ea actio compressione boni succi, dixit etiam Diosc. & Auicena 2. 1. citat. quibus magis standum est, quam Aetio lib. 2.

Sunt autem cōmodiora ventriculo nauscenti, quam reli- qui adstringentes fructus 2. alim. Videtur quod in illis est sim- plex adstrictio magis prohibens vomitum, sed in punico per- mixta vis absterforia potenter deturbat bilem à ventriculo.

N n ij      Diosc.



Diosc. dixit acida peculiariter convenire aestuanti ventriculo, verum apud Ras. 4. aphor. 19. & 2. can. acida punica, & omnia acida à proprietate laedunt ventriculum, quare in inflammato ventriculo dulco-acida præstant in temperato dulcia, in frigido autem in totum interdiciuntur, suspecta enim sunt propter flatum, nisi illota sumantur, & aniso permixta. Cur autem infestant linguam, & labia, oculos verò reddunt nitidissimos. Dic: causam esse tenuitatem liquoris tepidi permixti adstrictoria facultati 9. simp. cap. 17. Quod apparet in punicis & cinera, cardo, & cortice in glandis, & moris.

Nec obstat quod scribitur oportere adstrictionem permixtam esse remissam, quia id exigitur ad humorem, quem ibi quærit, verum ad infectionem benefacit adstrictio valida permixto succo penetrante, quod observant tinctores, & atramentarii, siue quod Galenus ait, quia sequens adstrictio prohibet exitum tinguentis liquoris præcedentis, siue quod magis videtur consentire experimento, in quo præcedit adstringens, quia siccitas præcedens facit, ut liquor tingens valde fugatur à materia præexsiccata.

Quod autem ea infectio sit manifestior in lingua, in labris, in linteis, causa est innanitas facile ebibentium, nam in cornea propter sui densitatem liquor penetrat solas sordes, non corneam, quare redduntur oculi splendidiore, & nitidiores. Quod si Aristoteles 3. problem. 21. vocat corneam ratam, intellexit perniciem speciebus externis. Cur autem mora virentia tollant infectionem maturarum, non est causa major abstersio viridium, ea enim requirit maiorem calorem, sed quia ob similitudinem jungitur priori succo, & quia ob defectum caloris, & coctionis minus lentus est, quia succus maturarum reddit totum liquidius, quare defluit, sicut digiti illiti emplastris, aut resinis vntione olei absteruntur, non aqua, vel quia cera gumæ, vel resinæ cum oleo coeunt, non cum aqua. Potest causa addi ex Plin. lib. 15. cap. 24. quod succi mori trini colores sunt, primus candidus, mox ruber, 3. niger.

Poma



Poma (*maçans*) licet Latinis Maciana sint species quadam illorum à Maciano medico dicta, vnde maciatori vngentum, & macij panes, si Hermolao creditur, roborant dulcia odore suo cor, & ventriculum, reliqua magis esu. Celsus autem lib. 2. cap. 20. & 21. recenset dulcia inter euchymia alimenta; acida verò & acerba inter cacochymica, Auicena 2. 1. de regimine ejus, quod comeditur, & bibitur.

Generosa autem dulcia (*camoczas*, *pero de rey de Alcobaca*) & qua Diosc. vocat melionela, à celeritate nascendi, *anãas*, quas tamen proficitur esse difficilis coctionis, videtur quod non diu experta sunt Solem, ficus inter ficus (*lampos*) Auer. inquit 5. collect. poma gignere flatus in 2. & 3. coctione, ita ut parent ad ptyfim, qua de causa cōmode intinguntur in aniso confecto, vel assantur cum frustis cinamomi, vel gariophylorum infixis, aut etiam ea cauata immittuntur puluerata: Tralianus tamen ad hēsticos comendat.

Pyra omnia adstringunt & magis sicca, maxime de (*bagim*) inde *codornos*, *pardas*, *carnalhais*, *de conforto*, minus *botelhas*, & *doçares*. Succus eorum praefertur pomis, apud Auic. & Isac. Quare videtur immoderatio, quod 1. 4. 21. scribitur gignere humorem prauum, quem natura abhorret, sicut & quod scribitur 2. diet. Dura ventrem sistere, matura mouere, nam etiam matura opportune exhibita sistunt, à proprietate autem tollūt fitim 5. collect. 8. autem simp. ascribitur ea vis non proprietati, sed partibus pyri aqueis, vnde videtur originē traxisse. (*Se soubera o villão, como sabe queijo, pera, e pão, venderia o gabão*) quia videlicet siticulosa vis casei reficitur vi pyri reprimente sitim; laedunt autē pyra intestina, ita ut frequētata, maxime jejunis inducant colicam, apud Auic. Diosc. & Isac propter flatum crassum. Quare meliora euadunt si coquuntur additis sacharo, cinamomo, & aniso. Immoderatus tamen videtur dictum Salernitanorum. Si coquas antydotum pyra sunt, sed cruda venenum.

Cotonca græcis cydonia, contra distinguntur struteis;  
N n ij sunt



sunt autem strutea (*marmelos babaros*) cotonea (*galegos*) vtendum est magis cotoneis, quam struteis, cum quæritur adstrictio major, vel etiam ablato medutilio, infurta mastice assantur, nam diacitoniam minus adstringit, maximè si construitur ex præcoctis struteis, & adhuc magis si recipit succum. Quomodo autem cotonea, & punica apud Auctores prouocent vrinam, & quomodo apud Diosc. succus citoneorum conferat asthmaticis, & empiematicis, & cur vulgo profertur (*da cidra a ponta, do marmelo opé.*)

Dic: de 1. Auicena videtur significare fieri id per accidens ex ventris constrictione, sed sequitur vt omnia adstringentia prouocent vrinam, cum tamen in distillatione vrinæ vtantur adstringentibus. Quare videtur satius asserere partes aliquot tenues calidas esse, quæ transeuntes ad vtereras id efficiunt, forte etiam iuuat adstrictio sicut in his quæ soluant, semper solutio est à calido, licet iuuetur adstrictione. De secundo: adstrictio cotonei iuuat ad impediendam defluxionem asthmaticorum, absterfio autem expurgat.

Ad tertium omnium adstringentium mollissimum, & suauissimum prope nucleos, & ad pediculos est, sicut caro iuxta ossa in animalibus, in reliquis maturatio incipit à supremo, potissimum in citro, pomo grandi, & denso quod tarde maturefcit, myrta plus cotoneis adstringunt, cotonia pyris, pyra plus quam punica, punica plus pomis, sicut validius myrtis adstringunt forbæ, validissime nespillæ. De quibus corrupte citant ex Auicena inducere cephalalgiam, cum Auicena id referat de epimeride, quam vocat tellesinum.

Cur autem nespilla abundet nucleis & multis, & cur cum sit frigida, sicca tamen citissime putret. Hispanus ait plurimum ossis habet, ob duritiem plantæ, diuisi autem nucleis, quia siccitas separat, cito verò putret ob raritatem substantiæ, satius tamen videtur dicere, quia tota ejus caro iuxta ossa est, caro autem iuxta ossa citissime putret. Adde quod nespil-

læ



la colliguntur immatura, quare propter paucum innatum calorem, humiditas enim euieta cito occupatur extraneo calore.

Sequuntur genera nucum: Iuglans, nux, amigdala, vel nux graeca (*amendoas*) nux Pontica, vel auellana (*auellans*) nux Indica (*coco*.) Omnia lignosa, & oleosa, ideo difficilis coctionis, biliosis intensa, & cephalalgiam mouentia, maximè quidem Indica, inde auellana, inde iuglans, postremo amigdala. Temperamentum amigdarum, & auellandarum leuiter inclinatur ad calidum, juglandium vero calidum in 3. apud Auicem. sed magis asserendum est in 2. cum Serapione. Vnde colligitur commodè sumi nucs post uuas vel pisces, Salernitani:

*Sumere sic mos est nucs sociando racemos,*

*Et post pisces nucs.*

Et: *Vnica nux prodest, nocet altera, tertia mors est.*

Primam intelligunt myristicam (*nos moscada*.) Secundam juglandem. Tertiam balistam. Colligitur item biliosis febribus lac amigdarum incommodare, mirum autem est Tralium id concedere in lethargo, cum aperte somnum inducat.

Quod autem de euchymia 14. scribit juglandes praeferrī amigdalīs, intelligunt particulatim ad anthidoti mitridati confectionem, non in communi ratione alendi.

Num autem huiusmodi fructus sthomatici sint, Orib. Paul. Aët. numerant inter sthomaticos, & 2. aliment. de nucibus, juglandes dixit esse gratiores ventriculo *auelans*. Verum Isaac, Auicena, & Dioscorides numerant ea sthomaticis propter pinguedinem, & duritiem.

Dic: amigdalæ cum cortice roborant ventriculum, virides scilicet apud Diosc. reliqua calidos ventriculos laedunt, frigidas iuuant, & magis amigdalæ Indæ. Iuglandes (*auelans*) nimium. Videtur item Auic. confundere amigdalas cum auelans. Nam 14. 3. 20. & 21. super omnia extollit auelanas ad hepar obstructum, cum tamen auelana nihil habeat de ob-



deobstruens 2. can. imò aperte lādunt hepar, apud Raf. 4. aphor. 40. amigdalæ verò commendantur summopere hepatis propter vim deobstruentem, non modo amara, sed & dulces apud Diosc. Galenum, & Auic. Item Auicena cap. 6. de auellana dixit eam augere cerebri substantiam ex Hippocrate, quod reliqui omnes de amigdalīs citant, videtur causa euaporatio multa, & familiaris amigdalarum, quare inducunt suauem somnum.

Non est etiam contrarium, quod apud Auctores juglans, & auellana cephalalgica sunt, & tamen à Diosc. commendantur ad antiquos catharos, quia nihil pugnat aliquid per se lædere, quod conditum iuuat, jusculum ex medulla panis, saccharo, pipere, & depilis auellanis.

Nux autem Indica censetur non prauī succi, maxime pituitosis cum melle, sed auferendus est cortex ejus incoctilis, apud Auic. Cur somnus sub nucibus cephalalgiam inducit. Hispanus ait, defatigati agitatī humoribus frequenter decumbunt sub nuce, ob ingentem vinbram, quare densatis poris humores agitati caput petunt. Alia causa est grauitas nucum, sicut grauiorēs, & magis cephalalgici sunt ficus; florentem verò vineam serpentes fugiunt.

Citrum, vel citreum pomum, vel pomum citrinum, vel malus medica à regione (*cidra*) cujus species sunt aurentia vulgo citràngula (*larangas*) & flos ejus napha, & limones diuisi in limas minores rotundas, & limones oblongos majores, singula horum in triplici differentia, acida, dulcia, vinosa; rarissima est apud priscos mentio. Nam teste Plinio lib. 12. cap. 3. solum citri pomum afferebatur in Italiam ad medicamenta, vnde Virg. in Georg. describit incognitam sibi arborem, permiscens partim notas citri, partim aurantij. Quod ipsum Ruell. fecerunt, & Plinius in hebeno lib. 2. cap. 4. Temperamentum corticis citri temperatum est, vel parum infra, & tamen acris scribitur lib. de attenuante 10. in fine, & 2. aliment. 37. roborat ventriculum. Paulus item cap. de malo medico asserit esse  
agrem



acrem cum Aëtio, & gustu. Auicena verò cap. de citro calidum in primo statuit. Quare in Galeno forte legendum est, supra, pro infra. Sicut in glycerisa caro ipsius frigida est puitoso, & Galeno, & Paulo, & Serapioni tollens calorem ventriculi. Quod ergo Auicena asserit calidam in 1. non videtur recipiendum subdit Auicena, frigiditas tamen ejus major est, subaudi humiditas ne secum pugnet, semen ejus calidum est, & siccum in 2.

Quod ergo 2. can. asseritur calidum in 1. non est extoto recipiendum, & multo minus, quod lib. de medicinis cordialibus asserit esse frigidum in 2. quia amaror, & Galenus calidum in 2. indicant. Nec potest Manardus soluere quasi Auicena agat de acido, qui ibidem asserit Auicena semen confortare, ob soliditatem quam prabet spiritui. Acidum verò ejus frigidum, siccum in 3. 7. simp. citat. quare non standum Saunarolæ asserenti frigidum, & humidum in practica nam nisi siccaret non roboraret ventriculum, nec cohiberet bilem, quod videmus in phlebotomatis. Videtur autem acor aurantij crassior, & minus frigidus, ideo bibi patitur. In limonibus verò, & citro tenuior, & frigidior, ita ut in aurantijs succus sit frigidus siccus in 2. limonum verò & citri in 3. licet Musa in syrup. cum agit de syrupo ex acido citri, inter hæc sola postrema agnoscit differentiam, cum tamen inter hæc duo parum intersit. Ideo ad pisces assos, vel frictos, expetitur liquor aurantij, ad aues autem assas limonum, quia densitas carniū, & sapor obtusior requirit intinctum acutiorem, & tenuiorem, ideo & aurantia minus patiuntur exprimi quam limones, quia succus crassescit per expressionem simul, & amarescit, per expressionem membranarum. Vnde vulgo, *da laranja o que quizer, &c.* Videtur etiam contradictio dum Serap. & Auicena commendant citra ceu prohibentia vomitum & fluxum. Diosc. ait alium subducere. Diosc. intelligendus est de semine solo, quod & Auicena fatetur. Vniuersa autem quæ dicta sunt etiam apud Auic. meliora euadent si condiantur saccharo, vel

O o mel-



melle, eo quod mollescunt, inter quæ minimum calefacit caro citri condita (*diacidrão*) magis cortex conditus (*caſquinha*) magis toti limones, vel tota aurantia parua condita, aut etiam flores aurantij conditi, & ad huc magis caro aurantij (*lunajda*) quia cum melle conditur, & magis nuces virides condita.

Glandiferarum autem arborum triplex genus afferitur lib. de euchym. 14. Quorum omnium fructus glans dicitur *castanheiros* ferunt glandes, *castanhas*, *asinheiras*, ferunt oblongas glandes, vocatur acylus (*bol tas de porco*) quas ferunt. *avrilhos*, *ſouaros*, & *carraſcos*, inter quæ ſolæ caſtaneæ probi ſucci ſunt. Nam ex omnibus ſylueſtribus arboribus ſolæ caſtaneæ laudabiles ſunt lib. de euchym. 5. Licet locus corrupte legatur 2. aut. aliment., 8. boni & plurimi alimenti eſſe, ita vt cū furmentaceis certent. Quod ergo lib. de euchym. citato dixit ſeruandum eſſe in illis modum ne lædant, & lib. de attenuante 10. nullo artificio emendari poſſe quin prauæ ſint, intelligendum eſt in victu attenuante propter craſſitiem ſucci earum, & flatuum, & alui retentionem. Temperatura autem earum, apud Auer. frigida eſt, 5. coll. apud Haly 5. theor. temperata, apud Auic. & Iſac calida quæ varietas parua eſt, crudæ repudiandæ ſunt lib. de atten. 10.

Num autem elixæ præferantur aſſis. Hiſpanus negat, quia in flatuoſis per aſſationem multo magis remouentur flatuſus, per coctionem ſiccitas. Cum ergo caſtaneæ plus lædant flatu quam ſiccitate, merito præferuntur aſſæ, adde maiorem ſuauitatem aſſarum. Inter elixas autem decorticatæ præſtant, plus enim ita remouentur flatuſus ex 1. aliment. cap. de leguminibus, & quia ita horridior ſapor corticis non communicatur carni, commendanda tamen ſunt duo. Alterum vt calidi intingant illas in ſacharo, frigidi verò in melle, ſic enim cõmendantur Dioſc. pariter & emolliunt. Alterum vt aſſentur in furno, non in vaſe præparato, memorat enim Gaſſius ſenſiſſe ſe ex talibus ſpirationis anguſtiam periculofam, cuius cauſam



fam refert ad prauam carbonum qualitatem. Verum cum fumus carbonum etiam reliquis assis communicetur, & magis carni carente membranoso tegumento, videtur certior causa, inaequalitas assaturae talium, propter quam flatus extrusus à parte cocta retinetur in cruda, qui quandoque obsepiens meatus angustat respirationem. Is enim flatus causa est, vt inter assandum desiliant, & quia ob crassitiem castanearum descendere per intestina non potest, partim quia ascendit ad caput, inducitque cephalalgiam, partim retinetur in ventriculo, & acescit. Cur autem in glandibus potus suauissimus; dixit Aristoteles 2. probl. 12. eo quod exsiccata lingua ab acerbis potum dulcem ebibit, vel quia dulcis sapor aquae contrarius est acerbo. Quare iuxta contrarium magis elucescit.

Stroboli, vel grana pini majora ad differentiam minorum qui leguntur ex piceis (*de pinheiros brancos*) appellantur 7. simp. fructus boni & crassi succi, similis daetilis, sed melior, mordens tamen ventriculum, & pectus nisi pramacerentur in calida. Immoderatus tamen scribitur 13. 3. 36. ex alimentis esse maxime noxia ventriculo. Proprietate autem, apud Ras. 4. aphor. 42. expellunt prauam humiditatem, augent autem naturalem.

Daetili, vel fanicobolani, glandes palmae similes sunt strobolis, & caricis. Verum multo crassioris succi, quare inducunt cephalalgiam, & haemorrhoidas, cerebrum verò palmae, *palmitos*, humilis plantae roborat ventriculum, medium attenuantis, & incrassantis lib. de attenuante 40.

Tubera iudicantur media stirpis, & terrae sicut affixa terrae, apud Aristotelem ita appellantur, quia media animalis, & plantae iuxta herbam reperiuntur Athaneco hydno. Phylo lib. 2. cap. 32. vulgo herba, *tubareira*, gignunt succum crassiusculum, subfrigidum, sed non malum, similem amylo, & cucurbitae 2. aliment. 68. & lib. de euchym. 7. ideo cum aromatibus condit. Ras. tamen 3. aliment. cap. de radicibus, & 23. continent. & Auic. 2. can. proprio vehementer vituperat ea, eo

O o ij quod



quod confundunt tubera cum fungis male:

Cur autem post tonitrua plurimum legantur: Plutharcus in naturalibus quæst. dixit ex quibusdam, quæ ante tonitrua præerant sub terra, sed hyesciente terra propter vim tonitruui (sicut vina turbantur) extra prodeunt; apud alios verò causa est quia aqua tonitruui fecundissima germinat. Martialis:

*Facient tonitrua cenas.*

*Rumpimus altricem tenero de vertice terram*

*Tubera boletis poma fecunda sumus.*

Sed oportet ut non imponantur nobis fungi quidam qui intra terram oriuntur, tanquam pro tuberibus, sed cognoscuntur ex multa mollitie, & raritate si franguntur. Cur autem nix superposita tuberibus liquefcit; causa est quibusdam calor tuberũ. Verior tamen causa quia forbitur à terra.

Fungi frigidissimo, & crassissimo constant succo, & gignunt admodum prauum, fereque incocti deiciuntur 7. aliment. 69. & de euchym. 7. & apud Diosc. ex quibus timeatur apoplexia, perfocatio, & stranguria, à quibus malis, nec omnino tuti sunt boleti, qui soli ex fungis edibiles sunt, vulgo *tortulhos*. Nam aliqui letales sunt, *tortulhos de cagado*, dignoscuntur quia lethalibus supereminet lenta humiditas, & fracti statim putrent, boleti verò albi sunt dehiscetes cum primum è terra emergunt, nam antequam dehiscant, utriusque vocantur, *cocumelos*, coquendi autem sunt, apud Serap. 342. cum vino, & supra potandum merum, nam vtrumque illorum anthidotum est fungorum. De suauiate autem illorum scribit Martialis. Argentum atque aurum facile est tanquam, lannam mittere; boletos mittere difficile. Argumenta autem sunt malitia eorum, primum citissime adolefcunt, quæ celeritas indicat, vel summũ calorem, & plurimum, vel summum frigus 5. collat. 30. Secundum, quia fere prodeunt ad radices arborum, & prauarum vnde sugunt residuum alimenti pessimum. Tertium, ob summam laxitatem imbibunt vapores quosuis putrentes, & vrinam serpentum, & alliciunt ferruginem



nem metalli si prope est, accessus autem serpentium omnem stirpem prauam reddere dixit Hippocrates in epist. ad cratem. Quartum, quia noctu & post tonitrua magis crescunt, quæ duo indicant putredinem.

Melongena, mala insana dicuntur, eo quod amplitudinem habent citra suauitatem, valde enim crescunt, fructus est inditus priscis, nam prae quidam referunt ad mandragoram, cum & effigies sit dissimilis, & temperies quæ in his calida est & sicca in secundo. Incolumior est aliquanto sumpta cum aceto, quam cum melle 2. can: Verum perpetuo inducit melancholiam, & hæmorrhoidas, solus Auerr. 5. collat. 4. excipit eas, si cum carne pingui coquantur credit emendari propter contrarij permixtionem, partim propter multam earum suauitatem.

## C A P V T L.

### *De Hæmorrhoidibus.*

Incipit, Cum sanguis, &c.

**A**duerte primò : curandarum hæmorrhoidum præcepta. Primum, ex Auicena cap. proprio, si non vrgent aut dolore, aut inflammatione, satius est omittere, nam curatio non caret in totum periculo, si verò alterutrum dictorum adest, varie subueniendum est. Nam vel cæcæ sunt, nec fluere assuetæ, vel cæcæ sunt, sed assuetæ fluere, vel immodice flunt.

Secundum, si cæcæ sunt, nec fluere assuetæ, conandum est eas siccare, nisi natura fuerit valde melancholica, vel æger patiatur melancholiam 4. aphor. 25. Causa Galeni ibi quia vbi semel assueuerunt vtramque immoderantiam periculosam habent, siue nihil, siue plurimum fluant. Paratur autem exsiccatio primo anodinis, fomentis & vntionibus, si oportet opiat, deinde sectione basilicæ, purgatione cacoehymiae, exsic-

O o iij      canti-



cantibus intro extraque sumptis quibus, cum non perficitur aperienda sunt.

Tertium, si cæcæ sunt, sed fluere assuetæ prouocetur fluxio. Prouocatur autem sectione cephalicæ internæ, & intus sumpta apperientia, sanguinem fluxilem reddentia citra exsiccationem. Præterea balnea ex emollientibus, & emplastrum ex facæ, item frictio proluxa cum folio ficus, vel parietariæ. Si verò hæmorrhoides occultæ sint, supponatur acre colyrium, & dolori subueniatur cum cotto imbuto rosaceo. Postremo aperiantur sanguifuga, quæ per horas quatuor contineatur in munda aqua, & in cannula imponatur hæmorrhoidi, vincto prius loco sanguine pulli, cumque intendimus casum illarum inspergatur, aut sale aut cinere, possuntque alia substitui, ex aperi-tione autem cum phlebotomo quandoque secuta est fistula.

Quartum, vbi fluxus superfluit omni ingenio cohibendus est, victu scilicet adstringente, phlebotomijs basilicæ paricis, & remedis hæmoptoicorum intro, & extra adstringentibus, sed cauendum est à validis quomodocumque mordentibus, & si adstringunt 9. local. 6. ob eximium loci sensum. Quare met-allica lota laudantur, sicuti in affectibus oculorum.

#### Remedia.

**P**rimum sedantia dolorem. Foliorum cynoglossæ, maluæ, fanu græci, in decocto pannus laneus imbutus sape applicetur, & suffiatur, & saculus ex facæ imponatur, vel melilotum valde coctum teratur cum luteo, farina, fanu græci, & oleo persicoru n: in valido autem dolore diachylonis ʒ. j. rosacei ʒ. ʒ. luteum j. croci opij ana ʒ. j. Vel foliorum maluæ partes duas, foliorum hyosciami partem vnam inuoluta stupa madefacta assentur, & cum luteo, rosaceo, & croco trito impone. Validius opij gran. vj. rosacei ʒ. ʒ. cotus imbutus imponatur.

Secundum exsiccantia: radix de souana, vel *herua das almor-reimas*,



*reimas*, siue cum decocto lauentur, siue suspendantur, siccant enim eas, vel antimonium cum succo verbascei in coto inpositum, vel fiant cryspella sumenda quotidie jejunis per dies 9. ex radice verbascei lota, & siccata in clybano, ita vt teratur, & ex pari farina, & luteo frictis, vel filum sericum infundatur in rosacea, albumine, & opio, & cum eo fricetur radix, particulatim, abscondit enim eas sine dolore.

Tertium: prouocantia fluxum, aloes tenuissimi ʒ. j. fellis ʒ. ʒ. acetii ʒ. j. cum lanneo panno imbuto fricentur; in internis autem hemorrhoidibus fiat suppositorium ex hyera.

Quartum: restringentia fluxum. ℞. aloes thuris, sanguinis draconis, bolli armeni, pillorum leporis tenuissime conficorum, tela aranearum ana cum albumine. Item fomentum frequentandum. ℞. balaustiarum, rosarum, gallarum, nucum cupressi, sumac, phydium, myrti, acacia, thuris, ana bulliant in pari aqua, & vino nigro.

*De Necessitate compositionis.*

**P**ropositio prima: quidam fere reprobant usum componendi. Qualis est Plinius lib. 24. cap. 1. & lib. 22. cap. 24. De quo ita videtur sentiendum, præstat, si fieri potest, curare magis simplici, quam composito medicamento, ita etiam suadet Scribonius Larg. in epist. & Auic. 3. can. 1. & 1. de comp. general. 5. ultra Plin. citatis.

Prima ratio: compositio medicamenti in vna intentione quandoque auget effectum intentum, quandoque minuit, ergo ita curare est committere rem fortunæ, v.g. mirabolani, & violæ ambo vacuant bilem, alterum comprimendo, alterum leniendo, si ergo accidat violas præire, impediunt se mutuo in opere.

Secunda ratio: incertum est in composito fermentato, quod operatur forma fermentationis, quandoque enim auget, quandoque minuit operationem simplicium, de quo dicebat  
Aui-



Auicena citat. experimentum vincit rationem.

Tertia ratio; Galenus fere vititur simplici cujus habet probatum vsum, vt pote ad cholicos flatus sola ruta decocta 6. de locis 2. & 8. meteor. 5. Ad menses autem ciendos puluere calaminæ de sang. miffi. 17. Ad præparationem autem purgandi humores solo decocto pulegij 1. aphor. 24. in quibus calibus solet miscere ea quorum nominauit.

Quarta ratio : ex multis ingredientibus compositionem aliqua erunt sophistica, quædam antiqua, quædam praua, maxime vbi ignorantia simplicium in medico maior est, quam antiquitas, & negligentia in illis comparandis.

Quinta ratio: ex Obonele 5. cant. 1. compositio includit contrarietatem, & varietatem ad naturam, quare magis offendit, sicut morbus compositus deterior est simplici.

*De Syrupis tractatus.*

**A**duerte tertio : de syrupis. Propositio prima : syrupus deducitur à syri, id est trahere, & opon id est succum. Extrahitur enim succus à radicibus, plantis, & seminibus ; & saccharo vel melle permiscetur. Antiquis parum in vfu erant, nec admodum varij, sed ex solo decocto pulegij, vel origani in mulla, ad præparationem purgandorum 1. aphor. penult. Inter syrupos autem nostros, quidam simplices sunt, quidam compositi. Rursus alij longi qui non tam prolixam cocturam susceperunt; alij breues, qui per totum annum seruandi sunt. Item quidam habent permixtionem multæ aquæ stilatiæ ad sedandos ardores, talia vocant zulapia, vel julepa, validiores sunt syrûpi qui de nouo construuntur longi, eo quod non ex toto absumptum, habent decoctum, vel succum permixtum. Ita validiores euadunt syrupi addita aromatificatione, videlicet pro quauis lib. syrupi sumatur in calidis sandalorum alborum pulueris diamarg. aña 3. j. In frigidis autem cinamomi, & pulueris diambra aña 3. j. ligata in lino; post clarificationem



nem syrupi immitantur, & cum spatula premantur, & sinantur intus manere vsque ad syrupi in frigidationem, fere autem comoda permixtio ad ℥. ij. syrupi aqua ℥. iij. ne bile scat, in affectibus tamen ventriculi minuatur aqua.

Secunda propositio: frigidi syrupi sunt rosaceus, violaceus, papauerinus, endiuia simplicis, de endiuia Gent. de rosis siccis, citoneorum, mirtinus, de agresta, de acido citri, acetosus, oxifachara, sequenti ordine, rosaceus, & violaceus imbecilles sunt, & cordiales, concernuntque rosaceus magis naturalia, & violaceus spiritualia. De endiuia naturalia, de endiuia Gent. naturalia, sed potentius deobstruit, & roborat. Sequentes tres acetosus, oxifachara, de acido citri potentius extinguunt bilis feruorem, & attenuant, sed acetosus etiam remota attingit, oxifachara magis naturalia. De acido citri cordiale est reprimens prauam humorum qualitatem. Papauerinus plus in frigidat, caput & pectus, respiciens, somnum inducit, sequentes quatuor adstringunt, de rosis siccis lenius, de citoneis potentius, adhuc potentius de myrto, & benefacit pectori. De agresta vero similiter adstringit, sed reprimat vomitum, magisque respicit ventriculum.

Tertia propositio: syrupi calidi sunt, mel ros. adyantintus de glycirifa, hyssopinus, de borrag. sapor, fumaria majoris, de epythimo, de stachade simp. schylinum, de menta, de eupatorio. Hoc ordine mel ros. leue est, caput & ventriculum respiciens, sicut adyantintus pectus. Validior est ad pectus de glycirifa, adhuc validior hyssopinus. Sequentes quatuor melancholiam respiciunt, mitius quidem de borrag. validius sapor. Validius fumaria majoris, adhuc validius de epythimo. Sequentes duo caput respiciunt, sed de stachade simplex leue est, compositum vero validum. Sequentes quatuor vniuersales sunt ad omnes locos affectos, lenis quidem acetosus compositus, magis autem respiciens naturalia, & melancholiam. Bisantinus validior oximel simplex. Validissimus schylinus. Postremi duo respiciunt naturalia. De menta quidem ma-

P p

gis



gis ventriculum, & adstringit de eupatorio magis hepar, & deobstruit.

*De Purgantium compositione.*

**A** Duerte quartò: de purgantium compositionibus. Propositio prima: quibus conueniat purgatio docuit Paul. lib. 7. cap. 4. & 4. aphor. 17. & 20. videlicet in agris validis, vel sanis, quibus morbus imminet, in medijs tamen ætatibus, ventriculo valido, non valde sanguinolentis, sed qui acervant cacochymiam, qui si parum vtuntur carnibus, vino, bellarijs, quiete, delitijs, conuenit purgatio, fastiditis grauitatem in ventriculo sentientibus, mediæ habitudinis carnis: & ex lib. quos & quando, cap. 5. illis quorum ilia non tamen, nec valde inflammata sunt, quorum primum indicat humores crudos obstruentes, alterum verò immodicum feruorem hepatis. Conueniunt autem leuia purgantia in albis, & in assuetis 6. aphor. 32. Valida verò in spleneticis, in bibentibus prauas aquas, aut crassa cibaria, quales rustici sunt. Quidam autem definiunt ita dosim, vt in viris detur integra portio, in fæminis quæ tertiæ, in pueris vna tertia.

Secunda propositio: qualia pharmaca. Si adest cacochymia cum vi debili, frequenter, & parum purgentur. Si purgandus nauseam patitur prius ex oximellite decocto raphani vomat. Ob debilitatem autem virium nostrarum fere subducentibus aluum, vtendum est raro validis vomitorijs, item in difficili dosi, præstat augere dosim benedictorum medicamentorum, quam quod validissime tentetur, & magis festinanda est purgatio cum imminet periculum ex ommissio, vt in morbis ventriculi, ob corruptionem alimenti. Sumenda autem sunt valida pharmaca in viribus robustis, & in his qui non facile dejiciunt, & qui ex alijs purgantibus non integre sunt purgati.

Tertia propositio: colagoga sunt elect. de succo ros. de psyllo



psyllo, rhab. cassia tamarindi, mirabolani citrini, diaprunis simp. mana, aloes, syrup. rosarum succus, & conferua earum & magis lexanel. Pillulæ sunt asagaret de rhab. sine quibus, aureæ, de hermodactilis minoris, hoc ordine, pulp. cass. leuiter purgat bilem & adustam ʒ. ij. pulp. tamarind. ʒ. ij. leuiter euacuat bilem, & ardorem extinguit. Mirab. citrini ʒ. ij. comprimendo leuiter vacuant bilem, & adstringunt, succus ros. & conferua eius ad ʒ. iij. leuiter purgant bilem, & magis aquas. Diaprunis simp. & mana ad ʒ. ij. leniendo leuiter euacuant bilem. Rhab. ad ʒ. ij. modice bilem soluit, minus pituitam, idque adstringendo, & roborando, nec dissimiliter aloes, sed magis siccatur, & roboratur.

Electuaria verò de succo ros. & de psyllo ad ʒ. ij. valida colagoga sunt, sed de psyllo magis respicit naturalia deobstruendo; de succo autem ros. respicit caput, & iuncturas.

Ex pillulis autem asagaret & de rhab. ʒ. j. ʒ. ʒ. leuiter vacuant, sed asagaret respicit caput, de rhab. autem naturalia. Modice autem colagoga sunt, sine quibus, & de hermodactilis minoris ʒ. j. sed priores respiciunt caput, posteriores iuncturas; validæ sunt aureæ quarum ʒ. ij. caput respiciunt, puluis autem colagogus est piperis, ameos, cumini, epithimi, diagridij ana gran. viij. camphoræ gran. ij. cum pari saccharo.

Quarta propositio: phlegmagoga sunt, catholicon, diaphenicon; electuarius Indum, pillulæ sunt elephanginae communes, mastichinae, lucis, aggregatiuo de agarico, cochiae, fardida, hoc ordine; cassia leniter vacuat pituitam minus quam bilem; semen cartilagini ad ʒ. j. contusum lene phlegmagogum; chebuli ad ʒ. j. lene est phlegmagogum, & adstringit cathol. ad ʒ. j. perlene est phlegmagogum, & melagogum Turbith Orientale, nam nostras etiam rapia ad ʒ. j. modice phlegmagogum est, agurici ʒ. ij. respiciunt totum, & magis remotum. Diaphenicon modice phlegmagogum est ad ʒ. vj. leuius colagogum, respicit autem naturalia, Indum ʒ. iij. validius phlegmagogum est.

P p ij

Ex



Ex pillulis autem communes, vel Rasis, elephangina, mastichina, & lucis, leuiter phlegmagoga sunt ad 3. j. ʒ. sed communes magis respiciunt totum, elephangina naturalia, similiter mastichina naturalia, sed plus aliquanto vacuant, & minus roborant elephanginis. Lucis autem peculiariter oculos concernunt, sequuntur de agarico, quorum 3. j. ʒ. modice vacuat & pectus respicit; aggregatiua autem ʒ. iiij. modice phlegmagoga, & colagoga sunt, respiciunt totum, sed magis naturalia; valida sunt cochia caput respicientes 3. j. valida sunt fatida quorum ʒ. ij. etiam a remotis phlegma trahunt. Puluis autem phlegmagogus zinziberis 3. ʒ. turbith 3. j. sachari 3. j. ʒ.

Quinta propositio: melagoga sunt cassia, serum, sena, polipodium, epithimum, catholicon, diasena, hamech, pillula Inda, fumarina, de lapide lazuli. Videlicet seri ʒ. viij. continuatis diebus leuissime vacuant adusta; cassia vero aliquanto potentius, sed magis bilem, sena autem, & polipodium ad 3. j. ʒ. lenia sunt, sed catholicon est phlegmagogum, & colagogum modice, diasena autem frigidam melancholiam inanit. Ex eadem classe sunt pillula Inda ad 3. j. ʒ. confectionis autem hamech, & pillula fumarina, prior quidem ad ʒ. iiij. & colagoga est; posterior vero compositio fumarina ad 3. j. pillula de lapide lazuli ad 3. j. ʒ. puluis autem melagogus est, sena, epithimi, polipodij ana ʒ. j. diagridij gr. iiij. zinziberis, macis, ana gr. x. sachari, vel ubi timetur tormina, salis assi 3. ʒ. in ouo sorbili, vel in jure gallina.

Sexta propositio: hydragoga sunt Alexandrina, & syrupus ejus, lene hydragogum, & minus colagogum est. Validum autem succi Ireos defecati ʒ. ʒ. mulsæ ʒ. j. cinamomi gran. x.





## De Electuarijs.

**A**duerte primo: de electione vocantur ita, quasi electa, seruanturque in hac forma: fructus, semina, flores. Radices cum melle, vel sacharo, quandoque operta tantum sacharo valde cocto (*confeitados*, vel *cuberto*) quando conficiuntur sacharo aliquanto minus cocto, manentque sub forma solida rotularum. Quandoque sacharum adhuc minus coquitur, & redduntur incocta ad formam opiata, vel paulo crassiorum, vt diacitonium, vel diapyrum.

Secunda propositio: cogantur pharmacopola indere pulueres cum mensura in electuarijs, cuius negligentia minime operantur, recipiunt autem solida sacharum duodecuplum, quare in 3. j. & 8. pulueris euadant electuarij solidi 3. ij. opiata autem recipiant mel, vel sacharum quadruplum, conserua verò duo, dosis ergo solidi electuarij fere est 3. 8. continens pulueris 9. j. in validis ergo electuarijs minor quantitas sufficit, sicut in conseruis 3. j. propter earum lenitatem, opiata autem 3. j. 8. idem operatur quod ex solido 3. 8.

Tertia propositio: duratio est ad menses nouem cum sacharo, sed recipientia semina oleosa ante duos menses rancida euadunt, quod ex odore agnoscitur, videlicet diarrhodon, diamarg. diatriasand. diagargantum, diapapauer. Quare pulueres seruantur sine illius seminibus, & in tempore componendi, sacharum cum lacte seminum coquatur, & ita pulueres addantur. Possunt gratia roboris conciliandi, deaurari, & deargentari. Sumuntur ad cerebrum duabus horis à prandio, ad reliqua jejuno, & praestat vbi quaeritur exsiccatio, vel mora illorum in ventriculo, vt non supra poterat.

Quarta propositio: opiata frigida sunt. Mieleta Nicolai, cuius 3. 8. in fluxibus post euacuationem comoda sunt. Opiata verò calida, sunt Alchermes 3. ij. pretiosa confectio, nec valde calida; summè roborat cor, & laetificat. Dialaca

Pp iij

3. ij.



3. ij. potenter deobstruit naturalia. Phlyris archolicon 3. 6. eximie roborat memoriam & caput, theriaca & metridatum 3. j. per intervalla vniuersa membra roborat, calefacit tamen euidenter.

Quinta propositio: solida frigida sunt, electuarium trium sandalorum infrigidat, & roborat naturalia, & prouocat vrinam, diamargarit. verò magis roborat spiritualia, diarrhodon vtraque, sed cum minori infrigidatione, pectus verò lenit diagarganton, & magis lenit, & infrigidat diapapauer. Calida verò sunt aromaticum rosatum, roborans naturalia, & modice excalefaciens, diambra verò magis, & roborat & calefacit cor, sicut diacyminum, naturalia. Validior omnibus anacardina, cuius tertia vna cerebrum valde frigidum vehementer excalefacit.

Sexta propositio: condita vel conserua sunt, conserua rosarum ex sacharo, roborat viscera, & caput, siccaturque excrementa. Mirabolani verò omnes conditi roborant caput & naturalia, & magis siccant excrementa, quam conserua rosarum, conserua violarum lenit spiritualia. Conditi verò fructus citoneorum, pyrorum, persicorum habent vires simplicium, sed remissiores.

Compositum autem conditum fit ex frigidis conseruis, additis bracteis aureis (*pastas de ouro*) puluere diamargarit. & si oportet etiam semine papaueris 3. j. Calida verò sunt citra condita roborantia naturalia, & spiritualia, flores verò & radices buglosi conditi sola spiritualia. Calidiora sunt conserua rosarum ex melle, cortices citri conditi, limones conditi. Validiora sunt & caput respiciunt conserua stachados, validior nux condita, validissimum zinziber conditum.

Septima propositio: confecta autem habent vires eorum quæ incrustantur, sed imbecilliores videlicet coriandri ad reprimendos flatūs à capite, cinamomi, ad purgationem mensium, anisi magis cymini ad flatūs, agni autem ad seminis exsiccationem.

De



**A**duerte de vnctionibus. Propositio prima: olea per impressionem fiant ex omphancino, aut saltem non salito, & loto; sunt autem olea per impressionem extracta fere pauci vsus, quia non fit vulgo trina permutatio, nec sequitur coctio in duplici vase, nec postremo in eo lotio sufficiens. Quare praestat vt rursus cum herbis coquantur, aut cum succo earum, non seruentur autem toto anno, sed animalia, & herbae in oleo, putrescunt enim, vel aliquanto plusquam praecipunt Auctores, ob negligentiam insolationis, post collata seruentur.

Secunda propositio: frigida sunt violaceum, lenit & in-  
frigidat, adhuc magis nenupharinum, rosaceum autem infri-  
gidat, & roborat, & nonnihil resoluit, melynium verò ceu cy-  
toneorum, & myrtinum validius adstringit, sed myrtinum cras-  
sarum partium est quam mellinum.

Calida verò sunt camomellinum, anodinum leniter re-  
soluens, paulo validius est anethinum, adhuc validius lilia-  
ceum, & magis laurinum, & rutaceum. Olea verò amigda-  
larum dulcium, & sesaminum crassius amigdalino. De semi-  
ne verò lini peculiariter benefacit hamorrhoidibus. Verum  
ex amigdalibus amaris, & nucleis persicorum, flatus dissipantur,  
deobstruunt & vermes interimunt. Sequitur de mentha, &  
absinthinum, mastichinum, nardinum, roborantia, & coctio-  
nem promouentia. Et de mentha quidem, & mastichinum  
magis adstringunt, non deobstruunt, absintinum simul leni-  
ter deobstruit; nardinum potentius calefacit & resoluit, & ad-  
huc magis ex lauandula (*de alfuzema.*) Nervi verò affe-  
ctibus potissimum faciunt, de lumbricis vulpinum, de tereben-  
tina, de euphorbio; & de lumbricis quidem magis roborat,  
vulpinum verò magis resoluit, De terebentina verò potissi-  
mum fuscum, quod postremo distillat, magis deobstruit, va-  
lidiss.



lidiſſimum eſt de euphorbio. Peculiariter autem faciunt oleum de capparibus, ad antiquas obſtructiones, oleum de ſcorpionibus, lapidi frangendo, & peſti cauendæ vnctis alis, & inguinibus. Oleum verò de ſulphure ad ſcabiem pituitoſam paratur. Vnguentum ad ſcabiem ℥. roſacei ꝯ. iiij. therebentina, ſulphuris, vini optimi añã ꝯ. j. bulliant ad vini conſumptionem, & collentur.

Tertia propoſitio: vnguenta fere parum operantur ob oleorum malitiam. Quare commodè præcipitur in compoſitione eorum, vt olea præcoquantur cum pari ſucco, aut liquore, vel inter contuſcendum in mortario liquor paulatim effundatur, & permisceatur ceroto. Additur ad ꝯ. j. olei, ceræ ꝯ. iiij. pulueris ꝯ. j. Tempus autem vngendi naturalia peracta coctione, ne impediatur vis medicamenti à multo alimento. Item ventriculus, ſplen, veſica ante vnctionem præfricanda ſunt, pectus autem modice, dorſum verò & hepar minime ob calorem qui timetur. Item ventriculo imponatur cortus cum commoda ligatura; lieni pannus ceruleus, dorſo, & hepatis folia lactuæ, aut plantaginis, vel frigidiora nymphaeæ. Item vnguenta reſoluentia, vel emollientia magis operantur, ſi operiuntur multa lana ſuccida in vino albo cocto, & multo magis ſi continuo iterantur.

Frigida autem vnguenta magis operantur, ſi operiuntur linteo perforato imbuto roſacea, vel comuni frigida expreſſa, perpetuo autem abſtergantur vnguenta poſt operationem cum linteo in vino albo tepido. Cicatrisantia autem reddantur à linteo, ita enim magis ſiccant. Sunt autem frigida vnguenta, roſatum inſrigidat, & roborat, ſed negligenter paratur propter inopiam ſucci roſarum. Sandalinum potentius inſrigidat, & multo validius populeon, ita vt ſoporiferum ſit. Cicatrisantia autem ſunt album & crudum & coctum, ſed magis crudum, camphoratum potentius refrigerat, ſicut de tutia magis ſiccant, & adhuc magis calcinatum, & de minio.

Calida verò vnguenta ſunt, dialthea emolliens, & dolores ſedans,



sedans, remissius autem emollit asipus, sicut plus calefacit marciaton, emundat autem apostolorum, & multo magis agyptiacum. Si verò in ejus 3 j. addantur arsenici sublimati gr. iiii. opij gr. j. cum minimo dolore exit, quamuis humida carne, sicut replet basilicon, & magis glutinat aureum.

Quarta propositio: emplastra ex adjunctis metallicis solidiorem consistentiam obtinent; frigida sunt diachylon minus emolliens calida, gummi autem leniter refrigerat, & cicatrificat. Spharadapum verò magis ex lythargirio, cerusa, rosaceo aceto. Calida verò sunt diachylon magnum emolliens frigida, validius est armoniacatum, valde item resoluit cum emolitione demeliloto, magis resoluit de baccis lauri, peculiariter diapalma leniter reprimat, roborat & resoluit. Oxicroceum verò dissipat remanentes durities, roborans nervosa, sicut apostolicon chyrurgicum post consolidata convenit. Emplastrum verò contra rupturam Guidonis, & de nido hyrundinum ejusdem, praestat quidem ruptis, posterius maturanda, & resoluenda anginae. De compositis itaque medicamentis in uniuersali, & in particulari satis superque sit.

## CAPVT LI.

*De Lapide renum.*

**A**duerte primò: curanda nephritidis praecepta. Primum, ad praecauionem in obnoxijis conuenit adhibere contrarium causarum lapidis gignendi, quae sunt crudus humor, mora ejus in renibus, calor renum.

Obuiat primae causae bona coctio pauci, & probi alimenti, cum sufficienti exercitio ante cibum, & quiete integra a cibo. Pro varietate autem plenitudinis semel, aut bis in anno sumat pulpae cass. & diaphan. aña 3. s. in bolo, vel in decocto Glycirisae, & adyanthi.

Obuiant secundae causae leuia diuretica usu continuo, apud

Qq Tralia-



Tralianum, & Auicenam, quod enim 10. theor. 10. prohibet diuretica affecto rene, vel vesica, agit de incipiente inflammatione, non de reliquis renum affectibus. Nec timenda est delatio incocti alimenti ad renes ex leuibus diureticis, non enim statim talia imbecilla permeant ad renes, sed paulatim fundūt sanguinem, vt facile ex sero transeunte excutiat a renibus humor, per interualla autem quando sentitur grauitas in renibus, etiam valida diuretica cōmode interponantur. Quod autem in continuo vsu laedant, causa est. Prima, calor eorum, apud Tralianum. Secunda, ne immodico tractu excrementorum per renes debilitentur renes, & disponantur ad fluxum, assuescit enim natura mandare eò excrementa.

Obuiat tertia causa tepida aqua frequenter potata jejuno, vel iulepum tepidum adyanthinum, & in potu aqua, vel vinum subfrigidum, apud Tralianum. Quod ergo 5. de sanitate 7. laudat in talibus multum conditum, agit de renibus valde frigidis, in quibus plus operatur ex vacuatione humoris, quam noxae ex aliquanto calore.

Secundum praeceptum: praesente dolore antequam intenterur fractio lapidis, & descensus ejus, dolor sedandus est cū ijs quae membra molliunt, meatus laxant, flatus conuinctos dissipant, ijsque omnibus tam initio sumptis, quam clystere submissis, quam extra impositis; huiusmodi autem remedia in initio solum exercenda sunt, in processu interponenda, videlicet quia per reliqua remedia dolor acuitur. Verum ex lib. de affectu renum, non est valde immorandum talibus emollientibus, eo quod robur renum a tali frequentia dissoluitur, unde fit vt non possit expellere lapidem, & praeterea non possit expellere decumbentem humorem; quare paulo redditur dolor acrior. Quod praeceptum in omni fomento anodino tradit Galenus 4. local. de fomentis ophtalmiae, & Auic. de lapide renum cap. 19. ea de causa dixit permiscendum esse anodino aliquid adstringens, qualia nardinum, vel lininum.

Phlebotomia etiam & purgatio praecipiuntur tanquam sedan-



stantia dolorem in iuuenibus, & rebuitis 6. epid. sect. 5. & apud Paulum, & Aët. lib. 11. cap. 5. & serm. 3. cap. 5. & lib. de affect. renum cap. 4. ad fin. medium, videlicet si peccat sanguis copia, vel crassitie, aut timor secutura inflammationis, phlebotomandum est, phlebotomat autem Galenus citat. ex crure iuxta præceptum vniuersale, quia morbus est infra hep. par. Ras. ad prohibendam inflammationem secat basilicam, videlicet quia cum renes ambigant 1. ad Glau. vltimo in loco, magis conuenit initio inflammationis sectio ex cubito, posterius autem ex crure, lib. autem citat. de renum affectibus, si vis robusta est, ex crure fiat, scilicet quia potest tolerare multam sanguinis missionem, quæ sola iuuat in crure secto. Si verò valida est, parum ex cubito mittatur ad reuulsionem, semper autem minus quam pro copia, sicut in reliquis affectibus, quibus iungitur dolor, aut vigilia. Purgationem autem timet Auic. quia descendere facit humores ad renes. Verum Aët. concedit vbi cacochymia in causa est, cum multa tamen maiori cautione, ita vt rarissime mittatur exoluens tempore accessionis postremo phyloni Romani 3. j.

Tertium præceptum. frangentia lapidem, & diuretica per interualla sunt adhibenda, quoniam dolor remittitur, in quæ usus docet Auicena adstringi pectus, & inferiora ilia, ita vt laxentur vteræ superiores ad lapidis exitum, frangentia autem lapidem ex virtute 5. simp. 13. sunt in genere attenuantium, attenuantia enim cum minimo calore lapides imminuunt. Ratio 5. coll. 20. coagulata à calido sicco, soluantur frigido humido ex 4. meteor. 6. lapides ergo cum ab acri calore concreuerint, non soluuntur à pari calore medicinarum, sed à remissiori, qui collatus illi frigidus datur.

Diuretica autem vis paulo calidior est siccitate iuncta, si quidem, si idem calor humiditati iungitur, expectorat. Sunt enim tres hæ facultates substantiales. Vis autem mundificans renes, non est alia à diuretica, licet enim lectione deprauata Galeni ita crediderit Serapio, parte 1. breuiari cap. de mun-

Qq ij difi-



difficantibus, renēs, ex proprietate autem, vel vi quarta nonnulla frangunt lapidem sicut quādam ex vtraque, & inter ea alia potentius, alia debilius.

Composita autem frangētia parantur ex Auicena cap. 18. ita vt basi frangenti lapidem jungantur valida prouocantia; tamen vt cito transeat frangētis vis ad lapidem, tum vt fructus lapis educatur vt piper. Alterum est lentum, morari faciens, eo quod comminutio lapidis breui fieri non potest, v. g. gummi, forte autem magis additur gummi ad pręcautionem vlcēis imminētis ex lapide. Tertiō, additur adstringēs simul ad corroborandam expultricem, & prohibendum fluxum materialium ad locum dolentem, vt cyperus. Quartō, additur stupefaciens ob doloris vehementiam, vt semen hyosciami, confidimus autem de natura, quod suo tempore vtratur dictis facultatibus, videlicet i. diuretica deferente ad renes. Secundo, remorante simul & frangente. Tertiō, redibit ad expulsionem; toto autem tempore vtratur facultatibus stupefaciente & roborante.

Quartum pręceptum: descendente lapide in vesicam cessat dolor, lapis vero quandoque ingrediens collum vrinam impedit, quo tempore ager eleuandus per crura, & concutiendus est, pręcipiendumque vt cum impetu ejaculetur vrina, mittendusque est coles in hydreleum calidum, & ex eo ex alto perfundendus, potandumque validum diureticum, tandem coles parte superiori secandus est. Si verō in colo vesicę impedit, similiter eleuandus est & concutiendus, infligendaque pectini palma, demum immittendus est iuncus, aut quod pręstat candella ex subdupla resina ad ceram vt catheter respondeat arati. Si verō lapis in vesica ipsa manet, non est dissimulandum, sed validiori remedio, quam in lapide renum agendum est, & tandem secandum est, licet sit periculosissima operatio. In omni autem lapide post expulsionem, vltus acuratissime obseruetur, aliter enim regeneratur ob consuetudinem, sicut & lumbrici.

*Remē*



## Remedia.

**P**rimum: lenientia doloris, levis vomitus, & dejectio ex clytere leni paruo, frequenter frictione lumborum cum amigdalino c. lido, butyro, & linino. Validius est addita dialthea, vel ex farina triticea cum sapa, & camomelino fiat massa inuoluta linteo imponenda. Actualis enim calor obseruandus est, vel duo sacculi fursuris in decocto camomilla, & althea, & semina fanu graeci lota coquantur in aqua cum butyro & melle, & per interualla frequenter sumatur decoctū. Item balneum suauiter calens, in quo plurimum moretur, quo tempore quae sumuntur suauiora sunt.

Secundum: frangentia & prouocantia apud Auic. & Albucasin tract. 3. & Aët. cap. 11. in tractu de lapide renum, & Plin. lib. 28. cap. 15. Sunt sanguis leporis cum pelle vsta ad 3. ij. vel cineris tosti oui à quo exclusus est pullus cum pari sacharo in aqua apij. Vel apud Tralianum manus diuinæ 3. j. sanguis hyrci ex eodem, & Auicena preparatus, syrupus adyantinus 3. j. in decocto radicum graminis, & apij. Vel famosa auis troglodites (*carica*) pro qua male sumebatur cauda tremula (*alucloa*) valet autem tota salita, & puluerata, vel in olla in cinerem versa. Vel cedatur assa, vel elixa, vulgare est spongiosa instar echyni innascens rubro canino. Item Iustini, vel litontrypon 3. j. in aqua raphani. Vel stilatitia limonum. Item decoctū corticis radice verbasci per dies quinque poterit, & interiectis, decem per alios quinque. Cucurbita itē applicentur paulatim descendentes, quam primum sentitur moueri lapis, ita vt spatium trium. miserere mei Deus quiescat cucurbita.

Qq iij

CAPVT



## CAPVT LII.

*De Mensibus retentis.*

Cum ex retentione, &amp;c.

**A**Duerte retentionis mensium curandæ præcepta. Primum: quod scribitur 1. acut. 13. vulgare esse errorem medicorum sumere frequentia pro perpetuis, hic maxime locum habet, nam perpetuo adhibent calida sicca aperientia medici, eo quod frequens causa retentionis est frigiditas, cum crassitie humoris obstruens vasa vteri, verum accidit aliquando retentio, ob sanguinis penuriam, in inualidis, & conualescentibus solo victu resumptiuo curanda. Accidit etiam ex calore per vitionem incrassante humores, quam sanat decoctum prunorum à jejunis sumptum, refrigeratum sit cum alijs frigidis humidis.

Secundum: in causa frequenti à pituita obstruente suffusus aromatum benefacit 5. aphor. 28. ita tamen vt simul per superiora fatida adhibeantur, ex Zoar. cap. proprio. Vbi autem causa magis vrget 1. vacuandum est, post deobstruentibus agendum, ne videlicet corpore pleno deobstruentia magis obstruant, vnde cum parua phlebotomia ex saphana sit ex deobstruentibus vasa vteri, præstat si corpus plethoricum est, vt præcedat aliquanta missio ex brachio, maxime quia origo sanguinis, & ideo frequenter etiam humoris deobstruentis in hepate est, quod memorandum est, tam in prouocandis mensibus, quam in phlegmone vteri sanando, licet Galenus mementit in talibus desecanda basilica, sicut in internis inflammationibus, non mementit de sectione aduersi lateris, videlicet quia plurimum sanguinem exhauriebat, poterat non secare partem distantem. Vbi verò cacochymia jungitur incrassans sanguinem, vacuanda est iunctis diureticis, & aperientibus. Verum



rum præconsiderandum est, num in crassities sanguinis pendeat à calido humore, quo tempore fugienda sunt calida, & vacuanda etiam bilis per adustionem in crassians.

Tertium: post dicta sequantur prouocantia menses phlebotomia saphæa parcissima, & iterata, ligaturæ coarum, cucurbita in eisdem, sumantur item medicamenta prouocantia, sed gradatim, præstatque si triduo ante periodum exhibeantur, & adhuc magis si in balneo.

*Remedia.*

**P**rimum: balneum; ligentur in linteo, arthemisia, sabina aña m. iij. maluarum, althea, fanu græci, seminis sinapis, lauandula, florum camomilla, & sambuci, anthos, itachados aña 3. j. sedeat mulier supra sacculum in balneo.

Secundum: pessaria cum carne ficuum, & succo Mercurialis incorporetur, genciana, pulegij aña 3. j. melanthij 3. j. Validius est si addatur coloclyntidis 3. j. Item castorij 5. j. m. mulchi gr. ij. soluta in sambucino excipelana.

Tertium: suffitus ex colocynthide supra carbones. Velle-re decocto, sabina, lauri ex quo lauatur vterus.

Quartum: sumenda per os. Quotidie jejuno sumat 3. j. triphera magnæ sine opio, cum jure cicerum. Vel sumat in aurora 3. iij. & vespere tantundem decocti sequentis addito sacharo. Radicis rubiæ 3. 6. seminis feseolini, fascolorum, cicerum nigrorum aña m. j. redeat in aqua ad quartam partem. Item quotidie edat jejuna parum arthemisia, vel castorei, seminis anisi, & opij aña 3. j. in vino albo.

Quintum: phlegmagogum. Electuarium Indum 3. iij. spica 3. j. cum sacharo fiat bollus, colagogum autem est rhab. 3. ij. in aquis lupulorum, & endiuia post collaturam adde succi rosarum 3. j. 6. vini albi 3. 6. spica 3. j.

CAPVT



## CAPVT LIII.

*De Morbis juncturarum.*

**A**duerte: curandæ arthriditis præcepta. Primum, parcitas in victu summe commendatur, ita vt tertio quoque jejurent, & magis à potu abstineant ante median cibationem, & multo magis à venere juxta Hippocratem 6. aphor. 28. à vino item ceu maximo penetratore, quousque transeant quatuor tempora ait. Haly, eo quod in temporum mutationibus solet inuadere, & quia saepe vertitur in acetum nocentissimum juncturis, è conuerso pedum usus ob familiaritatem commendatur. Exercitia autem valida in parte sana commendantur, & conferunt, in agra debilia sunt, & postremo fiant.

Secundum: humor noxius vacuandus est sequentibus considerationibus, vna quod non tardet vacuatio, modice exoluens cum adstrictione, videlicet, quia humor positus est in motu, quare commodè festinat ea diuerso ante quam humor firmetur in parte, quare conuenit adhibere etiam pauca præcedente coctione, maximè cum coctio artificialis in talibus adstringat. Quare non parat vacationi. Ideo autem modica purgatio requiritur, non sola leniens; ne humor ex se agitato, ex pharmaco magis motus quam eductus, decumbat vniuersim ad locum affectum.

Altera consideratio, si sanguis solus abundat, vel junctim cum alijs, dominante tamen sanguine, vel tertio aucto aque sanguine cum alijs. Vel quarto si in sanguine non est diminutio etiam cum copia aliorum, à phlebotomia incipiendum est 3. 1. 29. Si verò alius humor increuit cum sanguine diminuto, incipiendum est à purgatione, nec hoc pugnat præcepto 6. epid. 1. 5. quod in concursu duarum vacationum incipiendum est à phlebotomia, quia in casu vltimo dicto ex 4. de sanis,



fanit. 8. non conuenit phlebotomia, sed purgatio, est enim ca-  
cochymia cum defectu sanguinis; posterius tamen æquatis  
humoribus potest conuenire phlebotomia.

Postrema consideratio est, in præcautione secundum est  
ab opposita parte, vel partibus ijs quæ solent affici in curatio-  
ne, sicut in reliquis inflammationibus à distante, sed commu-  
nicante.

Tertium: quod attinet ad localia in initio repellentia post  
aliquam vacationem, imponatur in loco affecto, & supra lo-  
cum affectum, simul cum ligatura modice constringens jun-  
cturam, laxa autem versus superiora, deinde paulatim permif-  
ceantur resoluentia. Tandem in declinatione sola resolu-  
entia adhibeantur, vesicatoria autem, & cauteria, si adhibeantur,  
ad intercipiendum fluxum juncturarum imponantur. Si ad  
vacnationem contenti in junctura, vel parum infra, interim  
dolor tanquam attrahens fluxiones sedandus est, & durities re-  
manens emollienda. Caterum in juncturis proximis cerebro,  
repellentia cauenda sunt ob timorem nobilis vicini, sicut in  
schiatica, ob profunditatem.

*Remedia.*

**P**rimum: præseruans locale, frequens lotio cum tepida  
ferrata decocti salis & aluminis, & multo magis lotio fré-  
quens in talibus thermis, aut fricentur junctura cum sale, &  
oleo, & mittatur pars affecta in mustum maximè nigrum.

Secundum: reprimens commune. Bolus armenus cum  
oxirrhodino. In validiori autem additur mucilago psilij, albu-  
men, sandali, vel rosarum ʒ. j. farinæ hordei ʒ. ʒ. fabarum ʒ.  
iij. cum oxyrhodino. In frigida autem causa bulliant nar-  
dinum cum pari decocto gallarum, addita cera, aloë, acacia,  
styrace.

Tertium: resoluens in calida, mucilaginis, sanu graci, &  
seminis lini, & olei linini añã cum cera. In causa autem mix-

R 1                      ta



ta succuse bulli inspissatus cum rosacea. In causa autem frigida stercus bouinum calidum, & magis addito caprino cum cinere caulium. Item aloes ʒ. j. murrhæ ʒ. β. salis ʒ. ij. croci ʒ. j. farinæ lupinorum & furfuris añā ʒ. ij. lixiuij quod satis sit.

Quartum: sedantia dolorem; pulres ex pane, lacte, rosaceo, luteis, croco, item pulpæ cassiæ extractæ cum aqua rosacea, & in processu cum aqua apij. Validius est, rosaceæ ʒ. iij. opij ʒ. j. croci ʒ. β. cum cera fiat vntio.

Quintum: emollientia nodos. Balneatio membri bis in die in decocto castrati, & præstat si addatur sanguis calidus recens occisi animalis. In balneo autem fricetur pars, & vndique vertatur sequente frictione ad ignem, pinguedinis vulpini, sesamini añā ʒ. j. medullæ cruris vaccæ, mucilaginis, maluæ, fanu græci, seminis lini añā ʒ. ij. cum cera; quod si manet materia indigens resolutione, imponatur hyssopum cerotum ex Phylagrio, apud Mesuem.

#### C A P V T L I V.

##### *De Seminis profluvio.*

**S**emini profluvium, quod gonorrhæa dicitur, symptoma est retentricis, aut expultricis facultatis testium, & vasorum quæ testibus assunt continentia semen; à Galeno sic definitur; est seminis assiduæ excretio, cole haud quaquam extento, sequitur autem aut à semine factam irritationem, aut retentricis imbecillitatem, ob quam vel nollentibus nobis semen perpetuo defluit, sine veneris appetitu, incitamento, testigine, aut delectamento, nisi quando vniuersim, & accumulatum excernatur calidum, ac multum semen occurrens, tunc enim seminis acridinem sequitur.

Aliquando etiam conuulsione fit expressio, vt in morbis comitialibus. Causæ sunt quæ semen calidum, atque mordax efficiunt, & quæ vasa continentia humectant, atque relaxant seminis



feminis acedinem agnosces si titigo accidat, si pudendum erigatur, & intumescat, si cummulatim, & cum aliqua delectatione fundatur, & si fætidum sit. Imbecillitas retentricis agnoscitur, quando sensim defluit aquosum semen nullam inferens tetiginem.

Curatur seminis incontinentia quæ ab acredine fit victu refrigerante, lactucis, endiuia, cucurbita, lentibus, & aquæ potu. Sit autem aqua calybeata, ac clysteribus qui refrigerandi vim habent, quiete & animi tranquillitate, balneis aquæ dulcis, & decubitu super altero latere. Vitandus autem decubitus supra dorsum, & pulvinarium copia, ac lectus valde mollis, & imaginatio, atque occasio omnis cogitandi de rebus venereis, tugiunt & vinum & oleum. Præterea conuenit ab initio sanguinem mittere secta vena interna cubiti, si sanguinis aduenerit abundantia, & veneris præcesserit insueta abstinencia. Deinde ventrem purgare facile, cum cassia fistula, & electuario rosato in decocto hordei, violarum, & prunorum, & lumbos ac reires deinde fouere oleo nymphææ, oleo violaceo, & rosaceo, præterea vnguento rosaceo, lamina quoque plumbi perforatam multis in locis, lumbis alliganda, in lecto tamen violas, ac rosas inspergere oportet, & nymphææ flores, viticis germina, & myrti folia, frictiones superioribus membris adhibendæ validæ, & si ager iuuenis, & constans fuerit, & calido anni tempore, non erit alienum frigidæ balneum ingredi.

Si verò seminis incontinentia ob vasorum laxitatem, & retentricis imbecillitatem eueniat. Victus exsicicans esse debet, lentes præbendæ elixæ cum aqua, & aceto, & beta, & lac seminis canabis, & semen ipsum cum fide rostum, & pyra assa & auellana tostæ. Carnes enim pauca quantitate edantur assæ. Potus sit aqua cinamomi aut calybeata. Lumbi quoque rosaceo oleo, vel vnguento lineantur, & exercitationibus utantur, & frictionibus validis, & balneis aquarum sponte calidarum, aut arte paratarum, infersiones quoque fiant ex decoctione

oup

R r ij

re-



rosarum myrthi, rubi, balauſtiorum. Lumbis autem & ilijs iuxta os pubis emplaſtra admovebimus ex palmulis in roſaceo, & aceto elixis, aut ex oleo roſaceo, & nymphaeae cum acacia, hypociſtide, & ruta. Hæ verò his etiam qui ob ſeminis acredinem laborant conueniunt.

Verum valida refrigeratio renes lædit, conducunt quoque omnibus ea quæ ſemen facultate ſua extinguunt, & quæ corrumpunt. Extingunt quæ refrigerant, vt lactuca, blytrum, atriplex, cucurbita, pepones, & cucumeres, hæc ſemen increſcant & extinguunt non corrumpunt; quæ verò ſiccant corrumpunt, quamuis calida ſint, vt ruta & vitex, & ejus ſemen, & nymphaea quæ frigida eſt, hæc à tota ſubſtantia. A Galeno, rutam itaque edulijs miſcemus & ſemen ejus, & ſemen viticis in aqua portulacæ præbemus bibendum; diaciminum ſimiliter, & dianiſum, & diacalamintha valent, & pulvis ſequens.

Seminis lactucæ, portulacæ, ſeminis viticis, ſingulorum ꝑ. ij. calaminthæ ꝑ. j. ꝑ. huiusmodi ꝑ. ꝑ. cum aqua ſtilatitia lactucæ bibitur in ſeminis fluxu, ob acredinem, ob relaxationem verò cum aqua cinamomi. Eiſdem fere remedijs curantur, qui nocturnas pollutiones patiuntur; nam ab eiſdem cauſis malum oritur. Raro perit aliquis à morbo hoc, interim tamen hominem reddit effeminatum, mollem, ſegnem, timidum, extenuatum, & imbecilem.

#### CAPVT LV.

##### *De Mingentibus, in Lecto.*

**S**Vnt qui urinam dormientes emittunt, atque id vna duarum cauſarum, aut ob nimiam urinæ acredinem, ob quam veſica mordetur, & ad excretionem cogitur, aut ob imbecillitatem muſculorum veſicam claudentium, ob quam facile ab urina grauatur, utriſque tamen accidit ſomnus inſomnis, plenus, atque grauis, ſomniant enim ſe vigilantes quarere quo



quo in loco urinam deponere honestius possint, sibi que ipsis loca diuersa proponunt, & quibus vnum cum labore, & solitudine conquisitum eligunt; at verò interim ab urina tam vehementer premuntur, ut totum animum, totamque phantasiam actionem ad vesicam applicantes, minime ad externa agnoscenda conuertantur.

Quod si ob urinae acrimoniam malum procedat, facilius curabitur bile purgata, & jecore refrigerato, ac renibus, & aqua hordei potu, & peporum esu, & seminum eorundem, atque lactucarum su. Si tamen ob laxitatem muscoli claudens vesicam eueniat, pueris id frequentius accidit cruditarum ratione, mel itaque rosatum collatum ante canam sumendum, idem cruditates emendat, bibant praeterea ante canam myrrhae ʒ. ʒ. pulueris calaminthae ʒ. j. in vino albo, aut in aqua mulsa, aut seminis ruthe trita ʒ. ʒ. In vino autem gutteris galli veteris vtri ʒ. j. cum vino, aut testiculi leporis abradi in vino odorato sumentur, foveantur autem & perytoneum oleo irino, & laurino, aut anethino, & mirrha, aut oleo vulpino, & castorei momento; partes quoque praefricandae dictis oleis, & chymolia cum vino, cataplasmatibus modo pubi, & perytoneo admouendis.

## CAPVT LVI.

*Ad vehementes dolores faminarum ante purgationem.*

**S**unt plurima quae iuxta purgationis tempus, validos patiuntur dolores in lumbis, imò ventre & pube, quibus subueniunt mollientibus medicamentis, quae humorum crassitiam extenuent, aut calorem acrem attemperent, in vniuersum tamen meatus laxant.

Ventrem lenire praecipimus, oleo laurino, anethino, irino, sucino, aut amaricino calentibus; aut cerotum conficimus ex oleo anethino, sucino, stirace, & pauca cera, & pano-

Rr iij lineo.



lineo hac excipimus, aut ventrem fouemus decocto fenu graci, anethi, meliloti, camomeli, cum oleo camomelino, & anethyno. Aut insidere præcipimus in decocto fenu graci, meliloti, amarici, anethi, croci. Aut in vterum infudimus anethinum, aut susinum, aut de styrace, aut vitellos ouorum tres cum oleo susino, & anethyno calentibus confundimus, & imo ventri superponimus.

## CAPUT LVII.

*De Mensium superflua purgatione.*

**O**Mnes immodice fluunt, aut ob eorundem naturam, aut ob vteri affectum; menstruus sanguis acredine, aut tenuitate peccat aut copia. Vteri vitium est, venæ ruptura, aut exesio, aut anastomosis. Vena rumpitur partu, aut aborsu exeditur, fluentibus mensibus acrioribus aperiuntur ora venarum; vteri sanguis tenuitate aut copia.

Agnoscentur immodica sanguinis profluvia temporis longitudine. Quædam fæminæ purgantur trium dierum spatio, quædam quatuor, aut sex; quædam octo, aliæ vndecim integris. Copia verò sanguinis fluentis cognoscitur, tum ex his, tum etiam facultatis languore qui inde sequitur. A partu verò quædam septem, quædam vndecim diebus, quædam integro mense purgantur. Sanguinis acredo agnoscitur dolore, ardore, & febre, quæ quandoque concitatur, & acrimonia, satore, & pallido aut flauo colore. Tenuitas agnoscitur quando sine dolore mater, aut calore, estque ipse sanguis substantia tenuis & decoloratus, sicut & fæmina ipsa, cuius naturalis temperies aut ascititia frigida est.

Copia verò sanguinis agnoscitur esse nota plethoræ, & quoniam copiose fluentibus mensibus, ab initio nihil mali inde sentitur, neque languescit facultas, partus & abortus non sunt.

Verum



Verum vasis ruptura ex impetu sanguinis fluentis constat, siquidem effatim erumpit, ex erosione verò fluente dolor, & acrimonia sentiuntur, & sensim sanguis manat, & pus miscetur, & hicores fluunt cum fatore, & coloris prauitate. Anastomosis agnoscitur quoniam sine dolore sanguis manat paucus tenuis, & serosus, & signa sanguis abundantis adsunt, aut serositatis ipsius.

Si sanguis vitiosus calore, & acredine fuerit ob bilis mixtionem. Hæc purgari debet ratione reuulsionis, & deriuationis, jecur attemperandum ijs quæ modice refrigerant, vti ceroto sandalino; vnguento rosato, deinde quæ dicemus adstringentia admovebimus.

Victus itaque conueniens exsiccans esse debet, atque adstringens, sint autem aues montanæ assæ, turtures, columbæ, perdices, turdi, passeruli, lac coctum, & oriza cum lacte, aut poscha, & poma austera, & pyra, & cytonea, & sorbæ ac nespilla, potus vinum nigrum, aut aqua calybeata, quiescant, & brachia earum fricentur, atque crura, auctore Aëtio. Præterea cucurbitulam, quam maximam mamis affigere Hippocrates præcipit.

#### Remedia.

**S**tatim adhibebimus sacharum rosaceum antiquum cum puluere bolli armeni, aut poschæ ℥. iij. balaustiorum, & hypocistidos vtriusque ℥. ʒ. Aut corallorum rubrorum ℥. j. aquæ plantaginis, aut decocti radicis rubi. Aut pastilorum de succino ℥. ij. cum decocto balaustiorum. Dormitura optimum auxilium est lapis hæmatites ℥. j. in decocto radicis rubi, aut balaustiorum, syrupi rosati, syrupi mirrhini, syrupi de malis cotoneis, & syrupi mirrhini ℥. iij. succi vire acerbæ aridi ℥. j. & ʒ. Curat imprimis veteri vlcera, erosiones, & venarum rupturam succus plantaginis in vterum infusus. Aut decoctum rosarum, balaustiorum, cauliculorum, glandium cum



cum acacia, & hypocistide.

Emplastrum etiam imponatur ex balaustijs, rosas, folijs myrti elixis, deinde cum oleo myrtino, & melino malaxatis; aut palmula elixæ in poscha pubi admoveantur, aut ejusdem addes acaciam & hypocistidem. Leniantur etiã pubes & lumbi oleo myrtino, melino, & rosaceo, incessus quoque fiant ex decocto rosarum, balaustiorum, corticum mali punici, caliculorum, glandium, & myrti foliorum. Pessi autem fiant ex acacia, & hypocistide, & alumine atque thure cum succo plantaginis aut sanguinariæ.

### CAPVT LVIII.

#### *De Vteri præfocatione.*

**V**teri præfocatio grauis admodum morbus. Conuulsio- nis modus est, quo uterus ad superiora conuellitur. Nã & ipsæ feminæ ab imis partibus ad superiores tractionem sentire se fatentur. Quædam earum sine sensu, & motu jacent, & sine pulsu, aut paruissimo, ita vt vix percipi possit. Quædam animi deliquium patiuntur, sed sentiunt, & mouentur stupor- dorum more, & difficile spirant. Quædam præter stuporem, & difficilem respirationem, motus quosdam efficiunt conuul- sionis crurum, & brachiorum. Nec verò tam graue malum foret vterum conuelli, nisi inde consentiret cerebrum, cor, & septum transuersum, & quandoque jecur, ventriculus, & liens.

Causæ hujus morbi sunt seminis retentio, aut suppressio menstruum, aut humorum malitia fibras vteri occupantiũ. Nec mirum videri debet, & si causa quantitate parua, tam gra- uia inferat niala, si quidem paucissimum virus venefici ani- malis ex morsu relictum lethalem efficit dispositionem, & pra- uus humor in digito pedis corruptus morbum efficere comi- tiale potest, consentiente cerebro; siq̃ etiam pauca sanguinis men-



menstrui, vel feminis quantitas, vbi paruum nanciscitur corruptionem, vniuersum corpus perfrigerare valebit, & animi deliquia, stupores, conuulsiones, & apnæam efficiet, anima verò refrigerante, malum oritur ac euenit frequentius hyeme, & post abortum, vel difficilem partum, religiosus, & viduis. Occurrit quibusdam malum per accessiones, antecedunt autem pigritia, faciei pallor, crurum refrigeratio, tremor, sensus hebetudo, præcipue lingua, & visus contremiscit, subtristes fiunt. Iam verò instante accessione obtumescunt, difficile spirant, & pulsus paruissimus, & obscurus redditur, & nonnquam aboletur, & sensu priuantur, & quadam ex ipsis respiratione. Ex quibus contingit nonnullas in ipsa accessione perire accedente pulsu intercadente, inordinate inquit Paulus. Nos tamen ordinate intercadentem deteriolem cum Galeno reputamus. Cum verò restitui caperint, malæ rubent, palpebræ aperiuntur, sensus redit, motus, ac respiratio pulsus augeatur magnitudine, & vehementia. Ab utero tamen humiditas manat ore relaxato, & intestina murmurant.

Curatio morbi, alia competit in ipsa accessione, alia verò post ipsam, quæ præuisionis gratia adhibetur. Cum itaque mulier morbo correpta est, fricanda sunt crura, & liganda valide, odoratis suffumiganda, & naribus fatida admouenda, quoniam odorata utrum ad se conuertunt, fatida verò fugant, naribus admouebimus pilorum vstorum fumum, aut plumarum, præsertim perdicum, aut cymini vsti fumum, aut lanæ, aut lucernæ extinctæ, aut bituminis, aut piscis, galbani, aut castorei. Inferius verò locos lenimus aut oleo de styrace, aut moscho, aut oleo laurino, aut alypta, aut gallia muschata, aut fumigabitur styrace, aut belsuino. Deinde leues cucurbitæ affigendæ erunt inguinibus, & infra umbilicum, quibus sacculos herbarum calidarum calidos admouebimus, vti flores aurantij, aut ex pulegio, & amarico, camomelo, meliloto, gario-phylis, & styrace plenos. Interim acclamandæ sunt proprijs nominibus, digiti comprimendi, atque pili auellendi, & pu-

Si den-



deinde leniter manibus obstetricum calentibus fricanda. Conferunt sternutatoria; castoreum aut euphorbeum naribus insufflentur; glandes & clysteria quæ calefaciant, & flatus discutiant. De quibus cap. de collico morbo multa sunt scripta.

Sed jam quomodo providendum sit ne in accessione incidant, dicamus à victus ratione auspicientes. Conuenit uti alimentis quæ exsiccandi facultatem habeant, cuius modi sunt turtures, perdices, turdi, assæ autem sint, abstineant à piscibus, lacte, amigdalibus, nucleis pini, nucibus, cruce, naps. Aquam elixam per se bibant, aut cum aniso, ventrem lenem seruabunt, frictionibus crurum utentur, & exercitationibus, ita ut longius incidant, aut in iumento gestentur, non tamen in curru, nam hic motus vomitum concitat, & vteri praefocationem, ac clamatio, & vociferatio conducunt.

Sunt quidam mastitiam patientes, quibus lacta nuntia sunt afferenda, & cantilenis exhilaranda, & prata ac hortos lustrabunt. Si verò nuptæ fuerint, venere modice utantur, cum ex seminis retentione morbus habuerit ortum. Remedij ratione abundante sanguine secanda vena est, retentis autem mensibus ea quæ in maleolo est.

Præparato verò corpore, vomitus commouendus est per aquam mulsam tepidam, aut etiam decocto seminis raphani addito. Venter verò purgandus si prauis redundauerint succi, cassi fist. elect. elefoph, aut diaphanicon, aut hyera diacolocintidos, aut hyera simplici cum aqua mulsæ.

A purgatione cucurbitulæ inguinibus, & famoribus affigenda leues, aut cum scarificatione, & vlcuscula sale inspergenda sunt. Pessi ex odoratis immittantur, ut styrace, oleo nardino, & assungia phasiani, aut oleo susino, & amaricino. Utantur interim his supra ad seminis diminutionem, quæ cap. de gonorrhea tradidimus.

CAPVT



CAPVT LIX.

De Vteri inflatione.

**F** Latus in vtero quandoque clauditur, & aut in cauitate ipsius, aut in substantia, vnde fit vt vterus distendatur veluti venter in tympano euenit, id malum frequentius enixis si non seruantur, & conteguntur, & obuoluantur foscij, licet nonnunquam grumis sanguinis retentis eueniat.

Agnoscutur malum, vteri dolore, distensione & murmure grumi, verò quoniam interim fœmina mensium purgationē patitur, & grumus aliquis descendit.

His victus conuenit exrenuans, & flatum dissoluens. Cibi pauci, sed bonifucci, potus verò anisi decoctum, aut vinum album pauciferum, siue sanguinis grumi adsint, siue crassa pituita flatui præstet materiam, bibita bis aqua mulsa ex anisi, & cymini. Purgabitur agra per hyeram diacolocynthidos, aut per electuarium elefscoph in aqua mulsa. Demum clysteria injiciantur ex decocto pulegij, anethi, cymini, oleo anethino, rutaceo, & melle rosaceo. Oleo laurino, & rutaceo fovebitur.

Pessus quoque ex lana carpta formatus oleo fusino, anethino, & styrace imbutus supponetur. Hac enim viâ flatum plurimum, ab vtero excussum vidi, multo humore deinde secuto. In quem usum galbanum liquatum in oleo laurino, & fusino cum communi puluere, aut illitum, aut infusum valuit, & medicamentum dianisum, & diacyminum, aut plyrisarçoticum cum vino sumptum.



Si ij

CA-



## CAPVT LX.

*De Dolore capitis in febris.*

**C**apitis dolor cum febre, aut est signum decretorium, aut symptoma consequens febris magnitudinem, & vehementiam. Cum signum sit decretorium, nullo opus est remedio; nam quæ ipsi medentur futuram impediunt indicationem, si sanguis fluxus è naribus speretur; nam si dolor capitis adfuerit in febris cum morsu oris ventriculi, & oculorum tenebrositate, quamvis frigida admoueamus, & repellentia capiti, non impediemus vomitum; si verò adfuerit capitis grauitas, & vasorum tensio, etiam pulsus temporum, & oculorum hebetudo, abstinemus ab ijs quæ refrigerant caput, & repellunt, præsertim si præfuerint coctionis notæ. Si tamen ob febris vehementiam, & malitiam vapores peccantium humorum ad caput ferantur, coadiuuante capitis imbecillitate præter corporis euacuationem, pro ratione peccantis humoris fronti, & temporibus, & commissuræ coronali rosaceum admouendum cum pauco aceto, aut etiam addita aqua insilatiua semper vini, & portulacæ. Quod si vigilie accesserint, timebitur futura phrænitis, aut peraphrænitis, quamobrem prædicto remedio instandum, & decoctum papaueris miscendum, & interim cordis calor attemperandus, aer quoque attemperandus, & venter leniendus. Placet porro hoc loco meminisse eorum, quæ noxia sunt capiti quorum catalogum Galenus scripsit, nocent quidem non tantum in capitis doloribus, sed in omnibus affectibus in ipso subortis. Viticis semen, absynthij succus, lactis potio, glandes quercinæ, oliuæ nigra, arbuti fructus, eruus, mirrhæ, thus, hederæ capreoli, mentem quoque turbant junci odorati semen, crocus, peucedanum, ciclamini sicum vino potatum, styrax, modicus potus morisistatem soluit, multus autem turbulentos somnos efficit.

CAPVT



## CAPVT LXI.

## De Pica siue malicia.

**P**ica symptoma est ad naturalem facultatem, ventriculi at-  
tinens, siue vitiosus appetitus; euenit autem frequentius  
fæminis vtero gerentibus, acut. 3. mense. Atque appetunt  
carbones, terram, gypsum, aut testas. Causa est retentio san-  
guinis menstrui, atque occurfus ejusdem ad ventriculum qui  
mutat ejus temperaturam.

Ceterum cum sanguis pituitam habeat mixtam, atque hæc  
cum sanguine corrumpatur, in fæcalem mutetur, aut aliam cor-  
ruptionem, & putriliginem assequantur, aduersarum rerum  
appetitus fiet; ac proinde pica dicta est, quoniam quadam auis  
ejus nominis diuersis arborum generibus inseritur, ita & fæ-  
mina quæ hoc symptoma patitur diuersos cibos appetunt,  
aut quoniam hæc varios cibos appetit quoque, & prauos, no-  
tus morbus est ex accidenti prædicto.

Præterea accidit multa in ore salua, stomachi imbecil-  
litas, ciborum auersio, bilis ac pituita euomitiones, quibus  
melius habent.

Victus conueniens exsiccans, vti carnes assæ, & acida aliqua-  
mina, paucus potus vini fului, & austeri, dulcia euitent, &  
ciborum copiam. Diuersitas autem horum procuranda, tum  
vt aliquid accipiant, tum etiam vt ex varijs cibis aliquem eli-  
gant.

Exercitationibus vtantur quæ sibi conueniunt, nec valde  
lassentur. Prima mensa oliuiis sale, & aqua conditas accipiant,  
aut vt à nobis condiuntur, sale, aqua, origano, folijs lauri, &  
corricibus limonum, aut capreae cum aceto, & sale, aut ca-  
parorum germina eodem modo parata, aut mala persica pa-  
rata, quæ hispani (*fontiones*) appetant, aut amigdalas auratas,  
aut cichorium, aut endiuia cum aceto, aut jus pulli acci-

Sf iij

pient



piant elixi cum malis cotoneis, aut pyris austeris, aut eidem  
juri succus mali punici, aut succus viti acerba, aut succus pa-  
inorum vitis inspergatur; quæ terram appetunt amyllum re-  
cens accipiant. Valet etiam succi portulacæ 3. s. aut ipsa por-  
tulacæ mansa, aut semper viui succus, aut endiuia. Verum si  
prauorum humorum redundantia magna fuerit, vomitus con-  
ciliandus aceto mulso, in quo rapum per noctem macuerit,  
aut venter purgetur. c. cum spica nardi.

Deinde syrupus de mentia compositus cum aceti mulsi  
parte media bis in die bibendum dabitur, aut syrupum de suc-  
co persicorum. Ventri autem palmula cum aceto elixæ su-  
perponantur, aut ex amylo placentia cum poscha malaxata,  
aut oleum mellinum cum aceto, aut hæc eadem cum vino au-  
stero aceti loco. Aqua vero calida non valde potus, humo-  
rum prauitatem moderatur.

# CAPVT LXII

De Conceptionis notis.

**S**igna conceptionis ex Aetio hæc sunt. Si à coitu vterus  
colligitur, clauditur & siccus est; si à pudendo recedit,  
& ad semen retinendum, & amplexandum mouentur, semen  
non excludunt, sed horrores sentiunt, moderatus quidam  
dolor circa pudendum, & umbelicum accidit, os pudendi ari-  
dum est, & vteri os vt Hippocrates dixit comprimitur sine  
tumore, aut inflammatione, & sursum trahitur, veneris appe-  
tentia languet, menses supprimuntur citra molestiam; venæ  
pectoris luent, mammae intumescunt, & lachabent. Progres-  
su pallent, oculorum cavitates nigrescunt, maculae in facie, &  
lentiginēs. Colli anterior pars, calidior, præstantior apparet.  
Si appetant salsa, acida, & picam pati incipiant, aut 2. & 3.  
mense ipsam patiantur. Si os nimium niadescat, hæc appellant  
Hispani (*conchentos*) at motus corporis, & examinatus sit aspe-  
ctus,



Aus, color albidior, aut pallidior fit, & circa consuetum purgationis tempus mamma intumescunt, toto corpore ac lumbis grauantur, urinam calidiorē excernunt, & mensium ratione uterus incalescit, & urina stillicidium quibudam euenit ab initio conceptionis.

Præterea Hippocrates, aquam mulsam dormitura bibendum prabet, ac si concipit tormina, inquit, sentiet, sin minus non concipit, accedunt quibusdam etiam somni grauiore, & longiores, atque insomnia terribilia timoris plena, ob qua excitantur subito, & clamant, atque e lecto exiliant, & ventrem vulneratum iri suspicantur somniantes. Accedit temporum saltus, ac arteriarum quæ sunt in collo, palpebrarum grauitas; alijs verò primo mense nonnihil sanguinis purgatur ab utero, alijs minime.

## CAPVT LXIII.

*De Abortu.*

**N**ouimus quam plures feminas tertio à conceptionis mense abortum facere, & raro aut nunquam fatum ad integritatem seruare. Cuius symptomatis causa magna ex parte sunt mures laxantes, & emollientes acetabula, aut forte nimia humiditas laxans acetabula, & uteri os, & facultatem re-  
tentricem imbecillitans, quas tutius foret antequam conceptionis tempus eas deturbare auxilijs, ceterum experuntur dum laborant, cum ratione uti, & remedijs mitioribus.

Vitus conueniens exsiccat esse debet, qualis cap. de melancholia traditus est, exercitationes conueniunt, & frictions, & balnea aquarum sponte calidarum.

Cumatio verò corpus preparans ad conceptionem à totius corporis vacuatione incipit, ubi prius aqua mulsa, aut syrupi de quinque radicibus sine aceto paretur. Purgatur autem probe ante conceptionem, electuario eleusoph in decocto origani;



ni, vel calamintha, & pillulis aureis.

Conceptionis tamen tempore agarico purgantur facile, vel elect. diaphanici pauca quantitate. Deinde uterus ipse expurgandus est pennis, suffitibus, & illitionibus.

Pelli itaque fiant ex melle tosto, aut pulvere cumini, aut ex lana carpta imbuta oleo laurino, aut irino, aut in vino in quo per noctem maduerit colocyntis, suffiatur uterus odoratis sapius, & uteri os sapius leniatur oleo irino, nardino, anethino, laurino, vel fundatur intra uterum vinum & mirrha, aut vinum in quo balaustium, & rosæ bullierint, ad imbecillitatem retentricis.

Pituitam verò purgat vinum in quo agaricum per noctem maduerit. Optimum quoque remedium Aëtius tradit cum inquit, colocynthidem magnam superne infundito, & seminibus ejectis, ac demissa medulla oleum irinum infundito, & cum defecta particula colocynthidem operito, & per diem, ac noctem madescere sinito, deinde feruenti cinere cocto, & oleum excollato, in uterum injicito, deinde pulvis baccarum lauri cum vino, aut oleo anethino utero admoueat. Aut succinum oleum cum mirrha, & styrace, aut galla cum galbano in irino oleo liquato. Lapidem aquilæ gestare brachio ligatum conuenit; experimento tamen noui valere lapidem cunei, modo insertum ilici cum collo appensus gestaretur.

Fit autem saepe, ut fœmina abortiant ob motum corporis vehementem, & saltum, & ob ictum, aut cibi alicujus desiderium, & ob uteri intemperiem, aut ob alimenti defectum, & magnam aliquam vacationem præsertim ab utero, & fœtus mortem ob flatum utero inclusum.

Causas sane prægressas vitare oportet, debita victus ratione uti, & languentes rescere, & morbos uteri, ut jam diximus, curare.

CAPVT



## CAPVT LXIV.

*De Coxarum dolore seu sciatica.*

**C**oxæ dolor, aut coxendicis, græce schias, & eo morbo laborantes schyatici dicuntur, & Hispani à dolore coxæ eos nominant coxos, Latini innatantes, Græci autem vocem sciaticos. Hujus autem mali causa est crassus, atque lentus humor in coxendicis articulis infractus; cujus generationem quies longa, cruditates, medium autem hamorrhoidum retentio, aut alterius magnæ assuetæ vacuationis, aut fluxus ventris, aut vomitus, frequens quoque coitus id mali sæpe adduxit; incipit autem à lumbis, sæpe ab ipsa coxa, & femore, & nonnunquam crus, & pes ejus lateris in quam sæpe malum desinit, humore translato. Morbus notus est. Dolor enim vexat partem natis prominentiorem, & respondentem in inguine partem, & quandoque femur, & crus.

Victus convenit exsiccans, ut carnes assæ, quæ bonum succum tenuem, non multum præstent, aqua cinamomi, aut anisi, mediocris exercitatio, deambulatio, frictio, balneum aquæ sponte calidæ, ventrem verò clysteribus emollire, atque irritare expedit.

Curationem incipiemus considerata prius corporis dispositione, an plethora, an cacochymia adsit. Quod si plethora adfuerit, sanguinem mittemus secta vena interna cubiti incipiente affectione ipsa verò inueterata venam popletis, vel malleoli ejusdem cruris seccantibus. Hanc eandem seccare oportet adhuc incipiente malo, si menses retenti fuerint, aut hamorrhoides. Præsentè verò cacochymia crassos, ac lentos humores purgationi parabimus aceto mulso, aut aqua mulsa, cum decocto origani, aut pulegiæ. Deinde corpus purgabitur pillulis aureis, aut satidis, aut de thermopistidis minoribus, expedit quoque vomitum à cibo frequenter mouere cum aqua

T r

phani



phani decocto, aut seminis ejus, aut cum aceto mulso, in quo per noctem raphanus maduerit; clysteria acia in hoc morbo commodissima sunt ex decocto calamintha, pulegii, origani, melle & sale, quibus addemus hyeram diacoloclyntidos. Aut ex decocto centauriae, absinthii, & lupinorum cum oleo rutaceo, melle & multo sale. Aliud. Salvia, stachados, & campepyrbeos ana m. j. polipodii g. j. seminis anisi, faniculi, & anethi ana g. ss. bulliant in lib. 6. aquae ad consumptionem tertiae partis, residuum seruetur ad clysteria, quae conficiuntur addito melle, sale, & benedicta, aut hyera diacoloclyntidos, aut fiant ex muria piscium, & melle, atque oleo rutaceo, qui valida admodum sunt, & breui prodesse vidimus in non paucis.

Conducunt etiam cucurbitulae cum scarificatione, abundante sanguine in parte affecta, aliter fiant cum multa flamma, haec pravaeuto corpore quemadmodum, & reliqua remedia localia. Quae etenim repellunt nullatenus conueniunt, quoniam humorem impingunt in loco, quae tamen discutunt ante corporis euacuationem ad partem plus adducunt, quam ab ipsa dissoluant. Opportune igitur adhibita quae humorem discutunt optima sunt, quae pro loci situ valentia esse debent. De his est fons olei rutacei adhibitus, aut ex lixinio, & sale, aut nitro: aut ex rutatio, & galbano linimentum, liquetur autem galbanum in aceto. Vel calamintha, pulegiu, melilotum, ruta, centaureum, anethum, & ros maritimum in aceto bulliant, & eo calenti sponsa frequenter pars foueatur. Aut emplastrum supponatur, quod recipiat farinae erui, farinae lupinorum cachios ana g. j. & radicis irros, aristolochia, staphisagriae ana g. j. mellis, aceti, vtriusque g. iij. *in idq* *T* *galba*  
 Aliud cochyros, radicis irros, foliorum ruta ana g. j. pipertis g. j. piperis g. j. ss. sulphoris g. iij. omnia triturentur. Deinde accipe galbani oppopanicis, amoniaci ana g. j. diluantur in aceto, & omnia simul cum resina terebentina ad emplastri formam redduntur, ex his quoque dropaces fiant ex resina, *galba*



galbano, amoniaco additis pipere euphorbio, & sulphure, aut loco hujus vini facem addimus. Validum emplastrum fit ex radice cucumeris siluestris in aceto elixa, deinde cum adipe porcino malaxata.

Fiunt etiam emplastra ex stercore columbino, ficibus, & aceto mulso sic. Stercoris columbini ꝑ. ij. ficum ꝑ. j. farina cachyxas ꝑ. s. mellis, & aceti vtriusque ꝑ. ij. huic addimus staphysagriam. Aliud synapis ꝑ. j. cachyxios, farina erui, vtriusque ꝑ. s. pipereis ꝑ. j. cum aceto, & melle miscantur ad emplastri formam. Aliud vnguenti Martiani, quod alij appellabant Martianum vnguenti Aggripæ, vtriusque ꝑ. j. olei rutacei ꝑ. ij. galbani in aceto liquati ꝑ. ij. euphorbij ꝑ. s. piretri, staphysagrie, vtriusque ꝑ. j. resina quantum sufficit fiat emplastrum.

Hæc medicamenta vesicas inducunt, & humiorem purgant. Ex adurentibus est lepidium, sive agriocardium, quod vtimur ad emplastra, hoc modo. Agriocardam aut radices cum adipe suillo contundantur ad emplastri formam, & loco dolenti superponatur, tandiuque permittatur donec pars nigrescat, aut liueat, deinde semoueat, & loco ejus galbanum in aceto liquatum cum oleo irino, aut cyprino superponatur.

Postremo loco in hujus morbi curatione succedit manus opera, candenti enim ferro crustas inducimus tribus in locis supra articulum, & diu seruamus vlcera.

## CAPVT LXV.

### De Pernionum curatione.

**P**erniones qui græcis chymethla vocantur, bifariam solas partes extremas, vti manus, pedes, & aures afficere solent, cum vlcere aut sine ipso. Causa est nimia frigiditas ambientis aeris, quæ sanguinem congelat, is verò deinde putrescens

Tt ij pru-



pruritus efficit, quoniam acris vapor non inuenit exitum, sequitur inde ut valde putrescens sanguis, ac prater naturam incallescens, carnem adjacentem vlceret.

Perniones qui sine vlcere fiunt, probe curantur muria calida superfusa, in qua betta bullierit, aut farina erui cum succo asphodeli, id est haustula regia, aut decocto radice eiusdem, aut lenimentum cera liquata, oleo in quo alium bullierit, optimum est decoctum naporum valde calens.

Aliud probatissimum. Vini albi lb. j. aluminis 3. j. bulliant, & vino pars foueatur aut immergatur. Praterea decocto lupinorum pars foueatur, deinde melle cocto, & sulphure leniatur.

Perniones cum vlcere factos, curat olei lentiscini 3. j. cere quarta pars, naps excuetur, & intra ipsum infundantur, deinde abluta parte decocto lupinorum, aut muria, ceratum refrigeratum admoveatur. Probatum est rosaceum cum cera in naps elixum, & frigidum admotum.

Valeat etiam vsum thuris, aluminis ana 3. j. minij 3. j. resina terebentina 3. j. & 3. adipis suilli 3. j. lento igni miscantur.

Aliud thuris, & aluminis ana 3. 8. vnguenti de minio 3. j. olei lentescini 3. 8.

Vnguentum empirici cuiusdam, quod vlceratis perniombus valet, & fissuris pedum, manuum, & labiorum. ʒ. lithargirij, thuris, zinziberis ana 3. j. cera, mellis, & olei quantum sufficiat, fiat vnguentum.

#### *Ut Decidant pili, remedium.*

**P**Enitus pilum extirpat hepar thymi putrefactum. Rursus lachryma haderæ cum succo bryoniae liquata. Et vitice sylvestris semen cum sanguine vespertilionis, sanguis ranæ, tithimalli succus cum oleo, & vino in balneis, & succus fermenti qui distilat cum vritur. Rursus radix buglosa, hyacinthicum



ticum thure, & amigdalidis amaris addito oleo malaxanda, & lenienda.

## CAPVT LXVI.

*Pessulum errhinum quod memoriam labentem reparat, & amissam restituit.*

**M**enthæ sicæ, pulegij, euphrasæ, verbenæ, seminis coriandri præparati, calitrici añâ 3. j. floris roris marini 3. j. β. calami aromatici, & cinamomi añâ 3. ij. gariophylorum 3. j. β. moschi, & galliæ vtriუსque gr. vj. mellis anacardi, & styracis, calaminthæ vtriუსque 3. β. Quæ ex his triturationem patiuntur, in puluerem tenuem redigantur, & omnia cum aqua stillatitia faniculi in pastillos conformentur, ex quibus pessuli fient ad formam nuclei palmulæ cum opus fuerit.

Qui voluerit vti hoc medicamine hunc ordinem seruabit. Purgato prius corpore 10. noctibus nihil aliud præter passulas cum amigdalidis paucis, & paucio pane cænabit. Prandium autem erit caro assa gallinæ, aut pulli gallinæ, turturis, aut perdicis.

Potus vinum album vnius anni modice dilutum, singulis autem noctibus prope horam somni pessulum sinistræ nari inferet, & narem cotto obturabit non ultra, quam decem carmina Virgilij recitet.

His elapsis diebus pessulum vnum recens sinistræ nari inferat, & cotto obturet, deinde legat attente quæ voluerit addiscere per integrâ horam, aut etiam duas, deinde secluso pessulo dormiat, mane namque singula quæ legerit memoriatenebit, ita vt memoriæ tenacitate neminem parem inueniat. Abstinere debet ab his qui his pessulis vti voluerit, aut memoriam seruare, ab ebrietate, venere, cruditate ventriculi, & omni societate, à fructibus viridibus, & oleribus, à lacte, caseo, & carnibus salicis, omnibusque flatum generantibus, à piscium

T t iij cium



cium ficiatiliu efu, anguillarum præfertim, licebit: tamen  
(trullas) degustare, nocent eisdem aqua potus, aut vini copio-  
sus, postrema mensa semen coriandri præparatum accipiet.

## CAPVT LXVII.

*De Cucurbitulis.*

**C**ucurbitulas admoemus, aut reuulsionis, aut deriuatio-  
nis, aut vacuationis ratione. Reuellit siquidem sangui-  
nem è naribus fluentem cucurbita, hyppocondrio è directo  
respondenti affixa, & immodicum mensium profluium sup-  
primit magna cucurbita radici mamarum affixa, & vterum pro-  
cedentem reuocat cucurbita iuxta vmbilicum adnota.

Deriuationis verò, ac vacuationis gratia, non admoentur  
nisi corpore prius euacuato. Sed tunc cum humores aliqua  
parte obsederunt caput, pars quoque influit, cucurbitas admo-  
nentes ceruici, & deinde spatulis, quandoque etiam natibus,  
ac pro multitudine easdem scarificamus, aut sine scarifica-  
tione eisdem vtimur. Nam si vires non admodum validæ fue-  
rint, vt sanguinis missionem ferant, & opus est aliqua eua-  
cuatione, cucurbitulis cum scarificatione vtimur, prius eas  
parti affigentes, deinde eam partem scalpello multis in locis  
cute tenuis seccantes. Rursus cucurbitulam loco admoemus,  
& sanguinem educimus, quod facimus sæpe parti patienti eas  
admoentes, nunquam tamen ante corporis vacuationem,  
ne multus humor in partem ducatur, valde namque suggunt,  
ac proinde schyrrosis inflammationibus eas admoemus cum  
scarificatione, & status discutiendi gratia. Profunt enim in-  
cantationis modo auctore Galeno, & tumoribus flatuosis. Sic  
etiam vbi ex intimis ad extimas partes humorem aut flatum  
traducere volumus, id facimus in morbis lateralibus qui fiunt  
inter costas, sine febre potissimum, & paucò humore præsen-  
te, & coxendicij doloribus.

CAPVT



## CAPVT LXVIII.

*De Scarificatione.*

**S**carificatione præterea sanguinem reuellentes, ubi humorem tenuem non multum distrahere volumus. Sic etiam ex vniuerso corpore, quandoque vacuamus, ut in pueris ubi continentibus febribus laborant, crura, quandoque brachia scarificare præcipimus, quoniam sanguis ipsorum tenuis est, & affluxum spirituum prohibemus, atque virium dissolutionem, scarificamus quoque partes scyrrholas, & partes veneno extrinseco affectas, & inflammationes veneficas. Crura etiam quandoque scarificamus remouentes à capite, vel menses prouocare volentes, sic etiam, & suppressis hæmorrhoidibus, sic & partes conuulsas, & partes quæ rubra macula inficiuntur. Præterea antiqua vlcera scarificare præceptum est, quibus quandoque applicamus sanguisugæ parte prius perfricta sale, vel scalpita ita ut rubeat. Quod si opus fuerit sanguine partem lenies, & sanguisugarum sordem spongia mundabis. Sint autem sanguisugæ per diem antecedentem captæ, & pauco sanguine alitæ, sed interim in aqua pura, & dulci seruentur, & per arundinem, aut fistulam in partem demittantur, ne sanas partes attingant, & offendant. Hæc autem fieri oportet ubi expressa prius virus euomuerint, earum dorso viridia sint, sed ventres rubeant, eligantur ex fluentibus, & mundis locis, & aquis, non nigrum, nec lanuginem habentes, cum vero opus fuerit ipsas amoueas sale inperso, aut cinere, ne tamen virus ibi relinquatur eueturbitula apposita excrementa purgentur. Quod si sanguis anastomosi facta immodice fluxerit, quod fieri solet, duabus horis transactis, puluis rosa, aut gallæ combustæ parti inpergatur, has sæpius ano admouemus in melancholicis morbis ex suppressis hæmorrhoidibus.

*Comper.*



*Compendium pro Cauterijs, & Fontanelis.*

**M**irandum merito foret cæteris aliarum scientiarum professoribus, quanta sit laus scientiæ medicinæ, quæ destinato sibi fine conseruandæ, vel reparandæ sanitatis, plura media, & intento operi efficiendo plura suppeditat instrumenta, quod ad suos fines cæteræ non faciunt facultates. Enim verò licet in hoc ars nostra sapius naturam superet, in ordine tamen efficiendi ab earum differt, nam vtraque semper à minoribus ad maiora progreditur. Sunt autem maiora auxilia in arte medica præcipuè venæ sectio, & purgatio, 2. aphor. 29. Tum quia frequentiora, tum quia maioris efficaciar, tum quia magnis debentur morbis, sed eisdem de causis sunt etiam magna auxilia balneorum vsus, sudores, cauteria, & fontanelas; atque hujus quidem auxilij præstantiam monstrat frequens euentus, sæpe enim in quibus desperata omnino salus est, vnū restat pro cæteris auxilium per fontanelas. De quarum natura, vsu, vtilitate, modo, & loco aperiendi, vt vestro studio semper obsequamur, quam breuissime dicendum est.

## QVÆSTIO I.

*Quid, & quoduplex sit fontanela.*

**C**Auteria, apud antiquos magno fuisse in vsu, & cum felicissimo euentu constat ex Hippocrate 6. aphor. 27. lib. de internis affect. ad m. ex Galeno 13. meth. 6. & 6. epid. sect. 6. text. 5. Auic. fen. 4. 1. doctrina 5. cap. 29. Paulo Aëtio, & alijs. Constat etiam legentibus fuisse apud illos in vsu fontanelas, sed cum hoc discrimine, quod cauteria pro præsentî necessitate, & magis, & solum fiebant. Fontanela verò ad temporum diuturnitatem; & licet vtriusque remedij vsus vetustate aliquantulum aboleuerit, nostra hac tempestate fontanelæ



la frequentissimo sunt in usu cum felicissimo successu.

Est autem fontanela apertio quadam alicujus membri per combustionem. Verum cum duplex sit combustio, una perfecta in qua totum id quod comburitur vertitur in cinerem; altera imperfecta quando scilicet, id quod comburitur vertitur in carbonem. Pro fontanelis requiritur solum combustio imperfecta, ita ut locus fontanelæ maneat semi-vstus ad carbonis formam, vocant sccharam, quæ nihil est aliud quam cutis, & proxima carnis combustio cum nigredine.

Sub latitudine hujus auxilij sunt varia genera, setones, vulgo (*sedehos*) cauteria, fontanelæ, vesicatorium, vstiones. Differunt hæc omnia inter se multifariam, nam setones duplici vlcere fiunt, & magis circa cutem. Fontanelæ altius penetrant, unde illæ in cutaneis affectibus magis conueniunt in pitigine, vitiligine, & alijs cutis sceditatibus. Fontanelæ verò in affectibus qui ab additis corporis partibus proueniunt. Cauteria verò, & vstiones ferme eidem parti affectæ adhibentur, non ita fontanelæ, aut setones. Vesicatorium est vlcus leue, cum amissione cuticulæ, factum à medicamento acri, & mordaci, ut sunt cantharides, flammula Iouis, esuforbium; citius agunt & resoluuntur vesicæ, quam scchara. Vnde quando materia indiget celeri euacuatione, ut est maligna, probantur vesicatoria magis quam fontanelæ. Differunt etiam hæc omnia genera inter se ratione loci, efficaciar, figuræ, instrumentis, indicationibus, ut clarius ex dicendis patebit.

Interim oritur difficultas, an liceat aperiri fontanelas, setones, & alia id genus auxilia; si hæc omnia, vel morbi sunt, vel causa morborum, soluentes continuum, exulcerantes, & intemperantes, & cum amissione partium viuentium carnis, cutis, ossium est. Dic breuiter sapienter in arte medica, licet pro curatione vnius morbi grauioris alium leuiorem concitare; sic febris superueniens contusione, bonum, & illam aliquando licet medico pro sananda contusione excutere. Sic in scia curatur verberibus, cum dolore, & contusione etiam mem-

Vu bro-



brorum; sic in grauioribus morbis licet concitare vlcus per fontanelas, setones, & vesicatoria, quia maior est vtilitas quam dispendium ex vsu illorum auxiliorum.

## Q. V. Æ. S. T. II.

## De modo aperiendi fontanelas.

**F**ontanelæ semper aperiuntur per cauteria; sed cauteriorum duplex est genus; vnum actuale siue igneum; alterum potentiale siue causticum. Actuale est quod nullo eget auxilio, vt suam edat actionem, sed vbi membro admouetur statim comburit. Potentiale verò tale datur, quod ejus vis non nisi à calore partis excitata partem ipsam calefacit, & instar ignis comburit. Actuale ex duplici constat materia, vna quidem dura, & sicca, altera humida, & molli. Materia solida. cauteriorum, vel ex metallis, vel ex stirpibus; ex metallis, vt ex argento, auro, ferro, ære, chalibe, atque inter hæc alij Auctores, alia magis approbant juxta varias intentiones. Nā Auic. cauteria ex auro, & argento cæteris præfert, ratione loci exurendi quando præstantissimus est, & tum etiam quia aurum, & argentum naturæ humanæ sunt similia; ex quibus in membro quæpiam mala qualitas imprimi non potest, quemadmodum forte ex alijs, ideo diuicibus, & nobilibus sunt in vsu. Aristoteles laudat magis cauterium ex ære, vt quando maximam requirimus exsiccationem, aut magnam impressionem in membro, alias non est ita accomodatum, quia excitat vehementissimum dolorem.

Arabes, & præsertim Albumazar cauterium ex ferro, vel chalibe valde extollunt, quoniam diuturnior ex eo fit impressio, & quoniam solida magis sunt, vnde non eliquantur, dum igniuntur, quod tamen aurea, vel argentea, vel ærea patiuntur. Ex stirpibus cauteria etiam conficiuntur, vt sarmento vitæ accenso, aut radice gentianæ, radice aristoloquiae rotunda,



de, fungis quercuum, & juglandium, hæc enim omnia accensa, & membro applicata inurunt, & deducunt ad scaram.

Materia humida. ex qua parantur cauteria actualia, vel arte liquefcit, vt plumbum, vt sulphur, vel suapte natura liquida est, vt oleum feruens, vt aqua feruentissima. Caterum hæc omnia caute sunt apponenda, ne totum membrum devratur, aut alia sequantur incōmoda; propter hoc si cauterium ex materia humida eligatur, circumcirca locum inurendum excutetur agger qui alueum efficiat ex farina pinsata, aut argila emollita, & in spatio intermedio infundatur sulphur, aut plumbum liquatum. Est & alius vsus cauterij humidi, vt in acrocodonibus, & verrucis quas si vrere velimus assumatur dimidia testa juglandis, quæ ablati interanarijs aperitur foramine ejus magnitudinis cum verruca, inde hæc intromittitur per foramen, ita vt giba pars testa hæreat manui, & in cava parte supra verrucam apponitur sulphur, quod candela accenditur, & tandiu in loco seruetur, quandiu ardor testam penetrans incipiat cuti communicari, & tunc totum remouetur.

Cauteria potentialia, siue caustica sunt per medicamenta sicca, & calida in quarto gradu, quæ crassa constant substantia, in qua vis caustica seruetur, vt dum à calore partis comburenda actuatur, minime dissipetur. Ista caustica inter se siue magis, & minus distinguuntur, quod perutile est vt varijs affectibus, & corporibus accommodentur, non enim omnibus omnia conueniant, sed huic quidem vnum, illi verò aliud, propterea horum cauteriorum quatuor habemus materias, sumam magis, & minus distinctas, sed sunt omnia calidissima, & crassissima, & vt plurimum cum virtute adstringente, & corpus comburunt instar aliorum cauteriorum, verumtamen sunt valde dolorifica, & igneunt valde corpus, & propter sui crassitudinem non facile penetrant ad profundum. Quædam autem sunt simplicia, quædam composita. Rursus quidem vtrorumque alia quidem sicca sunt; alia verò prahumida constant substantia. Simplicia sicca sunt mysi, calcirhis, atramentum furo-

Vu ij rium,



rium, siue crudum, siue vstum, vulgo vitriolum, cadmia combusta, calx non extincta, hæc si diutius apposita membro devrendo permaneant, exulcerant, inflamant, dolorem ingentissimum concitant, & præ sui mala qualitate, non solum membrum corrumpunt cui apponuntur, sed & totum corpus alterant. Simplicia humida sunt, vt aqua sulphuris, oleum sulphuris verum, oleum vitrioli, & similia, quæ omnia valde corpus igneunt, & cautè ad modum sunt applicanda, vt de reliquis causticis dictum est.

Caustica composita quæ sicca, vel humida substantia constant, eodem modo sunt efficacia, vt simplicia, & caute etiam adhibenda, inter quæ acutissimum est medicamentum, quod cepitellum vocatur, pharmacopolis satis notum, item trochiscos de minio ex pasta triticia fermentata, sublimato validissimo, & minio conflatu, inde humida composita est præcipue aqua illa erradens, vulgo, *agua dos dorradores*.

Sunt & alia caustica, tum simplicia, tum composita, quæ calidissima sunt, an etiam humida, vel sicca, non est huius loci resolvere, interim constat, ea magis tenuium esse partium, quam reliqua caustica, & in altum facilius penetrare, licet terrea etiam, & crassa constant substantia, & appellantur proprie putrefacientia, quæ vel sunt ex animalibus, vt est pityocampes, vel ex plantis vt drioptiris, aconita, vel ex metallis, vt est arsenicum auripigmentum, sandarac, crisocola, & alia similia.

### QVÆST. III.

*Proponitur certior modus aperiendi fontanelas.*

**G**eneraliter adhuc dictum est posse aperiiri fontanelas, vel cauterio actuali, vel potenciali, nunc duo supersunt dubia resoluenda. Vnum: quis modus ex duobus propositis securior sit, & vtilior; alterum: quomodo cauterium actuale sit exercendum similiter, & potentiale in ijs casibus in quibus vnū,  
vel



vel alterum magis conueniens est.

De primo inter cauteria actualia magis est in vsu hodie, si-  
ent jam olim cauterium ex ferro ignito, quo supposito certum  
est cauterium actuale, & securius, & vtilius esse potentialibus,  
testantibus ita Auicena, Albumazar, Celso, & multis alijs; nam  
ignis simplex est cuius actio non peruenit, nisi ad membrum  
in quo oportet fieri combustio, sine cauterium, ideo fere nihil  
noceat partibus circumuicinis, imò iuuat propter bonitatem  
sue complexionis, & substantiæ, nisi indebite applicetur, &  
facit, ne corruptio super membro vltius procedat, & facit  
ad confortationem membri, cuius complexionem volumus  
rectificare, facit insuper ad resolutionem, & remotionem ma-  
teriæ corruptæ contentæ in membro, & ad fluxum sanguinis  
restringendum; quæ iuuamenta non sequuntur ex medicinis  
corrodentibus, putrefacientibus, & causticantibus, nam earū  
actio peruenit ad membra valde distantia ab affectis, & inducit  
difficiles aggritudines, & aliquando mortem. Hic est quod in  
apostematibus à materia frigida, humida, corrupta, magis lau-  
datur cauterium actuale, quam potentiale. Similiter in ma-  
teria corrupta, & venenosa, & in carbunculo, herpete, estio-  
meno. Verum si materia apostematis sit calida, & sicca, tunc  
pro rectificatione membri, nec actuale, nec potentiale caute-  
rium est adhibendum, quia esset addere siccum sicco, & cali-  
dum calido, sed in talibus exituris, & apostematibus phlegmo-  
nosis, quibus associatur erisipelas, ferro frigido, & non ignito  
incisio facienda est.

De altero cōmunior vsus in cauterio actuali, apud no-  
stros, est ferro ignito, vulgo (*botão de fogo*) aut auro, vel ar-  
gento partem inurere, in qua fontanelam volumus aperire,  
ita vt cutis, & vicina caro inuratur, estque combustio quoad  
latitudinem, & profunditatem tantæ magnitudinis faciendæ,  
vt cicer intro capiat, vel globulus cereus expers omnis in-  
æqualitatis, ne ejus asperitas dolor immodicus concitetur.  
Qua de causa prima, vel etiam secunda die, post cauterium

· Y u iij in



intromittatur globulus ejusdem magnitudinis ex filis siccis, qui citra molestiam foramen seruat apertum, & humiditates euocat ad locum fontanelæ; eo verò tempore transacto, filis jam non est vtendum, sed cicere, vel auelana cerea, vt autem securius celebretur hoc cauterium, certa ei forma vtilissime adhibenda est. Pro quo ferula ferrea tenuis eligatur cum quodam foramine in medio plani orbicularis, qua loco designato superponatur, deinde ferrum bene ignitum per foramen velociter intromittatur, sub ea magnitudine protensum, & per eam moram, vt cutim, & aliquam carnis portiunculam derat; tunc totus locus circum circa liniatur butyro crudo, aut recenti, & intra foramen mittatur lichinum rotundum ex filis siccis, inde supra totam partem ponantur lintea madefacta ex rosaceo, & oui vitello, tum vt dolor liniatur, tum vt aliqua suppuratio in parte excitetur, ex qua occasio fluendæ materiæ per fontanelam præbeatur, desuper fascia ex lino adhibeantur, nec nimis laxa, nec nimis adstricta, & transactis octo, vel decem horis hæc eadē lichinia, fomenta, & ligaturæ repetantur, similiterque bis per sequentem vnum, vel alterum diē, quo transacto, vice lichynij cicēr intromittatur, & superponantur lintea, cum folio hederæ, vitis, maluæ, plantaginis, cū debita ligatura, & deinceps reperatur curatio eadem, cum nouis linteis ferme bis in diē; quod si symptomata aliqua superueniant, vt vehemens dolor, erisipelas, inflammatio, occurrēdum eis est ex arte, tum localibus, tum sanguinis missione, tum etiam alijs auxilijs quæ videbuntur.

Si caustico aperienda sit fontanela, vel propter nimium sensum agrotantis, vel propter metum, de ferro candenti conprobatum habeo, experimento aliorum, vel meo, inter cætera caustica vtilius esse breuius, & suauius, quod paratur ex parte vna sublimati, & parte duplici opij cum aqua erradente, vulgō (*agōa forte*) & sic peragendum est cauterium; sumatur concula eburnea, vel ossea perforata ex vna parte sub ea magnitudine, sub qua fontanela est aperienda, intra conculam ponatur



natur papius madefacta in aqua erradente, & puluerifetur ex sublimato, & opio vt dictum est, tunc in loco fontanelæ designato ponatur concula, ita vt causticum carni adhæreat, & hinc inde ad conculam circumponantur puluaria ex lino, quæ rectam, & integram sustineant, ne causticum ad proximas partes dilabatur, & præterea fascijs fortioribus desuper hæc omnia sunt deliganda, nec remouenda, nisi post octo, vel decem horas, quibus transactis remoueantur illa omnia, & scara ex caustico facta per medium ferro scindatur, diuulsisque in utraque partem labris intromittatur lichynium, vel cicer, & inungatur totus locus ex butyro recenti, desuper lintea madefacta ponantur ex oleo rosaceo, & oui vitello, cum debitis ligaturis, & cum reliquis quæ pro cauterio actuali dicta sunt, & deinceps curatio sub illa forma repetatur. Quod si accidentia superueniant, vt excrecentia carnis spongiosa, quod frequenter contingit, succurendum est in eo casu cum pulueribus, vel aluminis, vel tutiæ cum unguento apostolorum, & similiter pro alijs accidentibus faciendum erit si superuenerint.

Serones aperiuntur etiam cauterio, vel actuali, vel potenciali, sed duplici in parte, vicina tamen, ita vt ex vno foramine, ad aliud detur communicatio per intromissum filum cetaceum, vulgo *sedenho*, & in exercitio huius auxilij ejusdem modis pro dolore, & pro ligatura vtendum est, quibus in fontanelarum aperiitione, & curatione.

Visiones similiter sunt celebrandæ, si opus erit de quibus non agimus in presenti, quia earum vsus fere aboleuit.

Vesicatoria per applicationem cantharidum, vel similis medicamenti celebrantur, & relictæ vesicæ citra emplastra, vel unguenta sponte, & facile exsiccantur.

#### QVÆST. IV.

*De locis in quibus debent aperi fontanelæ.*

**G**eneraliter fontanelæ aperiendæ sunt, non in parte nervosa, aut musculosa, nec prope illam, quia concitabitur ingens



ingens dolor; nec prope ossa propter periculum fistularum, sed in parte carnosâ, quia ad illam, tum propter ignobilitatem, tum propter compositionem, & temperiem, facilius transfunduntur materia, quæ per fontanelas sunt educendæ. Hoc supposito duplex spectatur est locus aperiendis fontanelis commodior, & frequentior, scilicet in brachijs, & in cruribus juxta naturam affectus quem volumus curare. Sed variat etiam locus, prout materia morbifica, vel est euacuanda, vel reuellenda, vel deriuanda; unde si ex capite v. g. per fontanelas materia simpliciter est euacuanda, administratur fontanela in sutura coronali, si sit reuellenda, excitatur in cruribus, & ex sententia multorum etiam in femoribus, si deriuanda, inuritur locus infra occipitium, vel inuruntur spatula, vel brachium, prout deriuatio, quæ media est inter euacuationem, & reuulsionem, magis accedit ad hanc, vel ad illam. Porro semper virtus est perpendenda ejus loci in quo fontanela aperienda est, si enim aliquando pars fuit vulnere, aut ulcere affecta, aut obnoxia est dolori, vel plus justo attenuata, signum est imbecilla virtutis, cujus indicatio prohibet ibi fontanelam, vt in hydropico si tumida sint crura, non debent aperiiri fontanelæ in cruribus, quia monstrante experimento ager in periculo deducetur.

Euariat etiam locus in aperiendis fontanelis pro qualitate, & situ materiae; ideo in feminis dum menstruis sunt idoneæ, ferme in cruribus aperiuntur, vel si jam morbus ex consensu partium inferiorum factus est per essentiam in superioribus, tunc vna fontanela in crure, & altera in brachio est aperienda attendendo semper ad originem fluxionis, & ad vergentiam naturæ, unde in feminis etiam vetulis certius est in cruribus aperiiri, quam in brachijs. Ex eadem causa in masculis, quando morbus est in partibus superioribus, per consensum hepatis, vel renum, in cruribus etiam sunt aperiendæ fontanelæ. Euariat etiam locus, siue in cruribus, siue in brachijs aperiendæ sint fontanelæ, quia pro varijs affectibus modo à parte interna brachij, vel pedis, modo ab externa debent aperiiri, vt in  
feminis



fæminis optimum consilium est semper internam cruris partem aperiri in brachio verò tam in fæminis, quam in masculis iuxta situm, & conditionem materiæ eligendus est locus, nam si affectus radicem habeat in medio cerebri, aut sit inueteratus, præstat internam brachij partem inurere, & contra verò externam; & similiter in alijs casibus judicabis, vt angina, cephalæa, stilicidio, prout deriuare magis, vel reuellere, aut euacuare expediet.

Nec satis est ad aperiendas fontanelas eligere partem carnosam in brachio, vel in crure, sed oportet etiam justam seruare mensuram, ita vt in brachio aperiatur fontanela per distantiam sex digitorum ab humeri iunctura prope venam cephalicam, à qua tamen deriuandum est, inter musculos anteriorem, & posteriorem, at in cruribus aperienda est in latere, siue interno, siue externo, inter musculos per distantiam octo digitorum infra genu.

Oportet præterea, vt fontanelæ non aperiuntur prope membra nobilia, quantum fieri potest, quia materia praua transiens per principalia insigniter lædit, vnde melius est euacuare reuellendo, vel deriuando; quæ ratio etiam locum habet pro oculis, & pro alio quouis membro acuti sensus. Cauiere insuper debemus perpetuo nervos, venas, & arterias, saltem maiores, ne ingens dolor, conuulsio, hæmorrhagia, aut alia sequantur incòmoda, eligendus est semper locus, qui declinior sit collatione membri, ex quo materia est educenda, vt per fontanelam sanius, & còmodius exire possit.

Setonum autem locus non semper vnus est, sed variat etiam pro natura affectuum quibus mederi oportet; sic in vitij oculorum, aurium, narium, & oris, aplicantur occipitio prope circulum capillorum. In affectibus melancholicis, qui ex vitio alicujus visceris suboriuntur, affixum setonem supra ipsam viscus miro modo coopertum est, pròdesse similiter in his quibus viscus valde tumidum est, vt jecori, spleni, mesenterio, opitulatur plurimum seto, supra parte ni affectam affixus,

X x

cujus



cujus vice Hippocrates, & antiquiores utebantur vstionibus; vesicatoria adhibent cuilibet loco, prout postulat ratio affectus, sed semper in parte carnosâ, & cum alijs conditionibus, quæ pro fontanelis dictæ sunt.

## QVÆST. V.

*Quibus affectibus conueniant fontanelæ?*

**S**upponendum certò est fontanelas inter remedia localia, & particularia numerari, proinde certum est eas parum prodesse, quin & lædere posse nisi præcedant vniuersales euacuationes, purgationes, sanguinis missiones; quia cum fontanela sit validum medicamentum, si corpus sit plenum, trahuntur humores ex toto, quorum defluxu, vel concitabitur magna inflammatio in loco fontanelæ, vel dabitur decubitus materiæ ad aliquam partem, & certo experimento sapius comprobatum est infelicitè succedere hoc auxilium, nisi præcedat integra, & repetita corporis euacuatio, per pharmaciam, phlebotomiam, & debitam victus rationem.

Hoc supposito fundamento resoluendum est fontanelas, cum sit remedium euacuans conuenire solum morbis materialibus, non autem morbis intemperiei, nisi intemperies ortum habeat à causa materiali, quapropter in præseruatione hæctica possunt prodesse, quando ob redundantiam prauorum succorum, non sit debita nutritio, & arescit corpus vergens ad marasimum (qui aliquando fieri potest incipiendo) quo casu præcauendum est per euacuationes etiam vniuersales, & particulares. Vtrum vero in hæctica jam firmata, cum redundantia cacoehymia conueniant fontanelæ, & aliæ euacuationes. Certius puto non conuenire fontanelas, conuenire verò alias euacuationes leuiiores, cum medicamentis humectantibus potius, quam exsiccantibus. Nam hæcticus confirmatus virtutem habet valde debilem, proinde tolerare non potest auxilia



auxilia resoluentia, qualia perpetuo sunt fontanelæ, quia cum euacuatione materiæ inutilis resoluunt etiam multum de utili, quæ de causa multæ laborantes ante fastidiebant, famescunt valde post apertas fontanelas ex resolutio humido membrorum.

Resoluendum præterea est, licet fontanelæ conueniant morbis pendentibus ex cacochymia, non proinde tamen conuenire omnibus aqualiter, nam cacochymia orta ex vitio officinarum primæ regionis, vomitibus, vel ænemathibus commodius educitur, sicut cacochymia secundæ regionis ex vitio jecoris, vel venæ facilius aufertur per venæ sectionem, vel purgationem, quam per alia auxilia. At illa quæ oritur excrementis tertiæ coctionis, & regionis, citius, & acutius demitur per fontanelas, quam per cætera auxilia, quippe in qua non conuenit sanguinis missio, quæ potius debetur plethoræ, non purgatio, quia recalcitrat ad intra materiam prauam; non balnea quia non semper sunt ad manum, nec possunt quotidie administrari; non exercitium quia sæpe maiores concitat fluxiones ad partem læsam, & manifesta est proportio inter auxilium externum, & materiam in regione extrema collocatam. Verum non negamus prodesse etiam fontanelas in cacochymijs primæ, & secundæ regionis, & multo magis quando aliquæ partes laborant per consensum ventriculi, intestinorum, vteri, jecoris, & venarum.

Resoluendum etiam est fontanelas, maximè conuenire in morbis chronicis præsertim fluxionibus, tam ijs quæ intus manent, quam ijs quæ extra prodeunt, & præsertim quando ex alterius defluxus suppressione concitantur, siue ille defluxus fuerit naturalis, vt in menstruis suppressis, siue præternaturalis, sed consuetus, vt quando suprimuntur hæmorrhoides, aut varices, & mutantur in asthma, anginam, vel similem affectum, vel quando vnus affectus per transpositionem materiæ mutatur in alium, vt pulmonia in abscessum, dicente Hippocrate 2. prog. 64. Quibus abscessus fiunt ex pulmone circa aures, &

Xx ij sup-



suppurantur, aut ad infernas sedes fistulantur, hi supersunt. Constat autem idem esse fistulari per naturam, ac aperiri ex arte fontanelam. Multo magis valet doctrina hæc in omnibus suppressis fluxionibus necessarijs, aut consuetis, quæ nequeunt reuocari, aut quando natura temporis diuturnitate consuevit in aliquam partem se exonerare à qua consuetudine non potest mutari, nisi per disuetudinem; vtrique autem paulatim acquiritur. Licet autem fontanelæ conueniant in morbis chronicis, eo quod sicuti paulatim materia peccans generatur, ita paulatina eget euacuatione, non proinde tamè in principio statim eorum morborum sunt adhibendæ, sed tentatis prius leuioribus auxilijs, quæ sicuti fontanelæ extrema sunt auxilia, ita vltimo loco adhiberi conuenit.

Inter morbos chronicos iuuantur maximè ex fontanelis affectus omnes, qui per defluxum à capite oriuntur, vt inueterati dolores dentium, gingibarum, faucium, & alij oris affectus, iuuantur etiam maximè asthma, tussis, & omnes thoracis affectus quando à capite per stillicidium oriuntur inter quos præcipue est pthisis, & maxime quando prouenit ex falso stillicidio.

Num in arthritide, schiade, podagra, chyrigra, aut alia quauis specie conueniant fontanelæ, longissima est disputatio; quæ licet negatiuè resoluaturn à practicis. Mihi ita videtur vtiliter decidenda; vt affectus proueniunt, ex materia redundante in venis, & ex his defluente ad articulorum cauitates, inde ad vicinas partes ligamenta, nervos, ac tendones, & ad cutem, vnde propter dolorem aliquando pars in tumorem eleuatur. Verum licet propter materiæ conditiones concitetur defluxus, fit tamen ad illas partes, propter earum imbecillitatem. Hoc supposito certum est hos affectus attenta origine fluxionis, magis & propriè curari per sanguinis missionem, purgationem, per debitam victus rationem, & maximè in eorum principijs, vel accessionibus. Caterum quando ortum habent ex materia primæ regionis, vel sunt admodum inueterati,

non



non dubium est quin fontanelæ debito loco factæ nihil & profint, & quando aliqua ex his speciebus iam nodosa est cum tuberculis ( vocant tophos ) consulunt Auctores faciendam non esse fontanelam, sed vitionem in parte affecta, quia cauterium suo calore humores ibi contentos exsiccat, & in halitum redigit.

Pro epilepsia oportet distinguere; nam si sit per primariam capitis affectionem, inurendum est occiput, qua parte capiti annectitur prima vertebra, vt per vlcus paulatim caput expurgetur. Item non conuenit illa adustio, quando epilepsia prouenit ex humoribus melancholicis, tales enim commodius per hamorrhoidas, balnea, pharmaca educuntur. In epilepsia consensum competunt fontanelæ, respiciendõ ad partem mandantem si recens sit malum, si verò inueteratum, ad partem mandantem simul, & recipientem attendendum est, & in pueris fontanela in occipitio aperienda est, quia fere semper est per essentiam, ob eorum cerebri imbecilitatem, & humorum redundantiam: in feminis accedit epilepsia, cum magna symptomatum varietate, & ferme fiunt ob vteri consortium. Quibus omnibus nullum præstantius, aut certius remedium in arte medica inuentum est; & in epilepsia recenti fontanelæ in cruribus sunt aperiendæ maxime in sinistro; in inueterata verò sunt aperiendæ in crure vna, altera in brachio. Pro feminis etiam conueniunt fontanelæ in omnibus alijs affectibus, qui ex vteri consensu contingunt, vt est cordis palpitatio, vertigo, syncope, cardiaca passio, fastidium, deprauatus appetitus (qui morbus pica appellatur) carbonum, & similia.

Pro hydropse conueniunt fontanelæ, docente nos natura, quæ in hoc affectu vlcera concitat manantia in cruribus, per quæ paulatim aquosus humor expurgatur, sape ad integram valetudinem; cæterum magis conueniunt in anazarca, vtrique cruri affixæ, per quas materia in corporis ambitu contenta dilabatur. Deinde in ascite, quia id prauum, quod intra peritoneum, & omentum continetur per proprias venas ad crura,

Xx iij aut



at per occultas vias ad partes vlceratas deducitur, in tympanite raro, aut nunquam conueniunt ob causam materialem.

Pro iliaca passione, colica, & alijs intestinorum affectibus sunt, qui ventrem vrant paulo supra vmbilicum, laudatur tamen magis setonum vsus supra eundem locum, quia minus debilitant. Pro tenesmo, & hamorrhoidum passione conueniunt maximè, tum ad sedandos dolores si affligere consueverint, tum ne in postremum redeat affectus. Setonum vsus in triplici affectu percipue proficuum est, nempe in affectibus melancholicis qui vitio alicujus visceris oriuntur, vel in quibus viscus aliquod muscidum, & tumidum valde est, vt jecur, splen, mesercon, vel in affectibus cutaneis, impitigine, vitiligine lepras mire etiam cōmendantur in vitijs oculorum, aurium, narium, demum & faciei, pro quibus occipiti sunt apponendi.

#### QVÆST. VLTIMA.

*Verum fontanela possint aliquando claudi, & quo modo*

**C**Ontingit sæpe numero fontanelas post apertas parum, aut nihil prodesse, & longo temporis tractu, quo casu vulgares chyrurgi eas claudi iubent. Sed est de hac re summo opere aduertendum, fontanelas posse non prodesse multis de causis. Nam aliquando ita accedit ob ineptitudinem situs, vt quando fontanela sponte, & paulatim mutant situm, & locum v. g. de parte interna ad externam, vel de parte superiori ad inferiorem, quo casu restat solum, vt reuocentur ad pristinum situm. Quandoque etiam non iuuant, vel quia inuerso ordine in brachio pro crure, vel quia prope musculos fuerunt apertæ, & ingentissimos inferunt cruciatus, quo casu ad locum debitum sunt transmutandæ, quandoque ob callum vlceri ductum, qui vlceri materiam intercludit, vnde pars aliquando intumescit, dolet, & inflamatur, in quo casu recurrendum est ad chyrurgiam. Quandoque ob eximiam caco-  
chymiam,




chymiam, quæ per vnā, vel alteram fontanelam sufficienter non euacuatur, vnde & tres, & quatuor conuenit aliquando aperiri, quandoque ob conditiones materiæ, vt si sit valde crassa, aut viscida, aut multa, quo casu attemperanda, & minuenda est per purgationem, & alia auxilia, quo temperatior, & minor facta facilius per fontanelas dilabatur.

Si autem fontanelæ non iuuant, ob maximam materiæ rebellionem, vel ob dispositiones agrotantis, non proinde sunt claudendæ primis statim mensibus; nam paulatim manu-ductione aliquando assuescit natura eo vergere, quæ antea difficilime propendebat; quod transacto integro anno nullum appareat iuuamentum, nec spes est in posterum apparere, tunc claudendæ sunt, sed duplici seruata conditione. Prima, est non subito, nec omnes simul claudantur, sed successiue si fuerint plures, & qualibet paulatim, ita vt in dies minor, ac minor globulus cereus vlceri inducatur donec ex sese claudatur. Altera conditio est, vt ad clausuram fontanelarum præcedant vniuersalia remedia, sicut ad apertionem purgatio, venæ sectio, bona victus ratio, multoque magis si corpus fuerit plethoricum, aut valde cacochymicum, vel si fontanelæ aliquo tempore emanare consueuerunt, & postea fuerunt resiccata. Hæc pro fontanelis.


## LAVS DEO.


















Handwritten text, likely a title or chapter heading, in a medieval script. The text is faint and difficult to decipher, but appears to be written in a single line across the upper portion of the page.

005644188